

OBSERVATIONUM DE AËRE

ET

MORBIS EPIDEMICIS


Volumen alterum;

Ab Anni nimirum Initio 1738 ad Exitum
usque 1748:

AUCTORE

JOANNE HUXHAM, *M. D. R. S. S.*

Διὶ δὲ καταμαρτάνει τὴν Κατάρασιν τῶν Ὀρίων ἀκριβῶς, καὶ τῶν
Νούσων ἰκάνην. *Hippocr. de Dieb. judicator. Initio, item, Lib.*
3. Epidem. Sect. 3.



L O N D I N I:

Impensis JOANNIS HINTON, ad *Arma Regia*, in
Vico dicto *Pater-noster-Row*; & ex Officina HENRICI
WHITFIELD, *Plimuthi*.
M.DCC.LXXIII.

ORSELYATTON

D D A R E

77

MORRIS EPIDEMIC

Voluntary Association

At Ann Arbor, Mich. 1892

1892


TABLE OF CONTENTS

JOHN H. HARRIS, M.D.

—

1. Introduction
2. The Epidemic
3. The Association
4. The Results
5. The Future

—



—

1892
Ann Arbor, Mich.
Published by the Association
at the University of Michigan Press

PRÆFATIO.

Perfeci tandem *Observationum de Aëre & Morbis Epidemicis* Volumen alterum (ab Initio scilicet Anni 1738 ad Exitum usque 1748) in quo quidem eodem usus sum Ordine, atque Notis, in priore descriptis *.

Quàm fuerunt plena Laboris hæcce Opera solus ille norit, qui talia conscripserit—Lubentius autem secundum hoc Opus suscepi, quod & prius Publico bene acceptum perceperim, & mihi porro, id meditati, haud inutile—Dum enim Cœli atque Aëris Mutationes notare diligenter, variosque Morbos has consequentes, eorum sanè Causam, ac Naturam, multò melius dignoscebam; quales enim Tempestates, tales etiam sunt Morborum Constitutiones, sicut notavit olim *Hippocrates* †, & fida dudum docuit Experientia—Multus ideò est divinus Senex in præcipiendo diligentem Aëris atque Tempestatis Observationem, optima quinetiam dedit Exemplaria, præcipuè in Libro primo & tertio *Epidemicorum*.

* Porro in Volumine 2^{do} notavi, quolibet Mense, Diem novæ, necnon plenæ, Lunæ—Hic obiter monebo, quòd tota Pluviæ Quantitas Anni 1737 (Vol. 1^o) fuit tantum Dig. Dec.

27,364, non, ut falsò imprimatur, 36,706. † Lib. de Humorib. Sect. 7.

Hujus etiam Laboris aliud mihi fuit Incitamentum; quoniam scilicet Observationes hujusmodi, quæ per longam Annorum Seriem, uno eodemque Loco factæ sunt, melius longè istius Regionis *Atmosphæræ* Constitutionem, Morbos vulgares, eorum Successiones, Relationes, imò & curandi Rationem ostendunt, quàm si per unum solummodò, alterumve Annum detur Historia: monet ideo rectissimè clarissimus *Ramazzini*, “ Nil foret in Arte medicâ utilius, “ quàm succedentes sibi ad invicem Constitu- “ tiones conferre, ut recta medendi Methodus “ institui posset, quoties eadem Tempora, ac “ iidem Morbi, recurrerent *”—Paulò etiam ultrà processit expertissimus *Hoffman*, hortando nimirum ardentè “ Omnes & singulos Medico- “ rum cordatiores, quibus Curæ Cordique Sa- “ lus Hominum est, ut in annotandis Morbo- “ rum Historiis, si epidemii Morbi grassantur, “ & diligentissimi & accuratissimi sint; & quis- “ que in suo Loco Temporum & Tempestatum “ præcedentium, & præsentium, Constitutio- “ nem, item in Barometro Mercurii Motum, “ ac Gradum Caloris ex Thermometro, simul “ adjiciant, integrasque & plenas Historias cum “ Methodo curandi & Eventu exhibeant †.”

Nostram profectò ad Vitam sustentandam omnium maximè necessarius est Aër, cæteris utiquè

* Constitut. epidemic. urban. 1691, ipso Initio. † *Frid. Hoffman. Medicin. rational. Systemat. Edit. Francofurt. 4º, 9 Vol. 1738, Patholog. general. Part. 3, Cap. 7, p. 430, Tom. 2º.*

per plures Horas carere possumus, hoc ne vel Tempore quàm brevissimo—An igitur purus sit, vel impurus, summi procul Dubio est Momenti, ejusque adeò bonas, necnon pravas Qualitates*, probè perdiscere debet Medicus.—Aëris autem Nomine hîc volo Terræ *Atmosphæram*, non merum, uti dicitur, Elementum: quæ cum ex variis admodum Rebus componatur, variis etiam Modis officere nobis, ac proficere, potest—Diversæ ergo hujus Constitutiones, tum ad Sanitatem tuendam, tum ad Morbos depellendos, assiduè sunt observandæ.

Res erit Exemplo clarior.—Sicca valdè & frigida Tempestas, perflante diu Boreâ, aut Aquilone, Corporis Habitum constringit, Fibras roborat, Vascula arctiora & fortiora facit, Humores etiam magis densos; porrò Globulos sanguineos accumulat, & compingit validè; *Celsi* Verbis, totum Corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit; ideòque, ex *Hippocratis*† Opinione, omnium Ventorum Aquilo est saluberrimus—At si diutiùs talis perstat Tempestas, solida fiunt stricta perquàm, & *elastica* nimis, Fluida verùm crassa valdè & glutinosa, imò ad Vascula minutissima permeanda multò minùs idonea; namque non tantùm Humoribus inducit Lentorem, ad Inflammationes aptum, sed & ita quoquè condensat rubros Sanguinis Globulos, ut difficillimè

* Haud pauca de his dixi in Prolegomen. ad Vol. I. de *Âère*, &c.

† Lib. de Morbo Sacro, Sect. 15. Edit. *Vander Linden Lugdun. Batav.* 2. Vol. 8. 1665.

per ultimos Arteriarum Ramusculos promoveantur; duros nempe plus æquo, & haud facile Formam rotundam in oblongam mutant ad Transitum scilicet faciliorem; cum & jam etiam ipsæ Arteriolæ à Frigore coarctantur & Distentioni resistent plurimum.—Hinc Obstructiones, hinc Inflammationes, Pleuritides, Peripneumoniæ, Anginæ, Rheumatismi, Morbi denique, qui à crasso, viscido, ac inflammato Sanguine pendent, prævalidâ Vi Cordis & Arteriarum adacto: quò magis etenim arctantur à Frigore Vasa, quò magis *Atmosphæra* comprimuntur Pondere, eò velocius, cæteris paribus, moventur contenti Humores, unde Frictio major, ac proinde Calor; quæ tandem Sanguinem incrassant & condensant maximè—Certa hæc sunt omnia & constantia, Sanguis enim, tali perdurante Aëris Constitutione, densus est admodum, atque glutinosus plerumque, vel si è Sanissimis emittitur, multò magis ubi Febris accedat.

Verum enimverò nec protinus oritur morbidus hic Lentor, nec in omnibus, fit namque gradatim, cum diu nimirum regnaverit aquilonia & sicca Tempestas, neque enim interest quales Dies sint, sed & quales etiam antè præcesserint.—Atqui laxis nimium & pituitosis Hominibus adeò non nocet hæcce Constitutio, ut vel sit apprimè utilis, firmos hos magis, ac vegetos, efficiendo; una sic Natura, Præceptore optimo, notante*, ad Hyemem, alia ad Æstatem, benè

* Hippocrat. Aphorism. 2. Sect. 3.

aut malè se habet.—Hinc insuper esse videtur quòd una Febris *epidemica* fortibus est funesta & robustis, parcitque imbecillis, alia verò, sub humido tepidoque Cœlo nata, in hos teneros maximè sævit.—Ex magnis igitur *Atmosphææ* Mutationibus vel muratur maximè Morbus popularis, vel supprimitur prorsùs; quòd persæpè videmus.

Ad Mala autem siccæ & frigidæ Tempestatibus præcavenda (imò & tollenda) utendum est multâ, diluente, emolliente, tepidâ Potione, Victuque molli & relaxante, neque unquam antè progredi quis debet quàm tepidum aliquem Potum assumpserit, sive Pedibus, sive Equo. eundem est contra Ventos aquilonares; at si inhorrescat aliquis indè, ac febricitet, mittendus est actutum Sanguis, potissimùm si Thoracis, aut Lateris, Dolor impetat: idque sanè mox repeti debet si Febris invalescat—Hoc utiquè perpetuum est quòd Sanguis nunquam tutius, aut feliciùs, in Morbis acutis mittitur, quàm frigidas inter & siccas Aëris Constitutiones, altiùs perstante *Barometro*: nec in Pleuriticis solùm & Peripneumoniacis consentaneum hoc est, sed in aliis plurimis, utpotè *Variolis*, *Morbillis*, *Rheumatismo*, Colicâ, &c.—imò in ipsis Febribus intermittentibus, quotidianis putà, ac tertianis, opportuna tunc sæpe est Venæ Sectio, per Initia saltem, ex facili aliter in continuas ardentes, aut *inflammatorias*, haud rarò mutantur.

E contrario, humida tepidaque *Atmosphæra* *Καλὰς αἰτῆς* Fibras relaxat nimium, Vim Vascularum enervat, Sanguinem debito solutiorem, pituitosum, inertem facit, totumque Corpus hebes, humidum, languidum, Febribus lehtis, putridis, intermittentibus longis, obnoxium—Hic ergo contraria prorsus Diæta, atque Medicina, est adhibenda; quæ solidas Corporis Partes firmare, quæ Fluidorum *Crafin* conservare, quæ validè compingere Globulos sanguineos possint, indicantur; Potus nempè subausterus, frigidus, generosus, Viætus valentior, desiccans, astringens, Balneum frigidum, ejusque Generis alia.—Ad hujus autem Constitutionis Febres parùm utiquè confert Sanguinis Detractio, quinimò nocet admodum, si sit effusior, oriuntur namque ab imminutâ Cordis & Arteriarum Potentiâ, à laxâ nimium Sanguinis Texturâ, & lentescente Lymphâ; tendit hinc ad *Stasin* atque Putredinem Liquidum Vitale, unde Febres intermittentes, lentæ, putridæ, malignæ, hujus Tempestatis semper sunt Soboles; in quibus equidem curandis, quæ Vires foveant desiderantur, quæ minuant neutiquàm—Sæpissimè etiam, dum talia permanent Tempora, quotidianæ, ac tertianæ, in longas continuas putridas Febres degenerare solent, haud levi cum Ægrotantium Periculo, quas si tandem effugiant in Icterus, atque Hydropem, incidunt plerumque.—Nunquam profectò citiùs, neque feliciùs, restituuntur Ægrotantes, quàm sùdo effulgente Cœlo, altèque in *Baroscopio* stante

Mer-

Mercurio; hoc ego observavi constanter, idemque olim notavit percelebris *Frid. Hoffmannus*, in Medicinâ faciundâ diutissimè versatus, lentissimè contrâ convalescunt, dum nubilus perflat ac pluviosus Auster.

Cæterum & haud parùm insalubris est gelidus humidusque *Atmosfera* Status, multis quippè Modis obest, præcipuè frigidos insinuando in Corpus Humores, atque *Perspirationem* inhibendo plurimùm *—bene tunc nobis cingendum est Vestibus, luculento etiam Foco, debitoque Vitæ Regimine, ab algidis Vaporibus, quantum possibile, cavendum est; omnibus denique Modis *Perspiratio* est promovenda, inter quos frequens totius Corporis Frictio ad Ignem confert plurimùm, necnon Exercitatio quotidiana †, eaque etiam paulò fortior.

Semper adeò pugnare debemus contra peculiarem Aëris Intemperiem.

Eluceant magis forsan, quæ dixi suprâ, si Morbos *endemicos* perpendamus; horum namque Pars longè major haud Dubio nascitur à singulari cujusque Loci, ubi infestant, *Atmosfera* Depavatione; in Locis videlicet cavis, palustribus, uliginosis, grassantur semper Febres lentæ, putridæ, intermittentes irregulares, quæ nullis ferè cedunt Remediis, nisi mutato prorsus & Loco

* Vel paucae subitaneæ Nubes sub fervido Cælo *Perspirationem* impediunt plurimùm. Vid. *Observat. accuratissimæ Job. Lining, M. D. Philosoph. Transact. N.º. 470.* † Quantum promovet *Perspirationem*. Vid. elegantissima Experimenta *Georgii Rye, Armigeri, in Medicinâ Staticâ Hybernicâ*; ad Calcem Libri Doctiss. Dr^{is} *Rogers de Morbis epidemicis.*

& Aëre, ibi quoniam *Atmosphæra* humidis perpetuò & noxiis abundat Vaporibus, qui Viti-
brarum debilitant, *Perspirationem* supprimunt,
corrumpunt Humores—ideòque si quis Advena,
udis in his Locis, crassoque versatur Aëre, per
Dies vel paucissimos, certò ferè certius ægrotabit—si retentum namque *Perspirabile* nec per
Alvum, nec per Urinam, neque per ipsos Cutis
Meatus, intra perbreve Tempus expellitur, Fe-
bris * mox creat plùs minùsve; edque fit gravi-
or, quò major fuerit retenti Quantitas, quò ac-
rior Qualitas ejusdem †. — Æstate igitur vel
Autumno, magno dum Calore acriores multò
facti sint Humores, intercepta *Perspiratio* maxi-
mè nocet.

Contrà qui Montes habitant aridos, Aquilonem
spectantes, Febribus *inflammatoriis* Pleuritide,
Peripneumoniâ, Anginâ, affliguntur plurimùm :
Has utique in Locis editioribus frigidis, Septen-
trioni expositis, crebrò notavi esse perfrequentes,
cum per Valles autem rarus fuerit admodùm
aliquis Pectoris Morbus—Quid quod & inter-
dum vidi Febrem *Catarrhalem epidemicam*, *Pleu-
ro-peripneumoniæ* Naturam induisse per Loca
montosa & algida, dum in humilioribus ad len-
tam proximè (seu *nervosam* ut dicitur) Febrem
accessit—Hinc equidem haud obscura videtur
Ratio, cur uno, eodemque, regnante Morbo po-

* *Sanctorii* Aphorism. 11. Lib. 1.

† ——— 46. *ibid.* — 35. Sect. 2.

pulari, variis in Locis, diversus celebratur Modus medendi.

Sed & hîc quoquè Ratio Ventorum habenda est plurimum, *Atmosphæram* quippe maximè mutant: Boreas nimirum siccam, frigidam, ac ponderosam, facit; Auster verò humidam, levem, atque tepidam: magnam adeò Vim habent Loca reddendi salubria vel insalubria, & diverso planè Modo afficiuntur Incolæ, hoc perflante, vel illo, Vento—Qui frigidis ergo læduntur & siccis, humectare, ac tepidâ subinde Potione fovere, Corpora debent, qui humidis siccare; semperque peculiari Aëris Inclementiæ Victu, Regimine, atque Medicinâ, obfistendum est—Neque hoc solùm, sed & noxios adversus Ventos, quantum fieri potest, muniendum est, Ædificia scilicet extruendo sic, ut quàm minimè sint objecta Flatibus perniciosis—Pestilentiae quondam, Corcyrae grassanti, occurrebat *M. T. Varro*, occlusis Fenestris Austrum spectantibus, aliis ad Arctum apertis *—Magna sanè fuit Priscorum Diligentia in Ædibus condendis & Oppidis, ut prospera foret Incolarum Valetudo; Viscera etiam Animalium, iis in Locis pascentium, ubi Ædes ponere statuebant, sedulò perscrutabantur, an nempè sana essent, vel insana; atque ita prospiciebant futuræ Habitantium Saluti, omnibus Modis quærentes Salubritatem †—Nunc verò Dierum, in Ædificationibus, plerumque pluris aestimatur

* *Varro* Lib. 1. Cap. 4. inter Scriptores de Re rusticâ, ex Edition. *Gesneri*, Lipsiæ, 1735. 2 Vol. 4°.

† *Vitruvii*. Edit. *Philandri*, 4°. Lib. 1. Cap. 4.

Lucrum atque Mercimonium, quàm Salubritas—de quibusdam herclè, ut de Mitylene olim *Vitruvius* *, verè dicendum est, “ Auster cum
“ fiat Homines ægrotant, cum Corus tussiant,
“ cum Septentrio restituuntur in Sanitatem, sed
“ in Angiportis & Plateis non possunt consistere
“ propter Vehementiam Frigoris”—Haud pau-
ca Ædificia quidem in Convallibus paludosis ità
malè locata sunt, ut nunquam non Morbis infes-
ta sint; quorum Possessoribus utiquè Consilium
commendo laudati *Varronis* †, “ ea vendant quot
“ Affibus possint, aut, si nequeant, relinquunt.”

Sed hæc obiter; qui vult plura de Situ Locorum adeat magni *Hippocratis* Librum de *Ære, Aquis, & Locis*; porrò Librum secundum de *Diæta*, ubi etiam de diversorum Ventorum Natura—per plurima certè in his lectu sunt dignissima.

Quanquam aliquæ Febres *epidemicæ* à Contagione ducant Originem, oriuntur attamen plures ab Intemperie *Æris* manifestâ, neque enim probabilis magis videtur communis Morbi Causa, quàm ipse *Ær* omnibus communis—Per humidæ equidem tepidasque *Atmosphæræ* Constitutiones, permanentes diu, Febres lentæ, putridæ, malignæ, semper grassantur, sicuti observavit tota Medicorum Schola ab ultimâ Antiquitate ad hoc usque Tempus; nec profectò cessant tales nisi omninò mutata *Æris* Temperaturâ, quod

* *Vitruv.* Edit. *Philandri*, 4^o. Lib. 1. Cap. 6.

† *Varro* de *Re rustica*, Lib. 1. Cap. 12.

etiam persæpe supprimit brevè ipsas contagiosas:—imò ipsæ Pestilentiaæ ut plurimum occurrit sic- cum Frigus hybernum; frequenter autem nimis, sub humido calidoque Cœlo, Vim maximam accipit.—Atque Ego quoque novi sæpius Fe- bres putridas, malignas, per æstuosam ac nebu- losam *Atmosphæram*, tum Vi, tum Numero, auc- tas maximè, mox tamen, sicco flante Boreâ ge- lidoque, extinctas penitus—Imò ipsæ Procellæ sæpe juvant admodum morbida dissipando *Mias- mata*: haud minùs corrumpitur stagnans Aër, quàm Aqua stagnans, quæ citò, nisi movetur su- bindè, putrescit.

Quidam insuper Morbi singulis Anni Tem- pestatibus respondent, Pleuritides nempe, Peri- pneumonia, Anginæ, tertianæ Febres, Tempori verno, Autumno autem quartanæ, putridæ, ma- lignæ, Cholera, *Dysenteria*; quod nimirum so- lita, istis Temporibus, Aëris Dispositio his pro- ducendis Morbis, aut illis, faveat—Atqui si in- tempestivè se habuerint Tempestates, Morbi pro- indè variabuntur maximè ita ut isti, qui Autum- no sunt proprii, per calidum humidumque Ver dominari possint, per Autumnum verò frigidum Febres Veri magis peculiare, utpotè Pleuritides, Peripneumoniæ*, &c.—Sed plerumque in Fe- bribus autumnalibus, qualescunque sint, Humo- res longè magis ad Putrescentiam tendunt ob prægressam Æstatis Calorem, nec adèò largum admittunt Sanguinis Dispendium.—Suppressa, ex

* *Hippocrat. Lib. de Humor. Sect. 7.*

suscepto Frigore, *Perspiratio* Vere Febres *inflammatorias*, Autumno putridas plerumque, aut malignas, generat *—imò si, per Autumnum, infestant Alvi Fluxus, multò magis acres sunt, ac biliosi, quàm Tempore verno, ut satis superque Medicis notum est — Æstatis siquidem Ardor *Perspirationem* auget maximè, Corporis humidissima diffilat, Sales Oleaque animalia exasperat, undè nascitur sensim magna Sanguinis Acrimonia; quæ ad Autumnum usque increfcit, nisi diluentibus idoneis, atque demulcentibus, temperatur quotidie.

Sed audi de his Rebus Coum Oraculum †, Naturæ Interpretem : — “ Omnium Generum
 “ Morbi profectò omnibus Temporibus fiunt,
 “ quidam verò in quibusdam magis gignuntur,
 “ & exacerbantur, *Aphor.* 19°. Sect. 3.—Qua-
 “ lia Tempora (ὥραι) tales Morborum Consti-
 “ tutiones—Tempora tempeftiva, & bene ordi-
 “ nata, Morbos regulares (εὐ-αδέας) & judicatu
 “ faciles faciunt. Lib. *de Humorib.* Sect. 7. &
 “ *Aphorism.* 8. Sect. 3—Atqui, prout variaverit
 “ Tempus, fimiles, aut diffimiles erunt Morbi,
 “ qui in hoc oriuntur, Lib. 1. *de Humor.* Sect.
 “ 7.—Conversiones Temporum ‡ (Anni) max-
 “ imè pariunt Morbos, & in ipsis Temporibus
 “ magnæ Mutationes, Frigoris putà, aut Calo-

* *Sanctor. Aphor.* 35. Sect. 2.

† Citavi plerumque *Hippocratem* ex Editione *Lindeni*, non quòd hanc valdè probo (nam *Foëfianam* huic longè ante fero) sed quia Textum *Hippocraticum* in varias distribuit Sectiones; quo faciliùs inveniuntur Loca citata.

‡ Αἱ Μεταβολαὶ τῶν Ὁρέων.

" ris; & sic de cæteris, *Aphorism.* 1. Sect. 3. Lib.
 " *de Humorib.* Sect. 8. — Constitutiones Hominum
 " aliæ ad Æstatem, aliæ ad Hyemem, benè aut
 " malè se habent, Morbi porrò ad Tempora,
 " *Aphor.* 2. 3. Sect. 3. Lib. *de Humor.* Sect. 8.
 " — In Anno autem aliquando Hyems maximè
 " prævalet, aliquando Ver, modò Æstas, modò
 " Autumnus, Lib. *de Natur. Homin.* Sect. 16.
 " — Hyeme Pituita in Homine augetur, *ibid.*
 " Sect. 12 — Vere Pituita magis dominatur, at
 " Sanguis increfcit, *ibid.* Sect. 13. — Æstate San-
 " guis adhuc viget, sed & Bilis exaltatur; per
 " Æstatem etiam, ac Autumnum, Bile Corpus
 " abundat; Autumno autem atra Bilis plurima
 " est & fortiffima, Sanguis verò parciffimus,
 " *ibid.* Sect. 14."

Quicumque Morbi Hyeme augescunt, Æstate
 cessant, qui per Æstatem increfcunt, desinunt.
 Hyeme, Lib. 3. *Epidemic.* Sect. 3, & *de Natur.*
Hominis, Sect. 17. — Sin autem diu productam
 Hyemem insequitur Ver perfrigidum, hyberni
 fiunt Morbi, Tuffes, Peripneumonix, Anginæ:
 — quinimò si Ver processerit More Autumni
 Morbum regium producit, licèt propriè sit Mor-
 bus autumnalis, Lib. *de Humor.* Sect. 7. — Siqui-
 dem verò hæc, vel illa, Anni Constitutio dura-
 verit, diutiùs, Morbi huic congruentes diutiùs
 quoquè permanebunt, atque eò erunt fortiores,
 quò magis prævaluerit & perduraverit Tempestas
 peculiaris; etiam & communiffimi grassabuntur,
 & perlongo Tempore perstabunt, *Aphorism.* 7.
 Sect. 3. Lib. *de Humor.* Sect. 9. — Ex Anni Con-
stitu-

stitutionibus Siccitates (Αἰχμοί) sunt pluviosis salubriores, ac minùs lethales, *Aphor.* 15. Sect. 3.—Etsi per magnas Siccitates Febres acutæ, *ibid.* *Aphor.* 7.—Sed in valdè pluviosis Febres longæ, putridæ, Alvi Fluxiones, Anginæ, Apoplexiæ, *ibid.* *Aphor.* 16.—Austri Caput gravant, Corpus dissolvunt, & humidum, languidum, hebes faciunt *—Aquilo Tussim movet, Fauces exasperat, Ventrem astringit, Horrores excitat, item Dolores Lateris & Pectoris, attamen Corpus compactum, firmum, agile reddit, & benè coloratum, *ibid.* *Aph.* 5. 17.—& *Lib. de Humor.* Sect. 8.—Aquilo enim omnium Ventorum est maximè siccus, atque ideò saluberrimus; Austro verò quoad omnia huic contrarius, *Lib. de Morbo Sacro* Sect. 15.—Si Hyems sit moderata, nec valdè mitis, nec valdè frigida, Vere porrò, ac Æstate, tempestiva decidat Pluvia, Annum esse saluberrimum consentaneum est *Lib. de Aëre Aquis & Locis*, Sect. 25.—At si sicca sit Hyems, atque aquilonia, Ver autem pluviosum, & australe, erit Æstas Febribus abundans; nam, Æstu mox accedente, non potest fieri quin acutissimæ Febres per plurimos invadant, præcipuè pituitosos, Dysentericiæ verùm Mulieres & Viros humidiores, *ibid.*—Atqui si circa Caniculæ Exortum accedunt Pluviæ, frigidique Aquilones †, Spes Cessationis est, necnon Autumni salubris, *ibid.* Sect. 26.—Si quando Æstatem pluviosam, atque

* Νότος κρηβαρικός, ideò aptissimè hunc plumbeum vocat *Horatius*, *Lib. 2. Satyr. 6.*

† Καὶ χυμὸν καὶ οἱ Ἑρῆσαι, austri-

austrinam, similis sequitur Autumnus, plurimos Morbos excitat Hyeme—Siccæ autem Æstati, Boreæque perflatæ, pluvius, & australis, succedens Autumnus, Hyeme producit Capitis Dolores, Cerebri Corruptiones *, Gravedines, Ralcedines, Tussis, imò & Tabem, *ibid.* Sect. 28.—Quòd si aquilonius sit Autumnus & siccus, neque Pluviæ sub Cane, nec vel sub Arcturo, decidunt, confert equidem pituitosis, humidis, ac Mulieribus; biliosis verò nocentissimum est, quòd humidissima Corporis dissipat, crassissima autem & acerrima relinquit, *ibid.* Sect. 29.—Medicus idè sic Morbis occurrere debet, ut respiciat semper cum Hominum Constitutiones, tum etiam varias Tempestatum Mutationes, contraria nempe contrariis curando, oportet igitur Jaxa nimis constringere, solvere stricta, *Lib. de Natur. Hominis* Sect. 17, 18.

Nec tantum reverà diversos diversarum Tempestatum Morbos descripsit optimè divinus Senex, sed optimum quoquè Regimen, atque Medicinam, ad hos præcavendos, ac curandos, præscripsit, præcipuè in *Lib. de Salubri Viæ Ratione*, necnon per Initia *Lib. 3. de Diæta*—Sed ista jam nunc perscribere longum est—Hæc pauca verò passim ex Scriptis Hippocraticis excerpti, & paulò forsan transtuli liberius, cum eo tamen (ni fallor maximè) ut Sensum semper Auctoris tradiderim fideliter—Sed propius ad Fontes accedite, Medici Tyrones, atque haurite affatim,

* Σφακίλου; τοῦ Εγκράτου.

percipietis indè quàm sagax, quàm admirabilis fuit Priscorum Diligentia—videbitis utiquè non minùs ingeniosam fuisse antiquitùs Observationem, quàm nunc Rationem ; ut pulchrè de Veteribus olim dixit *Caius Plinius*, Histor. Natural. Lib. 18. Cap. 29.

At enim si quis fortassè his objiciat, quòd Observationes ab *Hippocrate*, suàque Scholà per Græciam factæ, ad Nostrates pertinent parùm ; sciat ille velim, similem esse ubiquè Hominum Naturam, sicco nempè Frigore semper & constringuntur Corporis humani Solida, & condensantur Fluida, hæc porrò utraque humidus Calor solvit semper ; nusquam non minuit *Perspirationem* uda frigidaque Tempestas, hanc nusquam non promoyet tepida Serenitas : adeòque magnæ Aëris Mutationes, quòd ad Calorem, aut Frigus, Siccitatem, aut Humiditatem, magnos pariter ubiquè Terrarum fortiuntur Effectus —Nec profectò multùm differre videntur, factâ diligenter Comparatione, Observationes *Hippocraticæ* ab illis, quæ captæ fuerunt nuperis Annis, & in Locis à Græciâ longè longèque remotis, inter etiam

et penitus tota divisos Orbe Britannos.

Sed diluit hanc Objectionem optimè clarissimus *Wintringhamus* in Prolegomenis ad Commentarium suum Nosologicum :—Subjiciam verò & ipse, quòd etiamsi Græciæ Regionès Cœlo magis clemente gaudeant quàm Insula nostra, haud levibus tamen Aëris Mutationibus subiectæ sunt

sunt frequentes; imò in ipsis Constitutionibus, ab *Hippocrate* descriptis, leguntur subindè, ῥῥαλὰ πολλὰ, Αὐχοί, Χειμῶνες μεγάλοι, Χιόνες μεγάλαι, Οὐρανὸς λαίλαπώδης, ἐπιδέφελος, &c; quin ejusdem planè Genoris Febres populares apud *Hippocratem* passim occurrunt, quibus & nostra quoque *Britannia* plectitur subindè—*Epidemica* quippe Febris Effectus tantum est Causæ morbificæ, ista autem Causa plerumque peculiaris *Atmosphære* Constitutio; adeoque hanc gignit aquilonia, illam austrina, ubicunque nimirum hæc, vel illa, diu duraverit.

In sequente (necnon in præcedente) Morborum *epidemicorum* Historiâ, non tantum Febres popularim grassantes exposui, sed & hos etiam Morbos, qui unâ cum istis sparsim intercurrerant; eo scilicet Animo, ut singulorum indè Natura clariùs innotesceret; sequens in hoc utiquè magni Præceptoris Vestigia, qui in describendis Aëris & Morborum Constitutionibus hanc tenuit Rationem.—Sæpe quippè sæpiùs accidit, dum Pleuritides & Peripneumonix per siccam valdè & frigidam Tempestatem sæviunt, Anginæ quoque, *Ophthalmiæ*, *Rheumatismi*, Cruciatus Intestinarum, eodem etiam Tempore, multos infestant; atque ut plurimum haud minus ab inflammato, ac viscido Sanguine pendent quàm ipsæ Pleuritides, nec minus Sanguinis Missionem postulant; aliis quanquam Temporibus meliùs multò Purgantibus discutiantur.—pone jam aut *Variolas*, aut *Morbillos*, tunc unâ grassari, longè tum sanè liberius, cæteris paribus, Venæ Sectionem, his in
Morbis,

Morbis, consulerem, quam ubi non talis prævaluerit frigida *Atmosphære* Temperies, nec proinde tam viscida Sanguinis *Diathefis*.

Si noscimus equidem qualem Sanguinis *Craſſi* hæc progignit, vel illa, *Atmosphære* Constitutio, satis bene conjectare possumus, quales inde Corporis Affectiones sint futuræ, qualiaque possint Remedia; Morbi enim, ut monet *Hippocrates*, non derepentè Hominiſus accedunt, sed paulatim sunt collecti, licet erumpant subito;—* Exempli Gratiâ, robustis & exercitatis Hominiſus inſitus eſt naturaliter Sanguis denſus atque tenax, adventante jam aridâ, & aquiloniâ Tempeſtate, Fibræ vaſaque magis adhuc conſtringuntur, magisque denſa atque craſſa redduntur Fluida, uſque eò ut Sanguis tandem fiat valdè glutinoſus; his jam ita conſtitutis, mox oriſtur faciliſimè, ex Frigore ſuſcepto, Labore nimio, Ingluvie, aut quolibet fermè, in Vitâ, Errore, Lento inflammans, qui infixus nunc Pulmoni Peripneumoniam, nunc Pleuræ Pleuritidem, nunc Intestiſinis colicam Inflammationem, generat.

Vides adeò, Lector amice, quantum ad Prophylaxin valeant Observationes meteorologicæ, quantumque etiam ad Morborum Curationes.—His igitur fruiſe modò, tandemque meliores ede.—Quatenùs nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo nos vixiſſe teſtemur †.

* Lib. 1. de Diætâ Sect. 3. † *Plinii* Epist. Lib. 3. Epist. 7.

[1738]

I

DE AËRE,

ET

Morbis Epidemicis,

ANNO MDCCXXXVIII.

Nova Luna Die 9° JANUARIO. *Plena Luna* 24°.

ORIENTE Anno totum obducitur Cœ-
lum Nubibus, quæ continuas ferè de-
stillant Pluvias, furente subinde Procel-
lâ. Hoc verò per Initia Mensis, post enim Plu-
via parcior, at durat usque Constitutio Aëris
crassissima, ac maximè humida, quæ *Barome-*
trum ad Stationem præaltam sustinet; quod qui-
dem sæpissimè accidit dum *Atmosfera* * est
valdè nebulosa; Vapore nempe unâ cum Aëre
premente.

Rarum hoc Mense Gelu, nec Frigus solitum,
Ventus plerumque inconstans, Malacia nonnun-
quam.

Pluvia	$\frac{''}{1}$	$\frac{''}{2}$	$\frac{'}{3}$	4.	5.	$\frac{'}{6}$	$\frac{'}{7}$	8.	$\frac{'''}{9}$	10.—12.
									Dig. Dec.	
$\frac{'}{13}$	$\frac{'}{16}$	$\frac{''}{21}$	22.	23.	30.	=	2.974.			

* Vide Mens. Januar. 1728, Vol. primi.

Nox procellosa 2. W S W 4_x. Procella 5. p. m. S W 4. Fulgur, Tonitru, & Turbo vehementissimus 6. Horâ sextâ p. m. Procella 7 p. m. S W 4, gravis Procella 9. p. m. & tota ferè Nocte S W 4_x. Nix & Grando 11. Gelu 14. 15. N N W 1. Magna AB. 14 H. 10. p. m.

☿ Altitud. maxim. 17. 30. 5 N 1. }
 ——— minim. 9. 29. 0 S W 4_x. } media 29. 9 $\frac{29}{9}$.
 Dies frigid. 15. 66. N N W 1. }
 — tepid. 23. 48. Malacia. } media 54 $\frac{7}{9}$.

Febris *Catarrhalis* & *Rheumatismus* passim, *Pleuritides* aliquæ, *Peripneumonia* notha * verò longè frequentior est; Tussis creberrima; gravis Arthritis torquet permultos. Febris lenta, *nervosa* frequens, quæ nonnunquam, rubris urentibus Pustulis, Die nempe nono, undecimo, aut decimo quarto, erumpentibus, solvi videtur, maximè si crassæ, subsidentes Urinæ concurrunt. Haud multum utique Boni sperandum est ab Eruptione Pustularum dum Urinæ crudæ prorsus & tenues perstant; in ipsis etiam *Variolis* ac *Morbillis* pessimè significant: Ne vel ullus Sudor salutifer habendus est, dum aquosa fertur Urina.

Nova Luna 7° FEBRUARIO. *Plena Luna* 23°.

Perstitit ad quintum Februarii Diem humidissimus *Atmosphærae* Status tunc Boreas discussit Vapores rigido accedente Gelu: à decimo sexto ab Occidente plerumque Ventus, ac alia Rerum Facies.

* Vide quæ de *Peripneumonia* notha dixi, *Essay on Fevers*, p. 222.

Pluvia 8. $\frac{''}{16}$. 17. $\frac{''}{18}$. 20. $\frac{'}{22}$. 24. 26. 27.
Dig. Dec.

= 0.928.

Nix super Montes 14, nulla hîc autem.

8 Altitud. maxim. 6. 30,4. ENE 1. } media 29.8 $\frac{4}{18}$.
—— minim. 18. 29,0. S W W 3. }
Dies frigid. 13. 75. NE 1*. } media 58 $\frac{3}{18}$.
—— tepid. 1. 49. NW b W 1. }

Tussis & Angina inter Equos valdè frequentes, haud pauci suffocantur.—*Pleuritis*, aut *Perripneumonia*, multos corripit Homines, spuria tamen est ut plurimùm; Tusses permultæ.

Tempestat quidem haud insalubris est, at plures jam *Phibisi* tabeseunt pulmonaria, cui dedit Originem malè judicata Febris *catarrhalis* * hîc maximè sæviens ultimo Novembri & Decembri. Periclitantur admodum qui Asthmate olim, aut Tussiculâ siccâ, laborabant, quorum in Pulmone nempe delituerant Tubercula; quæ, cum sint Impedimento trananti Sanguini, facilè inflammantur, ac in ulcera tandem degenerant; vel, negatâ, his in Locis obstructis, Sanguini Viâ, nimius ruit ad alias Pulmonum Partes, unde *Hæmoptoe* sequitur denique, aut Inflammatio, aut tabifica in *Bronchiorum* Cava Destillatio.

Non omnis utique Tabes pulmonaria ab Ulcere pendet (rarior enim est hîc Casus quàm vulgò putatur) plures enim quotidie per longum Tempus immensam Muci falsi, dulcis, vel etiam planè insipidi, Copiam per Tussim rejiciunt,

* Post nimias Destillationes Tabes, *Cels. Lib. II. c. 7.*

cui nec Fœtor inest, nec purulenti aliquid, Glandulis nimirum cum Ductibus Asperæ Arteriæ relaxatis nimiùm. Hoc tamen sæpe, licèt Ægros diuriùs trahens, haud lethale minùs fit quàm si vel ipsam Saniem expuissent. Haud absimilis interdum Laticis vitalis est Profusio *Diabete* laborantibus; simile quid sæpe *Diarrhœa* tabescentibus, ubi ne vel minimum Ulcus, ut incisus Cadaveribus patuit. Nuper trimulum incidi Puerulum pertinace admodum Alvi Fluxu peremptum; hujus Intestina peralba, tenuissima, sedula quasi arte deterfa inveni, minimè autem ulcerata.

Augetur semper hoc Malum ex levissimo suscepto Frigore, occlusis scilicet Cutis Spiraculis, maximum fit in Pulmones Influxum; haud aliter sanè quàm persæpe videmus retentum *Perspirabile* per Nares depluere. Contra sicca frequenter urget Tussis, & spirandi Difficultas, obstructis adeò & induratis Pulmonum Glandulis, ut in lapideam penè abeant Duritiem *, dum *Bronchia* præ nimia Siccitate rigescant, Muco naturali deficiente. Quis non videt quàm diversam prorsus Medicinam poscunt hæc duo Mala, utcunque in Praxi faciunda haud semper satîs probè servatur Distinctio? Nec pauci sunt equidem, qui in omni ferè Tussi, sit sicca, sit humida, *Oleosa*, *Emollientia*, *Dulcia*, *Ecclegmata* porrigunt. Id quidem in priore rectè satîs, modò *Incidentia* aliqua commista sint; secus longè u-

* Haud ita pridem Juvenem generosum, tabidum, vidi Lapillos asperos extussientem, qui, Tracheam lacerantes, haud leve Sanguinis Sputum movebant.

bi serosa Colluvies inundat Pulmonem : Relaxant enim nimis, Humoribus Lentorem inferunt, & *Perspirationem* impediunt ; unde augetur vel ipse Morbus. Cibi insuper Appetentiam & Concoctionem pessundant, demumque *Diarrhæam* colliquantem inducunt. Rectius multo blandè moventia Sudores *, inter Scapulas *Epispastica*, ac lenia subinde *Cathartica* præcipienda sunt, interpositis crebrò *Anadynis* ; maximè si sit tenuis admodum ac irritans Illuvies, hanc enim demulcent & incrassant, quo facilius longè per Sputa emolitur. Porro ad hoc Genus Valetudinis plurimum facit Decoctum Corticis *Peruviani* cum Ligno *Guiacino* & Styrace, quod in altero Casu foret nocentissimum : Nec inutiles hîc sunt Suffitus * deficcantes idonei, qui quidem in Destillationibus haud parum valent.

Ubi verò *Trachæ & Bronchiorum* Glandulæ obstruuntur, nec satîs oleosi Mucoris secernunt ad lubricandas eorum Membranas ; atque, uti sæpe fit, Lacerti musculosi *Asperæ Arteriæ* † & Bronchiorum rigidi sunt, ac nimis contracti, ibi lenis, emolliens, tepida Potio, ejusque Vapor, hausta sæpissimè proficiunt maximè oleosis, & relaxantibus subinde assumptis.

* Vide *Bennet. Theatr. Tabidor. Sect. 28. 30, &c.*

† *Andr. Laurent. Hiltor. Anatomic. Lib. 9. c. 14, porro Jo. Bapt. Morgagni Adversar. Anatomic. Sect. 25.*

Nova Luna 9° MARTIO. *Plena Luna* 24°.

Principio Ventus *borealis* afflavit, mox irruebat Austro madidus, à decimo autem ad decimum sextum Aquilo siccam fecit *Atmosphæram* & frigidiorē : Libs inde ut plurimū, Pluviā sæpe cadente.

Pluvia 5. ^{"/}8. 9. 11. [/]17. 18. 19—22. ^{"/}23.
Dig. Dec.

24. ^{"/}28. [/]29. 30. Grando 1.—1.730.

Levis Procella 8. p. m. S S W 4x. — gravis Procella 19 Mane S 4x.

§ Altitud. maxim. 31. 30,1. N N W 1. } media 29.5³/₈.
—— minim. 8. 28,8.
Dies frigid. 16. 62. N N E 1. }
—— tepid. 22. 46. S S W 2. } media 54⁵/₈.

Frequens *Ophthalmia* ; Tussēs plurimæ & acres admodū, quæ utique Exitio sunt pluribus, illis maximē, qui *Asthmate* vetere laboraverant, aut quibus infelix Exitus *epidemicæ* Febris hyemalis obstructum Pulmonem, & Pectoris Oppressionem intulerat, cita nempe *Phthisi* abreptis.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* frequentes ; sæpe etiam & Latus vehementer affectum est & Pulmo ; Morbum vocant *Pleuripneumoniam* *, in quo, dum sævit Lateris Dolor, urget simul Tussis & Pectoris Gravis : Fit evidentior si Sputa sanguinolenta exantlantur.

* Vid. Librum Nostm de Febribus, &c. (*Essay on Fevers*) Gap. de Peripneumon, &c. p. 199.

Jam certè multa Sputa cocta, facilia, non multo Sanguine tincta, Morbum solvunt feliciter; sæpe tamen vel tenuis prorsus & acris Colluvies ejicitur, vel vana sunt omnino Naturæ Conamina, eludente nimirum pertenui & incocto Humore Vim Pulmonis: Pessimum certè ubi nihil excreatur, aut nil nisi crudum & spumofum †.

Nunc quoque in his Malis pulmoneis haud rarò erumpunt Pustulæ magnæ, urentes, imò etiam interdum dolentes valdè, circa Pectus, Scapulas, Cervices, quinto circiter aut septimo plerumque Die, quarum aliquæ plurimùm acerrimum fundunt *Ichorem* ||: Felix hoc semper ferè & faustum fuit Ægrotis.—Diligenter utique in Morbis notandum est, quò Natura sua Sponte vergit; adeò cum Pustulas excitet, aut Furunculos in Humeris, aut Cruribus, per eas quoque Vias Arte tentandum est Morbum levare, admotis *Epispasticis*, Cucurbitulis, &c.—In omni itidem Naturæ Molimine, sive sit per Cutim, sive per Alvum, aut Urinæ Vias, aut libera Sputamina, invigilandum est Medico ut idonea & concurrentia adhibeat Auxilia.

Nova Luna 8° APRILI. Plena Luna 23°.

Varius fuit Ventus variaque Tempestas hoc Mense, Imbre, ut solet, decidente frequenter: Exeunte Mense Eurus spiravit plerumque,isque frigidus valdè.

† Vid. Librum Nostrum de Febris, &c. (*Essay on Fevers*) Cap. de Peripneumon. &c. p. 199.

|| Φλυσταίναι, Hippocrat.

Pluvia 1. 4 — 6. 11. 12. 14. 15. 19. 21.

Dig. Dec.

22. 23. 24. 25 = 1.110.

Glacies 20. 24. E N E 1. Levis AB. 5. H.
10. p. m. 10. W N W 2.

§ Altitud. maxim. 17. 30,2. E b N 1. } media 29,6 $\frac{1}{3}$.
minim. 23. 28,8. W S W 2.

Dies frigid. 20. 56. E N E 1. } media 47 $\frac{1}{3}$.
tepid. 13. 40. S W 2.

Plures *Ophthalmiâ* vexantur : Tusses plurimæ ;
haud pauci jam acri Tussi & *bellica* Febre con-
sumpti pereunt. Id utique perpetuum est, quòd
fæviente *epidemica* Tussi *Asthmatici* & pulmona-
rii pessimè se habent ; novo nimirum accedente
Malo veteri Morbo.

Qui *Phtbisi* laborant periclitantur maximè in-
eunte Æstate, quoniam augescente indies Tem-
pestatis Calore Sanguis expanditur, unde transit
difficiliùs per obstructos Pulmones, hinc etiam
augetur *bellica* Febris & Sudor colliquans. Tales
ideò Ægrotantes hortor, ut se tunc Ruri recipi-
ant, ubi Aura purior & frigidiuscula, lenis
& accurata Diæta, forsàn & missus paulatim
Sanguis, si nimium ebullit, rapidum Morbi Cur-
sum reprimere possunt.

Nova Luna 7° MAIO, *Plena Luna* 22°.

Ventus australis, perpetuus ferè ad Diem vi-
cesimum Mensis, Argentum vivum in *Barome-
tro* suppressit, Aëremque fecit densum ac humi-
dum : inde per tres Dies Boreas, postea Zephy-
rus.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. 6. 9. 10. 12. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{17}$.
Dig Dec.
18. 20. 22—24. 26. 27. 30. = 1.544.

§ Altitud. maxim. 21. 29,8. NE 1. } media 29.4.
minim. 5. 29,0. S S W 1. }
Dies frigid. 2. 54. S S E 2^r. } media 38 $\frac{3}{4}$.
— tepid. 21. 30. Malacia p. m. }

Tusses, Gravedines, & *Ophthalmiæ* humidæ
frequentes: Quosdam *Apoplexia*, quosdam *Pa-*
ralysis corripit; *Pleuritis* & *Peripneumonia* mul-
tos præcipuè innuente Mense: Febres intermit-
tentes passim.

Nova Luna 6° JUNIO. *Plena Luna* 20°.

Constans fuit ab Occidente Ventus per totum
Junium, nunc ad Austrum, nunc ad Septentri-
onem flectens; inde Pluviæ, satis & Frigoris;
Aër interim factus est crassus valde & humidus.

Pluvia 2. 4. 7. 8. 10. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$.
 $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{20}$. 22—24. Grando vehemens 12. 13.
Dig. Dec.
= 2.398.

Circius admodum ferox 1. p. m. Procella 14
prima Nocte S W 4_r—20 Mane S W b S 4. Ful-
gura 11 Nocte.

§ Altitud. maxim. 30. 29,9. N W 1. } media 29 4 $\frac{1}{4}$.
minim. 16. 28,9. S W 2. }
Dies frigid. 18. 42. W N W 1^r. } media 34 $\frac{1}{4}$.
— calid. 30. 24. Malacia p. m. }

Tusses

Tussēs acres & implacabiles ferè sunt valdè frequentes, multæ quoque *Peripneumonia*, & veræ & nothæ; crebri, atque fortes interdum, Impetus *apoplectici*.

Qui Capite magno sunt & breviorē Collo facti, multoque abundantes Sanguine, ex facili in *Apoplexiam* incidunt, quacunque de Causa nimium caleſcant Humores.—His Curæ sit idè præcedente Vere, ac invalescente Calore, & Sanguinem mittere, & leni, & parco Victu, præcavere Morbum; maximè si ve Vertigo incidit, si ve Capitis Dolor, aut Tinnitus Aurium, aut falsi ac subiti Splendores; hæc, ni caveantur maturè, certa sunt sæpe sæpius subitanæ Mortis Præ-nuncia.

Nova Luna 5° JULIO. Plena Luna 19°.

Magna jam Cœli facta est Mutatio, fuit enim hic Mensis & siccus & calidus valdè, flante plerumque ab Oriente, vel Septentrione, Vento, qui *Barometrum* erexit, ac discussit Vapores.

Dig. Dec.

Pluvia 11. 12. 14. 19. 20. 21. 23. 28. = 0.590.

Fulgur & Tonitru 20 primo Mane, Dies valdè fervidi 4. 17.

§ Altitud. maxim.	3	29,8.	E 1	}	media 29.6 $\frac{1}{3}$.
——— minim.	19.	29,2.	S W 2.		
Dies frigid.	31.	33.	N 1.	}	media 24 $\frac{1}{3}$.
——— fervid.	4.	17.	Malacia.		

Graves Capitis Morbi adhuc passim, & Tussēs plurimæ; *Colica* biliosa frequens; Sudores maximè profusi omnes ferè debilitant valdè. Perplures jam Mulieres largissima patiuntur Menstrua summo

mo cum Virium Languore; an fuso Sanguine,
an rarefacto duntaxat?

Nova Luna 4° AUGUSTO. *Plena Luna* 18°.

Redit pluvia Tempestas, quæ porro pro An-
ni Tempore est admodum frigida, unde Messis
infelix: Corus subinde flavit, Libs sæpe, non-
nunquam Vultur, interdum Aquilo.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 5. 7. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 12. 14. 17—22.

Dig. Dec.

23. $\frac{111}{24}$. 25. $\frac{1}{27}$. 28. = 2.210.

Grando 10. Levis Procella & Fulgura 7 Nocte
S b W 4r.

§ Altitud. maxim. 29. 29.9 N. 1. } media 29.6 $\frac{4}{5}$.
—— minim. 8. 29.2. S W b S 3. }
Dies frigid. 27. 39. NNE 1 $\frac{1}{2}$. }
—— calid. 9 27. S W b W 2. } media 32 $\frac{4}{5}$.

Cholera, & Morbus colicus passim: Anginæ,
& Febres putridæ haud paucæ. *Variolæ* jam
frequentes à miseris *Saltzburgensibus*, Patriâ ex-
pulsis, huc advectæ.

Jure merito inter Morbos maximè contagio-
sos ponuntur *Variolæ*, adeò ut vel unus Puerulus
hisce correptus, fortè longè latèque sæpissimè
Luem dispergit: Atqui nisi etiam unà conspiraret,
Contagium fovens, Aëris Constitutio, sæpe vel
intra unum, alterumve Domicilium, in ipsis
quasi Incunabulis, extinguitur Morbus. — Hoc
utique vel in ipsa Peste quandoque notatur,
quam Hyems frigida coercescit †.

† Hodges de Peste per Initia.

Nova Luna 2° SEPTEMBRE. *Plena Luna* 16°.

Pluvia ferè perpetua ad medium usque Septembrem, Africo subinde fremente, Vulturno interdum; à decimo octavo autem Ventus Orientem inter & Septentrionem perstabat.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$ 11. $\frac{1}{2}$ 14. $\frac{1}{2}$ 16. $\frac{1}{2}$ 18.

$\frac{1}{2}$ Dig. Dec.

27. 28. = 2.912.

Procella 10 p. m. S W b W 4.

§ Altitud. maxim. 30. 30.0. E b N 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$ °.
minim. 10. 29.3.

Dies frigid. 29. 48. E N E 1. } media 29 $\frac{1}{2}$ °.
tepid. 1. 32. S W 3x.

Multæ *Variolæ*, *Morbilli* & Tormina frequentia; Febris *Catarrhalis* Pueros infestat: Mensis verò fuit parum morbosus.

Nova Luna 2° OCTOBRI. *Plena Luna* 16°.

Ineunte & exeunte Mense Ventus ab Oriente prævaluit, intermedio autem Tempore fuit varius admodum, sæpe turbidus Auster perfremuit, labente *Baroscopio*, & Pluvia ruente; à vicesimo tertio tamen nulla prorsus.

Pluvia 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$ 11. $\frac{1}{2}$ 12. $\frac{1}{2}$ 15. $\frac{1}{2}$ 18.

$\frac{1}{2}$ Dig. Dec.

20. 22. 23. = 3.330.

Procella 13. W S W 4x—20. p. m. necnon insequente Nocte S 4.

Maxima

Maxima Procella 23 Nocte S 4^x. Maximæ
Pruinæ 16. 17.

AB. 21. H. 10. NW b N 1—24. H. 9. W
NW 1—25. NNW 1—27. H. 9. W b N 1.

§ Altitud. maxim. 16. 30,4. ENE 1. } media 29,4 $\frac{2}{3}$.
— minim. 6. 28,7. SW b S 3^x. }
Dies frigid. 22. 55. NNW 1. } media 45 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 5. 40. SW b W 2^x. }

Variolæ & Morbilli sparsim, *Opthalmiæ*, *Rheu-*
matismi, & *Morbi colici* frequentes: *Febres* len-
tæ nervosæ passim.

Nova Luna 31° *Plena Luna* 15°
ultimo NOVEMBRI. *Nova Luna* 30°.

Parca admodum Pluvia ante Diem decimum
septimum decedit, dum vel Subsolanus spiravit,
vel Ventus borealis, surgente Barometro; post
irruit nimbosus Auster, multaque Pluvia; quod
Atmosphæram humidavit plurimum, quæ fuit
ante sicca satis & tenuis.

Pluvia 8. $\frac{111}{17}$. 18. $\frac{1}{19}$. 20. $\frac{1}{23}$. 24. $\frac{2}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{2}{29}$.
Dig. Dec.

$\frac{1}{30}$. Grando gravis 27 primo Mane = 1.874.

Procella 19 à Diluculo ad feram Vesperam S.
W 4.

— 20 p. m. WSW 4^x—vehemens 25
p. m. S 4^x.

Maximus Halo circa Lunam 10. 11. prima
Nocte ESE 2.

§ Altitud. maxim. 9. 30,3. ENE 1. } media 29,7 $\frac{2}{3}$.
— minim. 25. 28,8. S 4^x. }
Dies frigid. 9. 66, rigidum Gelu. } media 53 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 20. 47, SW 3^x. }

Pleur-

Pleuritides, Peripneumoniz, & Ophthalmiz frequentes, præcipue Mensis Initio: Multi *Rheumatismo* laborant, aliqui lenta Febre. Tussis, Anginæ, Coryzæ, Gravedines undique. *Variolæ* adhuc, *Morbilli epidemici*.

Plena Luna 15° DECEMBRI. *Nova Luna* 29°.

Per Initia Mensis Aër tepidus & humidus, Libs ferè perpetuus & pluviosus; ab undecimo ad vicefimum quartum Boreas perflavit, qui & *Barometrum* ad Altitudinem enormem evexit, & frigidam fecit *Atmosphæram* & paulò ficiorem: Ventus erat postea varius, frigidus, & pluvius.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 3—5. $\frac{1}{6}$. 7—9. 12. $\frac{11}{20}$. $\frac{111}{25}$.

26—30. $\frac{11}{31}$. Grando cum Fulgure & Tonitru
Deg. Dec.

7. Nix 21 Nocte. = 2.404.

§ Altitud. maxim. 14. 30. 7. NNE 1. } media 29,8 $\frac{1}{3}$.
—— minim. 3. 29. 1. SW 2. }
Dies frigid. 24. 72. ENE. valdè rigidum Gelu. } media 57 $\frac{1}{3}$.
—— tepid. 2. 47. WSW 2. }

Ophthalmiz †, *Rheumatismi*, ac *Morbilli* pluri-
mi adhuc, *Variolæ* passim: Multi Vertigine cor-
ripiuntur. Anginæ, pleuriticæ & *peripneumoni-
cæ* Febres valdè frequentes; haud paucæ lentæ
nervosæ; longè plures tamen acutæ ab acri &
inflammante Viscido; quod, dum ad varias

† Per frigidas & humidus Aëris Constitutiones diu duran-
tes Ophthalmias esse perfrequentes observavit *Frid. Hoffman*,
Medicin. rational. Tom. 4. Part. 1. Cap. de Inflam. Oculor.

transfertur Partes, varios producit Morbos, *Pleuritidem* puta, *Peripneumoniam*, *Anginam*, *Ophthalmiam*, &c. prout nempe in hac, vel illa Parte consistat obstruens Lentor. Nec mirum ideo quòd *Ophthalmiam* in *Anginam* interdum mutatam videmus, *Anginam* in *Peripneumoniam*.—Τῶν ὀδυνῶν καὶ ἐν πλευρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοις οἷν μέρεσιν ἢν μέγα διαφέρωσι, καλαμαθῆλέον.

Hippoc. Aphor. Sect. 6.

Tota Pluviae Quantitas, quæ Ann. MDCCXXXVIII.
Dig. Dec.
decidit, fuit = 24.004.

Plena Luna 13° JANUARIO. *Nova Luna* 28°.

Per Anni Initia Pluviae multum & Procellæ, cadit hinc *Barometer*, paulò tamen post, elucen- te Sudo, refurgit, dum Corus intervenit; mox autem Libs nubilus; brevique iterum Corus; va- riante sic persæpe Vento variat quoque Cœli Fa- cies: atqui per totum Mensem Aër fuit valdè crassus & longè humidus, ac plerumque tepidior solito.

Pluvia $\frac{''}{1}$. $\frac{''}{2}$. $\frac{''''}{3}$. $\frac{''''}{4}$. $\frac{''''}{5}$. $\frac{''''}{6}$. 10 — 13. $\frac{''}{19}$. 20.

21. 23. $\frac{''}{24}$. $\frac{''}{25}$. 26. 28. 29. 31. Grando 1. 5.

Dig. Dec.
25. Nix 2. = 3.962.

Procella 3 Nocte & tota Die 4. W S W
4—6 Nocte W S W 4.

———— 24. S W. 4—29 Nocte S S E 4. Ful-
gur & Tonitru 4. 25.

§ Alti-

& Altitud. maxim. 11. 30,3. WNW 1. } media 29,7.
 ——— minim. 4. 28,7. WSW 4. }
 Dies frigid. 2. 66. NW 1². } media 54¹⁶.
 ——— tepid. 31. 50. SW 3². }

Morbilli Epidemici, Variolæ sparsim & Ruri & in Oppido : Plures acerbo admodum & pertinaci *Rheumatismo* laborant, multos vehemens & diu durans Arthritis excruciat. *Peripneumonia* & vera & spuria passim : Tussis *convulsiva* inter Pueros frequens ; acerrimè quidem sæpe post *Morbillos* sævit, vix utique compescenda nisi Missione Sanguinis tollatur *Diathefis phlogistica*, ac Colluvies Aeris lenibus expurgetur, miti nempe Vomitione, & blandâ *Catharsi*, servata interim molli, diluente, accuratâ Diætâ : pessimus sanè Nutricularum Mos est Carnem mox & Piscem post *Morbillos* porrigere, hinc enim sæpissimè Febris *Peripneumonica* insequitur.

Plures gravi Anginâ cum acuto Aurium Dolo-
 re capti sunt, cui non rarò *Parotis* accessit sæpe
 in interiore Aure, aut Faucibus Abscessus, imò
 nonnunquam *Phrenitis* & Strangulatio subita :
 Duos, tresve brevissimè abreptos novi, attonitos,
 quasi & prorsus stupidos, quibus Vox primò mirè
 admodum stridula, mox omnino interclusa fuit ;
 horum tamen unus faciliùs multò quàm quis cre-
 deret oblata quæcunque deglutiebat.—Dirum
 hoc Symptoma quàm maxime semper timendum
 est, quòd Inflammationem Musculi *Arytenoidis*,
 & superiora Asperæ Arteriæ denotat ; unde, oc-
 clusâ penitus Rimâ *Glottidis*, Spiritus protinus
 eliditur : estque stridulus hic Clangor hujusce
 Inflammationis Signum *diagnosticum*.—In Mor-
 bo hoc pestifero opportuna *Tronchotomia* Ægrum
 inter-

interdum vindicat ab imminente Morte: Vana tamen est omninò, atque irritò celebratur Auso, dum Inflammatio Pulmones etiam corripuit, uti funestum sæpe docuit Experimentum. Hujus Signa præcipua sunt Pectoris Oppressio, summa Anxietas, perpetua *Orthopnæa*, & suffocans quasi Tussicula. Ita tamen non pertimescenda est hæc Operatio, ut vix Vena facilius tundatur; modò idoneus sit Artifex. Quid quod memini, triginta abhinc Annis, Discipulum quendam Chirurgicum vesano Puellæ cujusdam Amore percitum, qui *Cartilaginem Thyroideam* ter, quaterve Scalpello pertudit, adeò ut Lucernam extingueret illicò Flatus erumpens, dum officiosè consueret Vulnuscula Magister Chirurgus: quem monui, tandem advocatus, desisteret, potiùsque, Brachiis Juvenis Lectulo alligatis, prohiberet ne violentâ Manu Vitam impeteret rursus; inde Emplastro solùm adhærente, Vulnere probè contingente, ex facili sanatus est.

Si quâ unquam & Cautelâ & Festinatione simul est Opus, in Angina quidem suffocante necessarium est. Hoc tristi olim Exemplo persenssi in quodam Amico: erat hic sexagenarius ferè, agilis, rubicundus, & *Psycbrolusiâ* gaudens ferè quotidie. — Mane, Die Saturni, frigidò usus est pro More Balneo, post Meridiem gravi Horrore correptus penè obriguit, paulòque post incaluit vehementer, mox accessit Ardor Faucium intolerabilis, ac Dolor summus: Vesperi, missus est Sanguis; mediâ Nocte vocatus detrahi iterum 3xvi jussi, Clysterem emollientem cum multo Sale marino injici, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Nitrum ex Decocto laxante* exhiberi affatim, *Epi-spastica* largiora & acria Cervicibus admoveri.

Mane, Die Solis, omnia pejora, adeò ut vel Li-
quidi vel Solidi Deglutitio ferè impossibilis,
multò minus *Mannæ*, &c. satís ad Alvum sol-
vendam. Hinc Humeris Cervicibusque affixis
Cucurbitulis extractus est Sanguis ad 3x, Locis-
que scarificatis applicata Vesicantia, injectumque
acrius *Enema*; sed nec sic quidem ullatenus le-
vatum est Malum, imò jam Vox evasit stridula
valdè, etiam & subinde intercisa prorsùs; unde
de *Bronchotomia* suggessi aliquid; id verò qua-
si esset Hominem jugulare non servare muscita-
bant adstantes: timidulus factus, junior tunc
Medicus, destiti, ne Ægrotum occidisse viderer
nisi servàsem. Secta adeò rursus est Venà, ac
repetitum *Enema*: Jam paulò faciliior Deglutitio,
multòque minùs Doloris, ast Vox argutissima,*
subinde nulla; porrò *Dyspnœa* maxima, Anxie-
tas summa, Pulsusque vacillans admodum, sæ-
pe intermittens prorsùs cum Sudore frigidulo.—
Jam tandem mihi maximè poenituit neglectæ
Bronchotomiæ, satís superque percipiens Pulmo-
nes jam morbo esse obrutos penitùs, factâ *Meta-
stasi* lethali. Dum deliberavi quid ultra facien-
dum erat, Vir bonus, inscius, Alvum egeffit,†
mox Distentione nervorum correptus occidit;
vix elapsis triginta & sex Horis à primâ Morbi
Insulturâ.

Est utique funesti plerumque Eventus dum
augetur Spirandi Difficultas vanescentè subitò
Anginâ, Fauciumque Tumore; idque notat ab

* Ὁξυφωνία κλαυθμώδης, πονηρόν. Lib. 1. Prorrhetic. Sect. 6.

† Ὅσοι διὰ σφοδρότητα πνιγμοῦ, κόπριοι ἐξαιτίας διαχωρεῖσι θανά-
σιμον. Coac. Prænot. 7. Cap. de Angina ex Edit. Duretii.

Hippocrate * *Celsus*, “ Si Angina subito finita est, “ in Pulmonem id Malum transit, idque sæpe “ intra Diem septimum occidit.” — imò multò ante Diem septimum, si ruit Morbus ad Laryngem & Trocheæ Lacinias musculosas, primò scilicet, aut secundo aut tertio Die; id ipsum quoque monente divino Sene *Lib. Prognostic.* necnon *Coac. Prænot.* 1. Sect. de Angina *Edit. Dureti*: quinimò notante † *Aretæo* etiam eodem Die: nec mirum utiquè cum & præcludatur Spiritus, & Sanguinis per Pulmones Transitus. — Omni igitur Ope nitendum est ut ad extra Tumor vergat, admotis acribus Cataplasmatibus, imò acerrimo ad Collum antèrius applicato Vesicante; quod quidem, etsi haud usitatum, est tutum satis & valdè efficax Auxilium: Nec certè omninò spernendum est ‡ *Celsi* Consilium “ incidere satis altis Plagis sub ipsis Maxillis, supra Collum, & in Palato circa Uvam, vel eas “ Venas quæ sub Lingua sunt, ut per ea Vulnèra “ Morbus erumpat.” Atque hanc *Methodum* à *Cælio Aureliano* laudatam video, utcunque mollior plerumque *Methodici* tractabant Ægros. Venæ quidem sub Lingua in Angina sæpe secantur feliciter, at si vehemens urget Morbus, Febrisque itidem, non satis Sanguinis fundunt: ideo à Brachio priùs debita Quantitas emitti debet, rectèque monet || *Aretæus* ex largo Vulnere, & ad Animi ferè usque Deliquium, ut gravis Inflammatio nempe citiùs tollatur, ægrum aliter

* *Lib. 2. Cap. 7.* † Vide *Aret.* de Morb. acut. *Lib. 1. Cap. 7.* ubi accurata admodum habetur Anginæ Descriptio & Distinctio. ‡ *Lib. 4. C. 4.* || De Curatione Anginæ.

brevi suffocatura. Porro in graviore Casu suaderem Cucurbitulas scarificatas Cervicibus apponendas atque summis Humeris (Occipitio, Palis, & Pectori etiam vult * *Calius Aurel.*) mox his ipsis Locis *Epispastica*; Nihil enim negligendum est in tanto Discrimine, ubi quàm brevissimo Tempore de Vita agitur, & ubi sæpissimè parum valdè agendum est per Remedia Ore assumpta: Clysteres adeò laxantes, irritante quodam Sale adjecto, marino putà aut *Cathartico* communi, injiciendi sunt subinde—non quòd non Purgantia refrigerantia protinùs exhibenda sunt, si fieri potest, *Nitrosa* quoquè diluentia & *Emollientia* affatim, hausto interim Vapore tepido relaxante perpetim, Fauces etiam colluendo, ac fovendo, Liquore: Gargarisationes verò fortes & frequentes utiquè minimè laudo, quòd & Dolores augent & Inflammationem.

Est tamen quædam Anginæ Species ubi Gargarismata, imò & acriora, valent plurimùm, à Destillatione nempe falsâ & pituitosâ in Fauces & *Pharyngem*, quæ tument quidem plurimùm, at subalbidæ sunt & Muco plurimo obductæ; atqui Febris tantùm modica subest, Respiratio autem est satis difficilis & Deglutitio obstructa plurimùm. In tali equidem Casu non multâ Sanguinis Missione Opus est, sed *Epispasticis* & *Catharticis*: Spadet etiam *Elaterium Aretæus*; habemus tamen mitiora multò, at efficacia satis: Sinapi interim ex Mulso & Aceto coctum & idoneum facit Gargarisma & perutilem Vaporem, quodque mirè elicit Colluviem. Attamen fu-

* Lib. 3. C. 3.

gienda sunt omninò hæcce ubi magna subest Inflammatio, Ficus enim hîc & Nitri Decoctio ex Aqua & Lacte, melius multò est Gargarisma & tutius longè, etiam & haud inutilis Potio.

Sed hæc hætenùs de Anginâ; cujus quidem variæ cum sint Species * variam quoquè poscunt medendi Methodum. At ea sanè, quæ longis accedit Morbis, vel lentis Febribus, ubi nec Tumor est extrâ, nec in Faucibus aliquid conspicuum, sed aridæ sunt quodammodò & pallidæ, Sanguinis Dispendium & Alvi Purgationem minime fert, nedum indicat: *Cardiaca* contra idonea atque Victum instaurantem postulât, his enim solis si ullis, levatur Malum. Est tamen ut plurimùm certus Exitii Nuncius.

Plena Luna 12° FEBRUARIO. Nova Luna 26°.

Altam plerumque Stationem tenuit *Barometer* hoc Mense, etsi Libs sæpe furebat, Pluviâ quoquè haud parcâ cadente; immensa tamen *Atmosphæra* Densitas Mercurium sustinuisse videtur; porrò Corus interfuit sæpe, Subsolanus interdum. Vix ullum Gelu hoc, aut elapso Mense: Aër crassissimus semper ac humidissimus.

Pluvia $\frac{''}{1.}$ $\frac{'}{3.}$ $\frac{'}{5.}$ $\frac{'}{6-8.}$ $\frac{''}{9.}$ $\frac{''}{10.}$ 11. 13. 14.
 17. 18. $\frac{''''}{19.}$ $\frac{'}{26.}$ $\frac{'}{27.}$ 28 = 2,876. Dig. Dee.
 Maximus Halo circa Lunam 5. H. 9. p. m.
 Magna AB. 23. H. 7. p. m. E 1.

* De his Vide *Celsum*, Lib. 4. C. 4.—Necnon *Aretæum* de Morb. acut. Lib. 1. C. 7.

& Altitud. maxim. 23. 30,3. E 1. } media 29.8 $\frac{7}{8}$.
 ——— minim. 19. 29,4. S S W 1. }
 Dies frigid. 6. 59. N W b N 1^x. }
 ——— tepid. 27. 47. S W b W 3^x. } media 51 $\frac{1}{8}$.

Ophthalmia, Pleuritides & Peripneumoniae passim. Tumores Colli Fauciumque cum acerbo sæpe Dentium Auriumque Dolore valde frequentes: Haud rarò nascuntur in Meatu auriculari *Apostemata*, vel in Tonsillis, subinde *Parotides* diu dolentes, tandemque aliquando suppurantes.

Rheumatismus & Arthritis sævit maximè: *Variolæ* plurimæ.

Morbilli pustulosi, & maximè eminentes, admodum sunt *Epidemici*; at, nescio unde, magis funestos edunt Effectus quàm vel merè maculosi; mox enim ab Initio vehemens invadit Tussis, & perpetua ferè Sternutamenta cum maximâ ad Oculos Naresque Fluxione, protinùs ardens accedit Febris cum Delirio plerumque, & permagnâ Præcordiorum Oppressione; quæ fit etiam, Morbi Statu, multò violentior, adeò ut tunc Affectio sæpissime evadat prorsùs *Peripneumonica*. Hinc Stupor accedit, vel sævissimi Dolores *Colici*, sæpe *Dysenteria*; Tussis autem usque ingrayescit, unde haud rarò expuitur Sanguis, rupto in Pulmone Vasculo, interdum etiam ex Naribus plurimus effunditur—Sanguinis Missio *Colicam* æquè levat ac *Peripneumoniam*; pernecessaria est utiquè, sine quâ quidem vix aliquid proficit, post autem *Catbartica* lenia Morbi Reliquias expurgant feliciter, modò parvus sit Victus & idoneus. Plures equidem Pueros hic Morbus opprimit, vehementi Pulmonum Inflammatione

tione, aut lentâ Tabe & importunâ admodum Tussi consumptos.—Qui Artuum Lassitudinem* ac Dolorem graviter diuque plorabant, imminente Morbo, sævum admodum perpeffi sunt: quod in *Variolis* quoquæ sæpiùs notavi. An Humorū Acrimoniam indicat hoc *Symptoma*, an Globulos sanguineos in Vasculo Sero Sanguinis duntaxat idoneo impactos, &c.?

Plena Luna 14° *MARTIO.* *Nova Luna* 28°.

Et ineunte & exeunte Martio sublimis fuit *Barometer*, Ventus ab Oriente, aut Septentrione, per totum ferè Mensem, unde Sudum plerumque: atqui inter 14 & 25, subsidente Mercurio, Nix multa, Pluvia frequens & Grando, atque algida Tempestas: rigidum Gelu 18. 19. N E 1.

Pluvia 6. $\frac{1}{14}$. 18. 21. 22. $\frac{1}{23}$. 24. Nix 11. $\frac{1}{22}$. Dig. Dec.
15. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{18}$. 20. Grando 17. 22 = 1.512.
Magna AB. 1. H. 10. p. m. N E 1.—magna variata AB. 15. H. 7. N. b W. 2^x fuit tamen majore ex Parte Coloris Ferri igniti: hujus Radii lucidi vel à S W & S E jaculati fuere pone: maxima rursùs lucida versicolor AB. 30. H. 10. N b W 1. Centrum Coronæ (ut dicitur) certissimè ad Plagam orientalem Lineæ meridionalis divergebat per Gradus ferè quindecim, totidemque saltem ab ipso *Zenith* ad Austrum declinabat.

Altitud. maxim. 30. 30, 4. N b W 1. } media 29. 7.
minim. 22. 29, 1. E S E 2. }

* Ὁρεκόπος. Hippocrat.
C 4

Dies frigid. 16. 66. N b W 2. }
 — tepid. 31. 46. N b W 1. } media 55.

Morbilli adhuc *Epidemici*: *Variolæ*, *Ophtthalmiæ*, *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* plurimæ: non hîc tantum sæviunt omnes hi Morbi sed & undique *Tussies convulsivæ*, vehementes, suffocantes, *Morbillos* sæpe & *Variolas* insequuntur, quæ magnam sanè edunt Stragem. — Cum 4° ab Eruptione Morbillorum Die probè desquamatur Cuticula, quasi Furfure crassiore aspersa, læta Spes effulget; at parva certè, ubi Pustulæ lividæ, aut luridæ fiunt. Tunc autem *Epispastica* haud parcè admovenda sunt, & Frictiones calidæ per totum Corpus mox adhibendæ; intereà Serum Lactis vinosum, tepidum, sorbillandum est affatim, paucis *Sp. C. C. Guttis*, si languet Pulsus, instillatis.

Coryzæ, *Raucedines*, *Faucium Collique Tumores*, apud omnes ferè; haud pauci etiam Anginâ corripuntur, quæ tamen est plerumque mucosa, nec multâ Febre, nec magnâ Spirandi Difficultate stipata: *Parasynauchen* hanc Anginæ Speciem vocabant Veteres. Pendens autem à multâ Colluvie serosâ rectiùs *Epispasticis*, blandis Sudoribus, & Alvum purgantibus, discutitur, quàm largâ & repetitâ Sanguinis Missione; utcunque sit prudens, in ipso Morbi Initio, Venam secare: Hic etiam detergentia & paulò acriora Gargarismata proficiunt, quibus quoquè astringentis aliquid immiscetur utiliter. Sæpe equidem nimii sumus in *Emollientibus* ubi Fluxio serosa quasi Fauces inundat, quia plus Humoris ibidem invitant.

Longè

Longè tamen alia debet esse Ratio medendi ubi urget pestifera *Cynanche*, hìc enim plerumque Febris est acutissima, rubet tumetque Vultus, usque eò ut interdum etiam liveat, torvi sunt Oculi & inflammati, pulsant dolentque admodum Tempora; mox succedit Phrenitis, aut Stupor somnolentus, difficillimè trahitur Spiritus, imò vix respirare valent nisi prorsus erecti, protinùsque suffocantur nisi juvat cita, larga, & repetita Sanguinis Missio.

Plena Luna 12° APRILI. Nova Luna 26°.

Aquilo perflavit sæpissimè hoc Mense, interveniente subinde Cauro, interdum Vulturno, unde valdè frigida Tempestas: Nix, Grando, Gelu, frequenter per Initia, sub Finem Pluvia, spirante Austro.

Pluvia 1. 2. 7. 11. 15. 21. 22. 24. 25. 26.
 27. 28. 29. Nix 3. 4. 8. 9. Grando 8. 9.
 Dig. Dec.
 10. Acre Gelu 5. NE 2 = 1.698.
 Magna ignea AB. 20, H. 9, ENE 3, Procella
 8. N N W 4r.

8 Altitud. maxim. 11. 29, 8. NE 2. } media 29.4 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 24. 29, 1. SE 2. }
 Dies frigid. 5. 64. NE 2. } media 50.
 ——— tepid. 30. 44. SW b S 2, }

Ophthalmia, *Pleuripneumonia*, *Anginæ*, valde frequentes, multòque magis vehementes. *Varicellæ* grassantur plurimùm, at multò magis *Epidemici*

mici sunt *Morbilli* magisque etiam funesti.—
Tussi gravissimâ infestantur Pueri; febricitant
sæpe haud leviter, ægrèque admodum exantla-
tur tenax Pituita, unde haud pauci Distentione
Nervorum corripuntur: Missione Sanguinis le-
vantur & Usu *Oxymel. Scillit. Expressione Mille-
ped.* &c. Tempestas est valdè funesta Tabi-
dis. Longæ & difficiles *Apthæ*, ac Faucium
Ulcera pertinacia haud rarò febricitantibus * ac-
cidunt: *Hælicis* & *Phthificis* utiquè sunt certa,
imò & cita, Mortis Præfagia.

Febres tertianæ aliquæ; Arthritis & *Rheuma-
tismi* sævissimi.

Plena Luna 12° MAIO. *Nova Luna* 26°.

Mensis Initio Ventus ab Austro non par-
cam demisit Pluviam: à 13° Subsolanus sæpe,
mox Vulturnus, tunc Aquilo, Corus interdum:
15° Fulgur, Tonitru, Pluvia, Vento omni Mo-
do, & omni Hora, variante: 16° Aquilo ve-
lox, nulla Pluvia; Nocte tamen Vis immensa,
etiam inter Horam Noctis undecimam & Meri-
diem 17ⁱ, Pluviæ Digitus integer decidit, minimè
intereà subsidente Baroscopio. Perstitit Aquilo
ad 19^m; inde Ventus inconstans micante subinde
Fulgure: sub Finem Aquilo rursus, qui, con-
tra quod solet, fuit hoc Mense plerumque Au-
stro tepidior,

* Φάρυγξ ἐλαττωμένη, σὺν Πυρεσσι, δεινόν. *Hippocr. Prognostic.*

Pluvia $\frac{1}{1.}$ $\frac{///}{2.}$ $\frac{1}{3.}$ $\frac{1}{5.}$ $\frac{1}{7.}$ $\frac{1}{9.}$ $\frac{1}{10.}$ $\frac{1}{11.}$ $\frac{1}{15.}$ $\frac{1}{17.}$ $\frac{1}{18.}$

19. $\frac{1}{24.}$ $\frac{1}{30.}$ $\frac{1}{3.}$ $\frac{1}{210.}$
Dig. Dec.

Procella 2 Nocte S S E 4. Fulgur & Tonitru
18.

§ Altitud. maxim. 25. 30.0. NE 1. } media 29.5 $\frac{2}{9}$.
minim. 10. 29.2. S S W 3. }
Dies frigid. 2. 47. S b E 3^x. } media 38 $\frac{7}{9}$.
— tepid. 27. 28. E N E 1. }

Ophthalmia, Anginæ, *Pleuritides*, *Peripneumonia*, & veræ & spuria, frequentes: *Variolæ*, *Morbilli*, ac Febres *Miliares* passim. Tussis convulsiva plurimos infestat Pueros, aliquos protinùs suffocat. Plures solito à *Pleuripneumoniâ* malè judicatâ fiunt *empyici* *, rupto interdum in Latere Abscessu, haud rarò intra Pulmonem; qui faciliùs purulenta expuunt servantur, sin aliter brevì totus absimitur Pulmo, magnâ accedente Raucitate, & Gutturis Asperitate.—*Raucedo* frequenter utique Pulmonarios vexat, eaque pertinax admodum; quod fanè inter confirmatæ *Phthiseos* Signa rectè numeratur, nec profectò longè Mors abest si *Apt hæ* accedunt, aut Gutturis Ulcera: pertimescenda est adeò in Morbis Pulmonum Raucitas, maximè si viridia sint Sputamina aut quasi cœnosa.

* De Signis Empyematis perlege *Hippocr. Prognostic. & Libri, de Locis in Homine, Sect. 28.*

Plena Luna 10° JUNIO. *Nova Luna* 25°.

Infauſta, pluvia, frigida Tempeſtas toto ferè Junio, Ventus ab Occidente plerumque, ad Auſtrum ſubinde vergens, haud rarò etiam ad Septentrionem.

			$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{15}$	18—
Pluvia	1.	2.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	15.	18—
			$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{23}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{26}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{30}$	—
	20.	23.	24.	25.	26.	27.	30.	= 4.218.		

Fulgur & Tonitru 5° Noctu. *Levis Procella* 26 Mane S S W 4x.

Altitud. maxim.	16.	29.8.	N N W	1.	} media 29 4 $\frac{1}{2}$ °.
minim.	10.	29.0.	S S W	3.	
Dies frigid.	3.	38.	N b E	1.	} media 32 $\frac{1}{2}$.
tepid.	29.	27.	W N W.	1.	

Variolæ & *Morbilli* adhuc frequentes : Febres *Miliares* compositæ (ut dicuntur) haud raræ : Multos torquet *Rheumatismus*, & Laterum Dolor ; nec paucos opprimit *Peripneumonia*, at plerumque notha. Tussis sæviſſima paſſim apud Pueros, quæ vix ſedatur niſi poſt Vomitus frequentes, & repetitas *Rhabarbari Doſes* ; tunc verò *Decoſt. Cortic. Peruviani* brevè fugatur.

Plena Luna 9° JULIO. *Nova Luna* 24°.

Perdurat uſque frigida, ac humida Tempeſtas, Aër plerumque craſſus valdè & nebulofus, Pluviæ quidem plus ſatis ; unde Fructus *ωπαίσι* crudi proſuſ & inſuaves. Ventus ab Occidente prævaluit, ad Auſtrum ſæpe ſelectens, ſæpiùs tamen ad Septentrionem, interfuit Boreas interdum,

dum, aliquando Malacia.—Raræ admodum Papilioes, rarissimæ Cicadæ.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 1. 3—5. 9. $\frac{1}{1}$ 10. $\frac{1}{1}$ 11. $\frac{1}{1}$ 12. $\frac{1}{1}$ 13. $\frac{1}{1}$ 14. $\frac{1}{1}$ 15.
 $\frac{1}{1}$ 18. $\frac{1}{1}$ 25. $\frac{1}{1}$ 27. 28. 29. $\frac{1}{1}$ 30. $\frac{1}{1}$ 31.—3.172.
 Fulgur & Tonitru 12 a. m. Malacia.

§ Altitud. maxim. 20. 30, 1. N b W 1^x . } media 29.6 $\frac{1}{2}$.
 ——— minim. 11. 29, 2. W S W 2^x . }
 Dies frigid. 13. 40. N N E 1 } media 31 $\frac{2}{5}$.
 ——— calid. 23. 24. Malacia. }

Variolæ epidemicæ, haud tamen valdè lethales, *Morbilli* aliqui, *Tussis convulsiva* atrox adhuc: Diu duravit Angina quædam *apthosa*, quæ omnibus penè Morbis acutis accedit, præcipuè pustulosis; jamque etiam *peripneumonicos* vexat.—Molestum sanè, ac sæpe periculosum est *Symptoma*, ubi in Febribus Membrana Faucium inflammatur, ac Pustulis obsidetur: Paucae utiquè *Variolæ*, in ipso Faucium Isthmo, multò plus nocent quam mille extrà.

Plena Luna 7° AUGUSTO. Nova Luna 23°.

Prior Augusti Pars fuit læta satís, posterior infelix admodum Pluviâ ferè perpetuâ cadente, quæ Segetes corrumpit maximè: *Atmosfera* porrò, quæ vigesimum usque fuit sicca satís, jam facta est crassissima ac humidissima, Libs interea perflavit; Corus autem prævaluit Initio.

Pluvia 1. 2. 5. 6. $\frac{1}{1}$ 12. $\frac{1}{1}$ 21. $\frac{1}{1}$ 22. $\frac{1}{1}$ 23. $\frac{1}{1}$ 24. $\frac{1}{1}$ 25.
 ——— $\frac{1}{1}$ 27. $\frac{1}{1}$ 28. 29. $\frac{1}{1}$ 30. $\frac{1}{1}$ 31.—2.016.
 Dig. Dec.
 Fulgur

Fulgur & Tonitru 23. Permagus igneus Halo circa Lunam 5 H. 10. p. m. W 1^x. Procella 21 Nocte S S W 4^x—24 Nocte S W 4^x—26 Nocte S W 4.

§ Altitud. maxim. 18. 30.0. N 1. } media 29.6²/₃.
 ——— minim. 29. 29.2. S W b W 3. }
 Dies frigid. 31. 42. W N W 2^x. } media 31¹/₃.
 ——— calid. 15. 20. N N W 1^x. }

Variolæ epidemicæ, *Tussis convulsiva* adhuc frequens, præsertim in *Cornubiâ* citeriore: Anginæ, & *Peripneumoniæ* nothæ passim, multis Pustulis, rubris & aquosis, Statu Morbi, erumpentibus, iisque plerumque salutiferis. *Rheumatismus* vexat Plurimos, qui multò nunc fælicius *Catharsi* cedit quàm Venæ Sectioni.

Magnus Languor omnes opprimit; imò vel Aviculæ contristantur, filet ipsa Cicada.

Plena Luna 6° SEPTEMBRI. *Nova Luna* 21°.

Pluviosus porrò ac frigidus sequitur September; Libs furibundus sæpe ineunte Mense, post xvi Vulturinus plerumque, intercurrente nonnunquam Malaciâ—Nimio Squalore obruta tabescunt plurima Frumenta.

Pluvia $\frac{///}{1}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{7}$. 8—10. $\frac{1}{11}$. 12. 15. Dig. Dec. 17. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$. 22. 26. 27. 28. 30 = 3.452.

Levis Procella 3 Noctu S W 4^x—gravis 10 Nocte S W 4^x—11. a. m. W S W 4.

Fulgura & Tonitrua 7 Nocte—Fulgura perpetua sine Tonitru 10 Vesperi—21 Vesperi—perpetua sine Tonitru quoquè 23 ab Horâ 6 p. m. ad

1739.] & Morbis Epidemicis.

31

m. ad mediam Noctem & ultra. AB. 12 & 13.
Horâ 8â p. m. N W b N i.

§ Altitud. maxim. 14. 29,8. NNE 1. } media 29,5³.
— minim. 11. 29,0. W S W 4. }
Dies frigid. 14. 48. }
— tepid. 22. 32. SSE 1. } media 38².

Variola usque vagantur, hîc autem benignæ
fatîs sunt, aliis tamen in Locis haud rarò lethales.
Tussès *convulsivæ* etiamnum frequentes : Febres
lentæ *nervosæ* atque *miliares* passim, aliquæ etiam
putridæ, aliquæ intermittentes.

Icterus & Hydrops, jam sæpe quidem unitis
Viribus, plures opprimunt.

Tussès plurimæ, Fauciumque Tumores, Col-
li *Parotidum*, Maxillarum, levi sæpe cum An-
ginâ, ubique permolesti sunt.

Plena Luna 5° OCTOBRI. Nova Luna 21°.

Ab ultimo Septembris Diem ad usque vicesi-
mum secundum Octobris Boreas perflavit assi-
duè, unde sublimior *Barometri* Statio, & sicca
Tempestas ; porrò inter xiv & xxiii frigida val-
dè : sub Finem Mensis infremuit pluvius Vultur-
nus. Gelu rigidum 18.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. 28—31.
Dig. Dec.

Grando 28—1. 516.

Procella 29—30. SE b S 4. AB. 19. H. 8. p.
m. ENE 1.

§ Altitud. maxim. 8. 30,3. ENE 2^x. } media 29. 7³.
— minim. 31. 29,1. SE 3^x. }
Dies

Dies frigid. 18. 65. ENE 2.

— tepid. 1. 44. NNE 1.

} media 52½.

Ubique ferè dominantur *Variole*, plerumque tamen sunt benigniores. Febres aliquæ putridæ, intermittentes aliquæ, ceu potius remittentes, quæ faciliter *Eccoproticis* lenibus abiguntur, epoto subinde *Haustu salino* cum *Corticis Peruviani* tantillo—*Ophthalmiæ*, Anginæ, Coryzæ, Tussis humidæ, creberrimæ; *Pleuritis*, ac *Peripneumonia*, & vera & notha, frequens.

Spuria *Pleuritis* plerumque nihil aliud est quàm Affectio Musculorum externorum Pectoris, quæ *Rheumatismi* utiquè Species est; at ubi ipsum Costarum *Periostæum* inflammatur, Dolor sæpe vehementer urget, & pertinax admodum, unde Respiratio haud rarò impeditur maximè * — atqui jam ex facili discutitur, molli existente Pulsu, Fomentis idoneis, & leni *Catharsi*.

Plena Luna 4° NOVEMBRI. *Nova Luna* 19°.

Ipso Mensis Initio gravis decidit Pluvia, Austro fremente; à vi ad x Aquilo frigidissimus prævaluit, mox Vultur Diem ad usque xvii durans; frigidus hic quoquè, ac sæpe nimbosus & pluvius. xxi Vesperis gravis irruit Procella, Libanoto furente vehementer, dum per plurima corrui Pluvia; duravit hæc per integrum ferè Triduum, quo maxima fuit, imò & insolita, *Baroscopii* Depressio, Æstus autem Maris immensus†: ad Finem verò Caurus *Mercurium* erexit.

* Vid. *Essay on Fevers*, Cap. de Pleuritide.
Vid. Vol. I. p. 18.

† De his
Pluvia

Pluvia $\frac{''''}{1.}$ $\frac{'}{3.}$ 4. 5. 7. 8. $\frac{'}{11.}$ $\frac{'}{12.}$ $\frac{'}{13.}$ 14. $\frac{'}{15.}$
 $\frac{'}{17.}$ 19. 20. $\frac{''''}{21.}$ $\frac{''''}{22.}$ $\frac{''}{23.}$ $\frac{'}{24.}$ 25. $\frac{'}{26.}$ $\frac{'}{27.}$ 28.
 $\frac{''}{29.}$ Dig. Dec.

Grando 23 & 29 = 4,574.

Levis Procella 12 Nocte S E b S 4. Procel-
 la 21 Vesperi S S W 4 — totâ Die 22 S W b
 W 4^x—23 Mane S W 4. Fulgur & Tonitru
 21 Nocte—23 Nocte.

§ Altitud. maxim. 14. 30,1. S E b E 3. } media 29,4 $\frac{12}{8}$.
 ——— minim. 23. 28,2.

Dies frigid. 10. 70. N N E 1. Gelu valdè rig. } media 58 $\frac{10}{30}$.
 — tepid. 1. 48. S 3.

Pleuritides & Peripneumoniæ, & veræ & spu-
 riæ, haud infrequentes, nec Febres *nervosæ*, ac
miliares; præcipuè in *Cornubiâ*: Crebra Tussis
convulsiva inter Pueros. Anginæ & Tumores
 Faucium *Paretidum*, ac Maxillarum undique,
 qui sæpe suppurantur & intùs & extrâ.

Variolæ epidemicæ hîc, & ubique, jamque mul-
 tò peioris sunt Notæ, sæpe cum lividis & nigris
Petechiis, sæpe sessiles sunt prorsus & subnigræ,
 sæpe vacuæ omninò, sæpius acri admodum ac
 crudo *Ichore* turgidulæ: Plures sanè jugulant:
 Qui evadunt plurimis molestissimis Furunculis
 & Ulcusculis frequenter admodum infestantur—
 Haud rarò immensa fit, ipsis primis Morbi Die-
 bus, *Salivatio*, tenuis quidem ea & acris maximè
 unde Fauces & totum Os mox exulcerantur.
 Semper mihi suspectus est utiquè præmaturus
 hic & crudus Fluxus*, Tædii quippe plurimum
 Ægrotis ac Doloris facit, arcetque protinùs Som-

* Vid. *Essay on Fevers*. C. de Variolis, p. 145.

num; unde nec faustè replentur Pustulæ, nec maturantur bene. Porro magnam hoc Sanguinis indicat Acrimoniam; quod quoquè valdè frequens Sternutamentum denotat, & enormis Narium ac Oculorum Fluxio: unde hæc rectè inter mala Signa ponuntur—Nihil huic Malo succurrit magis, imò & sæpe occurrit, quàm tempestitiva, summos inter Humeros & pone Aures, *Epispasticorum* Applicatio, quibus acris evocetur Humor.

Plena Luna 4° DECEMBRI. Nova Luna 19°.

Tempestat hoc Mense fuit planè mirabilis; ad Initium Boreas, regidum Gelu, mox pluvius & turbidus Auster, paulò post Libs furens, multaque Pluvia, surgente tamen Baroscopio: xiv ac xv Corus, xvi Boreas Geluque recurrunt: xix & xx Vulturus velox; Libs iterum nimbosus xxi; inde Euris ad xxviii, intercurrente tamen Boreâ perfrigido xxv & xxvii: Hinc sævissima Procella ab Oriente ad Finem usque cum rigidissimo Gelu & Nive perpetuâ minutissimâ; brevi omnia penetrabile Frigus adurit intus atque foras, vel generosissima Vina congelans; quicquid Aëri expositum est dicto citius congeliat—ad Ignes luculentos rigentes, etiam in Lectulis algidi, adeò ob Frigus horrendum torpemus ut vix ferè simus vitales.

Vehementissima Tempestat ad Finem Decembris perplurimas Aves & Aviculas abs Terrâ abripuit, illasque ad immensam à Littore Distantiam abegit; quæ defessæ prorsus perlongo Volatu ad Naves se contulère medio in Oceano, & à Nautis erant facillimè captæ: Mirum utique Genus Aucupii!—Ipse vidi, Januarii sequentis Initio, fortè tunc visitans nobilissimum *Comitem Delo-*

Deloraine, in Navi præfidiari (*the Weymouth*) ægrotantem, Artocream ex Aviculis confectam, quas Nautæ in Reditu ab Olyffipone ad Portum nostrum captâverant, longè longèque ab ullâ Terrâ.

Pluvia $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{4}$. $\frac{111}{5}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{12}$. $\frac{11}{13}$.
Dig. Dec.
14. 15. 20. 21. 22. 23. 24 = 4.102.

Multa Pluvia 21. 22. 23. etfi *Barometer* erat ad 30.1. Libs porrò perfurebat, atqui Aër fuit longè crassissimus ac humidissimus, immensâ scilicet Vaporum Copiâ per *Atmosphæram* diffusâ.

Non potui Nivis Quantitatem æstimare, quippe quæ fuit à Vehementiâ Ventorum è Recipiente diffiata.

Altitud. maxim. 16. 30.2. NE 1. } media 29.8.
minim. 4. 29.1. SSW 3^x. }
Dies frigidissima per Hominum Memoriam }
31. 90. ENE 4^x. } media 61 $\frac{26}{8}$.
— tepida — 10. 52. SWbW 3^x. }

Febres *miliares* & *nervosæ* aliquæ, Variolæ passim, Anginæ & Ophthalmiæ crebræ: Tussés, *Rheumatismi*, *Pleuritides* ac *Peripneumoniæ* sunt frequentes.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXXXIX
Dig. Dec.
= 36.308.

Plena Luna 2° JANUARIO. Nova Luna 17°.

Perfistit adhuc frigus enorme, quale quidem in hac Regione haud perceptum fuit antehac unquam: Primo licèt Mensis Die maxima fuit Nivis Solutio, decidente Pluviâ, mox tamen recurrit Boreas, ac Gelu acerrimum, ad Finem us-

que Mensis perdurans—Quamvis enim omnia Solis Ardore liquantur interdiu, constringuntur Noctu rigidissimo Gelu. *Atmosphæra* fuit plerumque crassa valdè & veluti offuscata Fumo, inter x verò & xvii tenuissima. Dies frigidissimi erant 11. 15. 16. 17. 18. 26. 27. 28; adeò sævum regnabat Frigus ut Vina omnigena, foràs exposita, mox congelarentur; imò ac vel ipsum ad Littora Mare, quod utique hìc accidit rarissimè. Plantæ & Arbores innumeræ pereunt, vel & ipsæ duræ Genistæ, vix vides viridem Herbam. Innumerabiles huc advolant Aves aquaticæ, perplurimæ etiam ab exteris Regionibus, vix unquam hìc visæ.

Dig. Dec.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 2. 9. Nix & Grando 8.9=0.416.

Nullum vidi Lumen boreale toto hoc Mense, etsi Ventus ferè perpetuus è Septentrione spiravit.

§ Altitud. maxim. 14. 30.4. ENE 2. } media 30.1 $\frac{1}{3}$.
 ——— minim. 1. 29.1. SW 2.

Dies frigidissimus 26. 84. NNE 1. } media 75 $\frac{1}{4}$.
 — tepidus 31. 69. SE bE 3x.

Variolæ adhuc *epidemicæ* sæpe parvæ sunt admodum, sessiles & subnigræ, sæpe lethales; Ægroti, his correpti, parum tument, perpaululum expuunt, unde non rarò 8, aut 9 Die suffocantur. Perpetuum est ferè, quod per siccas ac frigidas Aëris Constitutiones, diu durantes, *Variolosi* parcissimè expuunt*; unde tali prævalente Tempestate suaderem Gargarisationem emollientem ac frequentem, Potus tepidos, relaxantes, continuos, Vaporem aquæ tepidæ, aut Lactis dulcis,

* Vide *Essay on Fevers*, p. 145.

Ore haustum, ut per hæc, laxatis Fibris, attenuato Sanguine, referatis Salivæ Ductibus atque absterfis, eliciatur *Salivatio* libera, quæ in hoc Morbo maximi semper est Momenti.

Tumores Faucium, *Parotidum*, Tonfillarum, &c. apud omnes ferè, qui & Tussi quoquè vexantur & acri Destillatione. Anginæ, *Odontalgie*, *Pleuritides*, *Peripneumoniæ*, sunt undique frequentes. Perniones innumeris molesti sunt, sæpe etiam in Adultis ulcerant.

Febres lentæ, *nervosæ* aliquæ, aliquæ *miliares*; *Asthma* grave admodum sævit plurimum, haud paucos Senes jugulat.

Plurimi in Viciniâ, & hîc quoquè, Tumore Faucium, Colli atque Capitis corripiuntur, mox Inguinis & Testiculorum Dolore acuto, ac Tumore: hunc Morbum tamen Sanguinis Missio, & lenis Alvi Purgatio, ex facili discutit—Sanguis subflavo Glutine, haud autem valde tenaci, obducitur.

Plena Luna 1° FEBRUARIO. *Nova Luna* 16°.

Siccus quoquè & frigidus va'dè fuit hic Mensis, utcunque enim per Initia Vulturius Brumam asperrimam temperavit aliquantulum, reddiit tamen mox Aquilo cum durissimo Gelu: Ad Finem verò Ventus australis spirabat, qui pluviam fecit *Atmosphæram* ac multò tepidiorem. *Barometer* altam tenuit Stationem toto Mense: Aër fuit interdum pertenuis, plerumque tamen crassus valdè & fumosus, intercurrente subinde Malaciâ: Maximæ sæpe sæpiùs Pruinæ; medio nempe Die à Solis Fervore relaxata Terra plurimos exhalavit Vapores, quos Frigus noctur-

num mox condensavit, imò & gelavit Formâ Pruinæ.—Mare ad Littora sæpiùs congelatum fuit hoc Mense.

Pluvia 16. 19. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. 28. 29. Nix ali-
Dig Dec.

qua 12 = 0.482.

AB. 11. H. 8. p. m. N. 1^r. Enorme Frigus
14; Thermom. 84.

8 Altitud. maxim. 23. 30,5. ENE 1. } media 30.1 $\frac{2}{3}$.
minim. 28. 29,8. SW 2.

Dies frigidissima 14. 84. ENE 2^r. } media 68 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 29. 56. SSE 2.

Pleuritis, Peripneumonia, Angina, Rheumatismus, maximè frequens undique; missus ex his laborantibus Sanguis crassus est valdè & glutinosus, parùm habet Seri sublutei. Per plurimi *Tussi, Catarrho, Asthmate* sævo premuntur: Multi *Xerophthalmiâ* laborant. Innumeri, etiamque Seniores, Pernionibus dolentibus, aliquando exulceratis, cruciantur. Febris quædam *Catarrhalis* cum acuto Capitis Dolore & Vertigine, accedente etiam aliquando *Pbrenitide*, multos detinet—*Phtibisici* & *Asthmatici* jam pessimè se habent—*Variolæ* adhuc passim.

Scabies fœda jam regnat undique inter Populum.

Plena Luna 2° MARTIO. Nova Luna 16°.

Perstat usque alta *Mercurii* Statio, Aër crassus valdè & frigidus plerumque, Malacia frequens, præsertim Mensis Initio. Primo Die, flante Vulturno, multa decidit Pluvia, post autem

tem Ventus inter N W & N E constitit: Gelu sæpe hoc Mense & maxima Pruina.

Pluvia ^{///} 1. 3. [/] 5. 7. 11. [/] 14. 18. 23. 26. 27.
Dig. Dec.

Grando 12 = 1. 278.

Circius vehemens 8 Mane. Magna AB. 12.
H. 9. N N E 2. levis AB. Vesperi 13 N N W 1.
— 14 H. 9. N W 2: Perfrequenter sanè notavi
AB. per duas, tresve Noctes consequentes Vento
à Plagis Septentrionalibus spirante.

§ Altitud. maxim. 30, 30.3. N 1x. } media 30.0⁴/₁₁.
— minim. 1. 29.7. SE b E 1x. }
Dies frigid. 13. 67. N N E 1. } media 55⁸/₁₁.
— tepid. 18. 51. N W b N 1. }

Anginæ frequentes & Faucium Tumores;
Rheumatismi multi, & gravis sæpe Arthritis: *Va-*
riolæ adhuc. *Asthma* sævissimum, diuque admo-
dum durans, permultos premit; plures *Phthisi-*
ci moriuntur. *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* plu-
rimæ, perrarò autem Sanguinolenta expuuntur,
ne liberè quidem & copiosè aliquid, unde haud
parùm in Morbo Discriminis.

Sanguis, ex omnibus *Pleuriticis* & *Rheumaticis*
missus, est densus valdè & tenax, & non Sero sa-
tis imbutus.

Nescio unde, sed per plures Menses, Juniores,
atque etiam haud pauci Adulti, Lumbricis tere-
tibus infestantur, qui per Morbos sæpissimè de-
jiciuntur—An à corrupto Frumento *, necnon
immaturis & crudis Fructibus, Progenies hæc
verminosa?

* Vid. Mens. August. Anni 1739.

Plena Luna 1° APRILI. Nova Luna 15°.

Siccus fuit hic Mensis & frigidus maximè, stetit plerumque Ventus Orientem inter & Septentrionem, Malaciâ interdum interveniente; Pruina sæpissimè, & nonnunquam Gelu, ad xv Nix sæpe, & Grando pòst; permansit Nix super Montes ad xxvi usque.

Pluvia 8. 12. 13. 14. 25. 26. 29. Nix 20.
Dig. Dec.

21. 22. Grando 26. 27 = 0.802.

Levis Procella 23 p. m. NNW 4x.

Dies frigid. 14. 62. ENE 2x. } media 51 $\frac{3}{27}$.
— tepid. 19. 45. NNW 2. }

✕ Altitud. maxim. 17. 30. 2. Malacia } media 29.8 $\frac{2}{27}$.
— minim. 12. 29. 3. E 2. }

Perdurante adhuc eadem Aëris Constitutione, iidem prorsus sæviunt Morbi, jamque multò sunt severiores; pereunt permulti Ruri & in Opido.

Morbis acutis jam sæpe accedunt *Petechie*, etiam ipsis *Peripneumonicis*, hoc tamen accidit præcipuè inter Nautas; Horum verò Sanguis parùm glutinosus est, sed magis putridus, ac lividus quasi, ejusque Serum aut viride est, aut turbidum maximè ac veluti Luto foedatum; purulenta quoquè protinùs expuunt & persæpe fœtida: à *Scorbuto* * forsan hæc, qui longè longèque, his in Oris saltèm, dominatur.

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 211.

Variolæ passim, & *Pleuritis* quædam acerbissima, quæ haud paucos jugulat More *parapneumotico*, quarto vix elapso Die; horum Sanguis extractus merum ferè Gluten refert.

Plena Luna 30^o ult.

Nova 14^o.

MAIO. Plena Luna 30^o.

Permanet usque sicca atque frigida Tempestas, Ventus ferè perpetuus ab Oriente, flectens plerumque ad Septentrionem, ad Austrum etiam aliquando, sæpe velox, mox tamen omninò filens, maximè sub Noctem, insolitum & planè stupendum fuit Frigus pro Anni Tempore Die v, vi, & vii Mensis; imò haud parùm Nivis decidit quinto.—*Atmosphæra* fuit perquam crassa, etsi tam Pluviæ parùm decidit.

Pluvia 4. 5. 12. 14—17. 20. 23. 26. Nix

Dig. Dec.

5. Grando 4. 5. 6 = 0.538.

Procella 25. a. m. E 4. AB. 27. Vesperi N W b W 1.

Ø Altitud. maxim. 9. 30, 1. NE 1.

— minim. 4. 29, 3. NNE 2^x. } media 29.7 $\frac{1}{2}$.

Dies frigid. 6. 62. N b W 2.

— tepid. 30. 32. Malacia } media 42 $\frac{2}{3}$.

Perfurunt usque Febres pulmonariæ, magisque multò jam sunt malignæ Maculis nigris, lividis, fuscis sæpe stipatæ; dolent vehementiùs Caput Dorsumque, Præcordia premuntur maximè; nunc quoquè semper ferè accedit Phrenitis effera, ac persæpe Angina quædam ulcerosa vel ab ipso Initio, totas Fauces sensim perreptans: Vel
cruda

cruda prorsus, vel saniosa expuunt: Cruda, lurida, turbida Urina, pessimè significans, Nihil unquam deponit. Faustè interdum, sub Morbi Finem, Pustulæ erumpunt & Furunculi—sæpe verò jugulat Ægros hic Morbus, dira Anxietate jactatos, perpaucos intra Dies, More quasi *Paraphrenitidis*; imò etiam haud rarò *Hepatitis* correptos: nam & Situs Doloris & Color ictericus & intensa Urinæ Flavedo hoc indicare visa sunt.

Jamque etiam grassatur Febris putrida *petechialis*, quæ plurimos Nautas Orco demittit atque inter Popellum multos. Hæ febres sæpe complicatæ videntur & unitis Viribus sæviunt, pulmonaria nempe atque *petechialis*.

Variola nunc magis frequentes sunt, ut plurimum tamen mites, licèt parcè admodum expuitur: At discreti sunt plerumque Generis, quod mirum utiquè videtur, quandoquidem alii Morbi acuti Monstri jam quid maligni alunt.

Tussis vehemens inter Equos cum Anginâ suffocante & Febre plures obruit; imò & bubulum Pecus tali etiam effectû sæpe abripitur.—Grex lanigera summâ Macie & aridâ Tussi maximè laborat; pereunt Oves innumeræ, quarum omnium Jecur tumet multum & indurefcit, Vesicula Fellis autem, subatrâ Bile turgida, ad enormem crescit Magnitudinem.

Nova Luna 13° JUNIO. *Plena Luna* 28°.

Major fortè nunquam observata fuit Siccitas, Fontes arescunt prorsus, & Flumina desiccantur; *Pabula canescunt, cum Frondibus uritur Arbor*; Ov. Quamvis *Hygrosopia* omnigena siccissimam Aëris Tem-

Temperiem denotant, tota *Atmosphæra* tamen crassa valdè & fumosa quasi apparet — unde utiquè nescio, ni deficit forsân sufficiens in *Atmosphæra* Humor ad regularem Luminis Transmissionem — Sic Corpora quædam videmus, quæ, humectata, pellucida sunt, arida verò opaca prorsus. — Subsolanus à i ad v; à xix iterum ad xxv; cæterum Corus plerumque, haud rarò etiam Libs.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{7}$. 8. 10. 11. 13. 24. Grando
Deg. Dec.
multa 7. p. m. = 0.742.

§ Altitud. maxim. 18. 30.2. Malacia }
—— minim. 7. 29.3. SW b W 3. } media 29.7 $\frac{2}{3}$.
Dies frigid. 12. 42. SW b W 2. }
—— calid. 25. 25. SE b E 1. } media 33 $\frac{1}{8}$.

Durat adhuc Febris *pneumonica*, quam sæpissimè comitantur *Petechiæ* — Sanguis in hoc Morbo detractus lividus valdè imò & ater conspicitur, ac plerumque nimium solutus *, haud rarò sane prorsus saniosus.

Variolæ frequentiores, sed ut plurimum benignæ Indolis. — Febricula quædam cum Pustulis rubellis & valdè urentibus, quæ per ipsa Morbi Initia erumpunt, perfrequens; levis tamen videtur & evanescit citò magnâ Cuticulæ Asperitate relictâ.

* In Febre *peticulari* epidemica, quam accuratissimè descripsit *Ramazzini*, Sanguinem semper roseum, purpureum, solutum, invenit, minimè verò glutinosum. vid. *Ramazzini* Constitution. Epidem. Ann. 1692, &c. Sect. 27, 47.

Febris nautica pestilentialis jam sævit maximè; en hujus Historiam.

Ineunte Vere ad hunc Portum appulsæ sunt Naves duæ bellicæ (*Panther & Canterbury*, quarum posterior mox à Mari *Mediterraneo*) ex his Ægroti plusquam ducenti ad Terram protinùs delati sunt, horumque Pars major Febre malignâ, imò pestilente laboravit; hinc in Vulgum quoquè sparsa maximam edidit Stragem.—Nec vana forsàn fuit Suspicio has quidem Naves Pestilentiâ quâdam per *Africas Oras* tunc longè latèque grassante, attactas fuisse, quoniam has inter & illas frequens fuerat *Commercium*.

Levis Rigor primò corripuit Ægros, mox subitus Ardor incerto prorsus Ordine; Pulsus intereà fuit admodùm inconstans, nunc incitatus valdè, nunc mirè depressus; accessit proinde *Gravedo Capitis*, aut *Dolor acutus*, sæpe *Occipitis*, sæpe *Sincipitis*, sæpiùs autem in *Temporibus*, aut paulò supra *Oculos*, qui quidem longè vehementior—perdolebant etiam ipsi *Oculorum Globi* *Luminaque* refugiebant: *Sopor* interim perpetuus urgebat, at parcus admodùm aderat reverà *Somnus*, *Tinnitu Aurium* semper molestante aut *Vertigine* gravi. *Fœdus* valdè & amarus in *Ore Sapor* *Vomitiones* excitabat frequentes & biliosas admodùm, multâ tamen permistâ *Pituitâ*. *Lingua* ferè subflava erat, aut fusca & sordida, rarò autem valdè arida, medio autem scabra. Jam extemplò plurimùm debilitati discumbunt, anxii tamen & quasi perterrefacti, errantibus per omnia *Membra* huc illuc *Doloribus*. *Urinæ* tenues, crudæ, aquosæ, aut luridæ, sæpe tamen rutilæ, ceu tantillum inesset *Sanguinis* intimè permixtum, aut fortissimum aliquod *Lixivium* referentes; par-

parcæ hæ & tenues semper, & Nihil prorsus deponebant :—Mali admodum Ominis nunquam non omnes has notavi Urinas.

Hæc quidem inter Morbi Initia, exactis autem tribus, quatuorve Diebus in pejus multò ruebant omnia ; jam enim vehementius ardet Febris, mox Phrenitis accedit, aut *Coma* Vigil, cum torvo Aspectu & fulvo oculorum Rubore ; Jactatio perpetua, Anxietas summa, vix vel ipsis astantibus tolerabilis ; sæpe Furor immanis, levis sæpe Desipientia aliena subinde murmurans.

Petechiæ violacæ, lividæ, fuscæ, imò & ipsæ nigræ, sextum inter Diem & undecimum fæpissime prodibant, nunc citius, nunc tardius ; quò magis floridæ eò melius ; fuscæ tamen quasi Cutis Lenticulæ, parvæ, innumeræ, malè semper significabant, at pessimè omnium Vibices, & Ungues atque summi Digiti lividi* aut plumbei—Funestum utique semper est hoc ultimum in Morbis acutis, indicat enim stagnantem in extremis Arteriis Sanguinem—bonum verò omninò ubi vividus adest Unguibus Color :—Medici est igitur hos etiam diligenter inspicere.

Adfuit vel ab Initio permagna Præcordiorum Oppressio, quæ aucta quotidie cum stringente quodam (hoc enim semper plorabant) Cordis Angore, & Respiratione tremulâ & singultiente quasi (imò sæpe diro cum Singultu ac Languore summo, haud rarò ad Deliquium usque) maximum portendebat Discrimen ; cum & jam quoquè Tremores, Subsultus Tendinum, Capitis Vacillatio, incerti Rigores, frigidique Sudores ingru-

* *Essay on Fevers*, p. 98.

erent—Pedes erant sæpe frigidissimi, dum Facies, Genæ præsertim, magno flagrabat Ardore, profusus interea & valdè foetidus Sudor manabat Talos ad usque; Pulsus interim exilissimus erat, at quàm citissimus: jam jamque instabat Mors.

Frequenter autem *Diarrhæa* foedissima Miseros colliquabat, arida prorsus facta ac durâ Cute, Corrii ad instar, dum Lingua, quasi fuerat indurata Fumo, rigebat, impos ferè Motus, nedum Loquelæ. Haud rarò etiam in summo Morbi Statu *Apthæ* subnigræ, ulcerosæ, totas Fauces cruciabant Gulamque, quas paulò pòst perpetuus infequebatur Singultus; Saniosa inde, aut *gangrænosa*, *Dysenteria* Ægrotos brevì conficiens—Levis attamen obrepens Alvi Fluxus circa undecimam, ceu Arte, ceu Sponte eveniens, Saluti fuit plurimis, modò nec lividus, nec liquidus nimium.

Jam nunc quoque (Morbi nempe Statu) interdum maximum attulit Levamen larga Pustularum Eruptio, More veluti Variolarum, quæ tamen nil nisi tenuem & acrem *Ichorem* continebant *—erumpebant etiam aliquando multò minores, at urentes admodum, quæ verò in Squamas mox abirent: salutiferæ quoquè & hæ. In quibusdam peralbas quasdam & latas Maculas notavi, paulò eminentes, quasi ex Urticæ Morfu; hæ verò difficilis Indicium.

Erant verò Ægrotantes plurimi ubi nihil horum planè, sed aut *Parotides*, aut Tubercula, aut in Auribus *Apostemata*, eos sublevabant: omnibus erat ferè magna Surditas, diu durans.

* *Φλύκταινες* veterum Medicorum.

Multis fuit Narium *Hæmorrhagia* salutaris, at pessimum ubi paucae, acres, suberuentæ Guttulæ destillabant; nec utiquè juvabat semper copiosa; nam haud rarò longè nimium profunde-
bant Nares, imò ad *Syncopen* usque, præsertim sub Julii Finem, cum esset sæpe prodiga valdè: tune etiam *Dysenteria* cruenta sæpiùs accederet. — Vix ullam memini Febrem in quâ *Scotomiae* & falsi Oculorum Splendores erant tam frequentes.

Nihil utiquè novi æquè certum Victricis Naturæ Signum ac liberum valdè & copiosum Sputum, benigno prodeunte Sudore, aut fluente affatim fulvâ & crassâ Urinâ: perrarò autem Sedi-
menti aliquid deposuit Lotium per totum Morbi Decursum; imò, cum interdum crassum fuisset admodum per Horas aliquot, mox tenuè prorsus reddebatur. Signum hoc semper est malè judi-
catæ Febris: atque adeò hæc vel ex levissimâ Cau-
sâ fuit recidiva — Si quis Carnem comederet vel Piscem, nisi probè purgatus & confirmatus bene, certò certius hoc passus est magno herclè cum Vitæ Periculo; nec minùs sanè subiret Discrimen sæpe ab acriore *Cathartico*.

Mihi equidem haud levis Noxa Popello acci-
disse visa est à nimia Comesturâ Piscium, quæ abundantissimè hac Tempestate undique scate-
bant, præcipuè Scombri; quippe qui lentos ge-
nerant ac rancidos Humores. Sudor vel sanis-
simi Hominis, qui multo utitur Pisce, longè ma-
gis foetidus est quàm si Carne solùm et Pane ves-
ceretur — quinimò jam diu notum est, quòd ni-
mius Piscatus *Scorbutum* infert & Morbos cuta-
neos.

Hæc adeò de Febris Naturâ, jam quoquè de
Curatione pauca.

In

In Morbis equidem curandis Regulæ quædam generales servandæ sunt, cum eo tamen, ut propria quoquæ cujusque Ægrotantis Natura perspicienda sit: ideò ex *Hippocrate Celsus* * dixit “Mederi oportere & communia & propria intuentem.” Nec in ullâ Re magis hoc necessarium est quàm in Sanguine mittendo, ubi & Vires & Ætas & Habitus diligenter sunt consideranda.

Ipsò harum Februm Initio rectissimè mittitur Sanguis, plùs, minùsve, pro Ratione *Symptomatum* nempe †: Si Pulsus sit validus, si Febris vehemens, si Dolor acutus, repeti id debet, maximè si Pellicula tenax Cruorem obtegit, minimè tamen si haud satis firma sit Sanguinis *Craasis* & tenuis nimidum, præcipuè si Serum ejus sit luridum valdè, aut rubellum—Haud tamen fida satis à Colore & Superficie Cruoris desumitur Indicatio, nisi pleno Flumine & Impetu profiliat: cum per Brachium destillat, aut exit quasi guttatim, falsâ semper & floridâ Specie decipit.

Sectâ imprimis Venâ, mox Vomitus leni *Emetico* movere oportet, maximè si Nausea urget, aut Vomitus; hoc enim Modo exantlatur optimè biliosa Colluvies, Fomes, si restaret, futurus Morbi—Hoc etiam ipsa Natura indicat, suâ sæpissimè Sponte Vomitiones concitans—Nec solùm Initio, sed in quolibet Morbi Statu eluendus est Ventriculus, si urget Vomendi Conamen, aut Ructatio biliosa, olida & ingrata valdè ‡—Vitellus Ovi pu-

* *Cels.* Præfat. p. 17. ex Edit. *Almeloveen.*

† Perlege quæ de Sanguinis Missionem dixi in Febribus putridis malignis, *Essay on Fevers*, p. 104.

‡ Ubi Ructus amari cum Gravitate Præcordiorum sunt, ad Vomitus protinus confugiendum est. *Cels.* Lib. 1. C. 3.

tridus, vel ad perpauca Grana datus, horrendam mox excitat Choleram; stagnans & putrida Bilis haud multò minùs virulenta est, quam primùm igitur est ejicienda.

Sequitur plerumque post *Emeticum* Alvi Dejectio, si verò, non respondet, Clystere tenuiore ducenda est: sive sic parùm reddit, sive fuerat ante Febris Accessionem astrictior debito, *Pharmacis* idoneis liquanda est, Manna nimirùm, *Cremore Tartari*, *Rhabarbaro*, Sale *Glauberi*, &c. quæ scilicet in primis Viis præcipuè agunt, minimas saltèm movent in Sanguine Turbas.—*Drastringa* utiquè *Cathartica* deprecor prorsùs, utpotè nocentissima: mitiora verò hæcce exterminant commodè Humores, qui in Visceribus diutiùs morando majorem indiès acquirunt Acrimoniam, imò & in Sanguinem per Vasa *Mesaraica*, Venasque lacteas remigrant perpetuò.—Et post Vomitus & post *Catharsin Theriacæ Andromachi* aut *Elixiris asthmatici* paululum administrandum est.

Hisce peractis paulisper jam cunctandum est, ut quà Natura vergat scrutemur, nec officiosâ Medicamentorum Farragine illam agamus deviam*; intereà tamen Diluentia quædam subacida propinanda sunt affatim, ut nova puraque Materia corrupto Sanguini admisceatur, ut acres ejus solvantur Sales, atque peccans corrigatur Acrimonia; hoc enim Modo *Crisis* promovetur optimè, præsertim si lenia aliqua attenuantia ac solventia adjuncta sunt. Nec faciliè video quæ alia

*—*Ἀμαλξάν τῶν Νοσῶν Ἡσυχίαν ἔχει βέλιον.* *Hippocrat.*
Aph. 29. Sect. 2. Maximi profectò est hoc Mònitum in acutis, quis prudens Medicus Naturam durante Paroxysmo vel Febris intermittens inturbat?

Medicina hoc Tempore Febris tentanda sit, ni forsan Vis Vitæ langueat, & torpeat Sanguinis Motus; tunc enim Stimulis agitandum est idoneis, *Epispastica* admovendo nempe; generosa porro exhibenda sunt *Alexipharma*. — Sed ne nimius sis, obsecro Medicè! in Salibus *Volatilibus Alcalinis* ingerendis, ruunt enim jam omnia ad summam Putredinem, nisi Humorū Acrimonia temperare potes, & Sanguinis Dissolutionem prohibere. — Ideò ubi calidiora Medicamina exiguntur, admiscere soleo plerumque Acida quædam, uti Acetum, *Limonii* Succum, vel *Elixir Vitrioli*, quod Aromatibus imbutum haud contemnendum est. *Alexipharma*, cujusque Guttæ aliquot sæpiùs exhibendæ sunt, ex Vino aromatite, aut *Julepo* quodam *Cardiaco* cum Bolo ex *Consec. Cardiac.* Croco, *Rad. Contrayerv.* &c. — Sed Nihil necesse est tradere Formulas, cum qui, quid indicatur in Re præsentē, calleat facillimo Negotio potest adaptare Remedia*: cave tamen ne Calcaribus utaris cum Opus est Fræno; nec vehemens nimium esto in Sudoribus exprimendis præcalidam Medicinam urgendo, nam si probè diluitur Sanguis, & servatur bene mistus, suo semper Tempore, suæque Sponte, ipsa Natura Sudorem profert† — Haud ibo Inficias equidem quod absque Sudore quàm rarissimè solvitur Febris, profusus tamen mihi semper suspectus est.

* Εἰ τις εἰδὼν τὴν Αἰτίαν τοῦ νοσήματος, οἷός ἐστι προσφέρειν τὰ συμφέροντα. *Hippocrat. de Flatib. Initio.* † Πάντη δὲ ἀνοιγόμενον, τε καὶ ἀναπνέον, καὶ κινούμενον τὸ Σῶμα, συμφέρον ποιήσει. *Hippocrat. de Locis in Homin. Sect. 39.*

Hanc adeò in Morbis hujusmodi curandis *Methodum* plerumque sequor—Per Initia Febris, debitas post Exinanitiones, *Haustus salinos* præcipio, ex Sale nempe *Alcalino* fixo aut *volatili* (prout Res postulat quorum hic Sudores, ille Urinam magis movet) Succo *Limonum*, *Aurantiorum* Hispalienfium, aut Aceto Vini acerrimo, bene saturato, cui admisceo Aquam *Alexeter*. simplicem Sp. Lavend. C. aut his similia. Hoc modo conficitur Medicamentum, blandi ad instar Saponis, crassos resolvens Humores ac cum aquosâ Sanguinis Parte Olea Salesque intimè commiscens—Diluentia interim subacida affatim ministranda sunt, quæ, mediante hoc Remedio salino, toti Humorum Massæ promptissimè admiscuntur: Sic bene mistus & fluidus servatur Sanguis, ejusque temperatur Acrimonia; dum acres soluti Sales per Cutim, per Alvum, per Urinam effluunt perpetim; nec verò intereà interturbatur Natura dum Concoctionem molitur. Atqui si tardat nimis languetque, generosâ magis Medicinâ vacillantem refoveo; id maximè, si aut Sudor sit frigidulus, aut Urina pallida, aut Eruptiones (Pustulæ sint sive *Petechiæ*) Coloris minùs vividi.

Per hæc efficitur plerumque ut blandi tandem Sudores erumpant, qui Febrem tenuant quotidie; si tamen inæquales sunt, & parùm constantes, aut subfrigidi, aut profusi admodum, haud ita feliciter, mox enim Rigor accedit sæpe, ac Febris *Exacerbatio*, paulòque post Phrenitis; quâ quidem ingruente Alvus protinùs *Enemate* ducenda est si fuerat astricta (vellem utiquè semper teneram potius quàm constipatam per totum

Morbi Decursum) Si Furor urget ad Cucurbitulas scarificatas, Humeris Cervicibusque affixas, confugiendum est; quo peracto *Epispastica* admovenda sunt pone Aures, Occipiti, ipsis quandoque Locis scarificatis; Tibiis proinde aut Femoribus—Hæc verò maximè ex Ufu sunt, ubi Vis Naturæ torpet, languetque Pulsus Arteriarum—Jam autem Bolis *cardiacis* adjicio *Campboram* ac Succini Salem, interpositâ quoquè interdum Unciâ unâ, vel alterâ, *Diacodii*, imò si Vigiliæ urgent uno, alterove Extracti Thebaici Grano.

In hac ferè Medicinâ persisto Morbi usque Statum, quo aut in melius, aut pejus multò ocyùs mutantur omnia; nec Dies jam sed & vel ipsæ Horæ æstimandæ sunt: Si modò nec propitius adjuvat Sudor, neque *Diarrhæa* blanda, nec libera accedit Expuitio, in Malis Æger est—Tentandum est tunc utiquè quid possit lenis Alvi Purgatio, exhibendo nimirum *Rhabarbarum*, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Salem Glauberi*, &c; subveniendum est interea Virium Ruinæ *Cardiacis* idoneis: vix meliora novi utiquè quàm Vinum rubrum generosum Aromaticis incoctis, Cinnamomo scilicet, Maci, Nuce *Moscabatâ*, Cort. *Aurant.* Hispalienf. &c. cum Aquæ Dimidio, aut subaustera quædam *Alexipharmaca* cum *Elix. Vitrioli*, vel *Limonum* Succo; hæc quippe & Vim Fibrarum & Sanguinis *Crasin* confirmant, Humorū autem Putrefactioni obsistunt maximè. Quod quidem diligenter cavendum est, ubi aliter Sanguis in Saniem, Lympha verò in *Ichorem* degenerant, brevique obrepit omnium

Diffolutio putrida, ac si Sanguini immistum fuisset Viperæ * Venenum.

Purgationem per Inferiora poscunt Hypochondria tumida, Intestinorum Murmura, Abdomen tensum, Alvus adstricta, Caput grave, Somnolentia nimia, Vertigo, ingruens Delirium, Halitus foetidus valdè, & Præcordiorum Oppressio cum Ructu frequente.—Prohibent autem Sudores faciles, constantes & æquales, Pustulæ, aut *Exanthemata* jam erumpentia, Expuitio copiosa adveniens; nam vel in *Peripneumonicis Diarrhæa* sæpe Sputa supprimit prorsus; quod quoquè in *Variolis* haud rarò accidit infelicitè—minùsque commodè semper fert *Catharsin* magnus Virium Languor.

Sub Conditionibus autem suprà expositis nullo non Tempore Morbi Alvum moveo †, maximè declinante Febre, ubi nullâ aliâ Viâ molitur Natura *Crisin*.

Tentatur sæpissimè, fausto admodùm Successu, hæc purgandi Methodus in *Variolis* confluentibus, nono, vel undecimo ab Eruptione Die, cum parùm aliquid ultrà per Salivæ Ductus, aut per Cutis Meatus exterminari possit: Quidni & in hac quoquè Febre?—Procul Dubio ubi putrida Colluvies atque corrupta Bilis in Ventriculo & Intestinis abundant, quantocyùs herclè expurganda sunt, ni vis usque fovere Morbum, auctâ in Horas Putredine†.—In hac Febre profectò, de quâ nunc agitur, & per Vomitus & per Alvum immensam Vim biliosæ Saburræ sæpiùs rejectam vidi, magno utiquè cum Ægro-

* Vide *Essay on Fevers*, p. 51. † Ibid. p. 111—114.

tantium Levamine; suavi mox accedente Somno, ubi per plures Dies Noctesque summa antecesserat Anxietas, ac Vigilia perpetua—Dum Ventriculus sanè acribus gravatur Sordibus, & putridâ Bile, laborat semper maximè Caput, perturbantur Spiritus, & prosternuntur admodum Vires—Nec in primis tantum Viis felices edit Effectus Vomitus, sed & per omnem undique Vasculorum Compaginem, ubi lentescentes attenuat Humores, putridosque expellit*.

Nova Luna 12° JULIO. Plena Luna 27°.

Hic quoque Mensis fuit subfrigidus, Aër autem maximè ficcus & quasi fumosus: Libs sæpe afflavit, Corus sæpiùs, Euris interdum: Fons omnis & Rivus exarescunt ferè, vix viridis inventa est Herba.

Pluvia 4. 7. 9. 10. 12. 16. 19. 20. 26.
Dig. Dec.
30=0.608.

Tonitru 30. Pluvia gravissima ad Septentrionem 28.

§ Altitud. maxim. 15. 29,9. NNW 1. } media 29.6 $\frac{1}{3}$.
minim. 26. 29,3. SSW 3. }
Dies frigid. 22. 39. NNW 1. }
calid. 3. 26. SWbW. 2. } media 31 $\frac{3}{4}$.

Variolæ jam epidemicæ, mites tamen plerumque; Rubeoli passim & Morbi Pulmonis; sub Finem Mensis Dysenteria frequens.

* Vide Dr. Cheyne's new Theory of Fevers, p. 83.—94. Edit. 3. Ann. 1722.

Jam maximè furit Febris pestilentialis plurimosque demittit ad Umbras; Funera certè nunc sexies saltèm excedunt solitum Numerum: nec solùm hìc, sed & per Viciniam jam grassatur Morbus.—Anxietas horrida, Jactatio perpetua, atrox Capitis Dolor, cruciant Ægrotos, atque mox ferox accedit Insania, paulòque sæpe pòst Veternus, aut Nervorum Distentio: Alvus, Urina, Lachrymæ, Nil sentientibus effluunt, sæpe Vox Faucibus hæret prorsùs, sæpe Lingua nigra aridissima, Verba incondita, aut aliena balbutit.—Plurimis sub Morbi Finem adest Exulceratio Faucium acerbissima, etsi Initio levis tantùm erat Aspretudo: difficillima hinc Deglutitio, nec sine summo Tormento. *Parotides, Bubones, Furunculi* admodùm dolentes, haud rarò nonum inter Morbi Diem & decimum quartum erumpunt; Salutaria hæc plerumque, maximè si probè suppurant, pessima utiquè si mox recedunt: interdum verò per plurimos Dies indurata permanent sine vel minimâ Suppuratione, præcipuè in Cervicibus, ubi per Menses etiam aliquando perdurant.

Circa hoc Tempus quoquè sæpe *Diarrhæa* salutifera oritur, id potissimùm si biliosa, aut sub-nigra, atqui non nimis liquida, dejiciuntur: Alvus autem saniosa, cruenta, aut valdè aquosa, mala semper—hujus autem Fœtor plerumque vel Aniculis ministrantibus, imò & ipsis Ægris, planè intolerabilis: interdum urget admodùm pestifer Tenesmus.

Urina vel in Convalescentibus cruda perstat, ac sæpe tenuis, sæpe autem turbida, lactea, & oleosa quasi, nihil tamen omninò Sedimenti deponit: evidens hoc magnæ Cruditatis Argu-

mentum est ; adeoque, licet Ægrotantes penè restituti viderentur, frequenter tamen promptissimè in * Recidivas incidunt. Convalescentes sanè, qui Carnem nimis citò, aut Pisces comedunt in Febrem certò certiùs relabuntur ; præcipuè haud probè priùs purgato Corpore.—Fortiora tamen *Catbartica* hos etiam in idem Periculum conjiciunt.

Quibus in Meatu auriculari, aut pone Aures, aut per Cervices Abscessus enati sunt, maximè si circa Labia Pustulæ plures urentes, certa ferè Spes Salutis effulsit : omnibus Ægrotantibus Surditas ac Tinnitus Aurium accidit, diu sæpe post ruptum *Apostema* durans.

Mirum est herclè, quod Eruptio tantillæ Materię morbidæ tam felices fortiatur Effectus, quod tamen persæpe videmus : vix enim hoc Modo ejici posse videtur Morbi Causa. Suspicor ego quidem hoc duntaxat esse Signum, quòd validæ adhuc sint Naturæ Vires, & quòd sit usque Sanguini Motus sat expeditus per ultimas minimasque Arteriolas ; quibus deficientibus, nec maturatur *Apostema*, aut Tuberculum, nec emergunt Pustulæ. Hinc vides paulò ante Mortem, succumbente nimirum prorsus Naturâ, Ulcuscula pallida, aut exiccata, &, si quæ sint Pustulæ, eas pallescentes, aut luridas, hærente scilicet in extremis Vascularibus Sanguine.

Inter salutifera Signa insuper fuit acidus, aut falsus in Ore Sapor, cum Sputo multo ; contrà verò amarus & quasi ex Ærugine (ut dicerent)

* Febris, quæ sine Ratione, sine bonis Signis, finita est, ferè revertitur, *Cels. Lib. 2. C. 7. Hippocrat. Aph. 12. Sect. 2.*
 fœdus

foedus certum fuit malè judicati Morbi Signum, ac Febris mox recidivæ, ni per Vomitus, aut lenem *Catharsin* ocyùs expurgata forent putrida Bilis & colluvies morbida. Quo quidem peracto felices quotidie experiebar *Tincturæ Corticis Alexipharmacæ* * Effectus, & ad Vires reficiendas & Febris Reliquias abigendas. Hujus est utiquè Medicamenti roborare Fibras atque debitam Fluidorum Constitutionem restituere, nec tamen intereà prohibet morbofi Humoris Exitum per Cutis Meatus : hinc longè tutiùs sæpe exhibetur quam ipse Cortex *Peruvianus*, qui haud rarò vehementer nimis constringit.

Per totam hanc insaluberrimam Tempestatem *Vesicatoria* immensam ferè fundebant Humorem, sanescebant verò difficillimè; quosdam certè enormi Fluxu consumeabant prorsùs.

Diu fuit undique Piscium immensa Quantitas, maximè Scombrorum, quorum Usu immodico procul Dubio plures generantur Morbi; augment enim & Humorum Putredinem ac Labem *Scorbuticam*, jam ubique grassantem, inter Nautas præcipuè, quorum Gingivæ exesæ sunt admodum & Halitus Oris valdè olidus—Rectissimè ideò cum Piscibus comeditur Aceti plurimùm, quod rancidum eorum Oleum corrigit, & putrescentem Indolem—Nullus utiquè dubito quin largus Aceti & *Pomacei* Usus foret Nautis utilissimus in longis Navigationibus †: imò hoc jam satis expertum est, adeò ut secum plurimi ad Indiam usque Orientalem *Vinum Pomaceum* depor-

* *Essay on Fevers*, p. 122. † Vide Monitum nostrum de Sanitate Nautarum tuendâ ad Calcem Libr. de Febribus.

tant :

tant: Acetum verò Carnis & Aquæ Corruptionem prohibet.

Nova Luna 11° AUGUSTO. *Plena Luna* 25°.

Maxima jam Cœli est & Soli Mutatio, perpetuæ ferè decidunt Pluviæ, atque omnia nimio diffuunt Humore; unde Messis infelix admodum, Frumentum penè corruptum, & Fructus prorsus fatui—Immensa scatet undiquè Vis Fungorum.

Ventus fuit australis sæpissimè; haud rarò fœviit Libs procellosus, hinc *Atmosphæra* crassa valdè, frigida, & maximè humida, præsertim sub Mensis Finem.

Pluvia $\frac{11}{2}$. 3. 4. $\frac{1}{5}$. 6. 10—12. 15. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{17}$. 18.
 $\frac{11}{20}$. 21. 22. 24. 25. $\frac{111}{26}$. $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{28}$. $\frac{111}{31}$ = 3.510. Dig. Dec.

Procella 26. a. m. S S W 4_x—28. a. m. S W.
 4. Magna Pruina 29.

§ Altitud. maxim. 30. 29.9. S E 1. } media 29.4 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 3. 29.1. S W 2. }
 Dies frigid. 29. 42. N 1.
 ——— calid. 1. 27. N W 1. } media 34 $\frac{2}{3}$.

Variolæ Epidemicæ, quæ hic quidem parùm sunt lethiferæ, longè aliter tamen aliis in Locis.

Dysenteria cruenta, ac Cholera frequens—multi levi Anginâ atque Faucium Tumore vexantur cum Doloribus vagis *rheumaticis*.

Grassatur adhuc Febris nautica maligna, plurimosque trucidat, quosdam vel Die septimo, imò interdum citiùs; multos autem vel ad vicesimum & ultra trahit—jam sæpe aut nullæ prorsus

sùs apparent *Petechiæ*, aut raræ; sæpe tamen totum Corpus maculant—crebrò Sudores pingues & foetidi Ægrotos colliquant; haud rarò quos Febris ferè reliquerat sæva *Dysenteria* consumit: Solutis adèò Sanguinis Principiis, quâ datâ Portâ ruunt Humores.

Nova Luna 10° SEPTEMBRI. *Plena Luna* 24°.

Ventus ab Occidente, ad Austrum plerumque vergens, prævaluit decimum usque octavum, continuâ ferè ac gravi decidente Pluviâ, pòst autem contrario planè Curfu spirabat, surgente *Baroscopio*, Aëremque siccabat.

Pluvia 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 15.

Dig. Dec.

16. 17, 22. 23. 24. = 3.628.

Levis Procella 7. p. m. S W b W 4x.—27
Nocte E b S 4x. Paraselene 17. H. 7. p. m.
W N W 1.

☿ Altitud. maxim. 25. 30,0. NE 1. } media 29.6 $\frac{2}{8}$.
—— minim. 11. 29,0. W 3. }

Dies frigid. 30. 59. NE 1. } media 41 $\frac{1}{2}$.
—— tepid. 6. 34. SW 2x. }

Febres malignæ jam nec Vi, nec Numero, adèò sæviunt. *Dysenteria* plures cruciat; Tussis quædam gravis *Asthmatica* haud paucos. Tumores Faucium, *Parotidum*, Maxillarum cum acerbo Dentium Dolore permultos divexant: Morbus colicus à *Pomaceo* novello, cum Alvo citissimâ plures exercet, *Ophthalmia* passim, *Variolæ* plurimæ.

Nova

Nova Luna 9° OCTOBRI. *Plena Luna* 23°.

Fuit hic Mensis multò frigidior solito, Gelu ipso Initio, etiam rigidum Die decimo; Boreas plerumque spiravit, Eurus haud rarò, pluvius Auster nonnunquam: Alta fuit ut plurimum Barometri Statio, Aër verò crassus.

Pluvia $\frac{''}{4}$. $\frac{'}{5}$. 6—8. 16. 17. $\frac{''}{19}$. $\frac{'}{20}$. 21. $\frac{'}{23}$.

$\frac{'}{24}$. 28. 29. Grando 7. Grando & Nix multa 23 = 1.914.
Dig. Dec.

§ Altitud. maxim. 27. 30,3. N E 1. } media 29.8 $\frac{2}{8}$.
—— minim. 20. 29,3. S W 2x. }
Dies frigid. 27. 69. } media 56 $\frac{1}{2}$.
—— tepid. 20. 44. }

Febres lentæ *nervosæ* frequentes; permanent usque aliquæ malignæ quibus sub Finem accedit *Diarrhœa*, interdum *Dysenteria* mucosa cum Sanguinis Strigmentis.

Tussis, Angina, Faucium Tumores, Dentiumque Dolores per plurimos corripunt. Jam regnat admodum *Colica pomacea*, haud solito tamen cum Furore, ob *Diarrhœam* ferè semper comitantem: *Variolæ* adhuc *epidemicæ*.

Nova Luna 8° NOVEMBRI. *Plena Luna* 22°.

Fuit & *November* perquam frigidus, Aër plerumque crassus, afflavit Aquilo sæpe, sæpe Corus,

rus, intercurrente frequenter Africo furente & pluvioso; maximæ subinde Pruinæ, haud rarò rigidum Gelu.

Pluvia $\frac{///}{1.}$ $\frac{1}{2.}$ $\frac{1}{5.}$ $\frac{1}{7.}$ $\frac{1}{9.}$ 10. 11. 13. 14. $\frac{11}{16.}$

20. $\frac{11}{21.}$ 22. 23. $\frac{///}{25.}$ $\frac{1}{27.}$ 28—30. Grando 1.

Dig. Dec.

5. 25. Nix multa 2. 24. 25. = 3.844.

Procella gravissima 1 à primo Mane ad Noctem usque N W 4x.

———— 21 Mane S W b W 4 — 26 Nocte S W 4x.

Fulgur & Tonitru 25 Vesperi.

✂ Altitud. maxim. 18. 30,2. N N W 1. } media 29.5 $\frac{1}{2}$.

———— minim. 24. 28,8. E 2. }

Dies frigid. 25. 69. N N E 1. }

———— tepid. 15. 50. S W b W 1. } media 60 $\frac{2}{3}$.

Variole usque grassantur; Febres malignæ passim, lentæ ac *miliares* sparsæ, Ruri præcipuè: Erysipelas, Angina, Tussis acres haud paucos corripunt. Plurimi Colicâ *pomaceâ* laborant cum *Diarrhæâ* plerumque, adeòque citò profligatur; solutum enim Ventrem rarò torquet admodum Colicus Morbus, saltem brevì cedit Anodynis; iisque opportunus est Locus pòst unam alteramve Rhabarbari *Dosin*; neque inter hæc melius est aliquid *Philonio*. Cave tamen ne Alvum nimis citò strictam reddas, nam paulò pòst ut plurimum recrudescit Dolor, congestâ scilicet iterum acri Colluvie; tenera idcirco semper per Dies aliquot servanda est; probè autem intèrè munien-

dum

dum est Corpus à Frigore, aliter, constrictâ Cute, mox plectuntur Viscera *.

Nova Luna 7° DECEMBRI. Plena Luna 21°.

Per Initia *Decembris* dira, procellosa, pluvia Tempestas, Libs interim quotidie perfremuit : Die 2 & 3 Fulgura sæva cum Tonitru, Grandine, Pluviâ ; hinc Aër factus est crassissimus & maximè humidus. Ab undecimo ad vicesimum, mutatâ penitùs Rerum Facie, rigidissimum Gelu, immensæ Pruinæ, Cælumque sudum perflante Boreâ : inde verò Auster prævaluit atque *Atmosphæram* densam valdè ac udam maximè fecit.

Pluvia ^{///} 1. [/] 2. ^{//} 3. 4. ^{//} 5. ^{//} 6. ^{///} 7. ^{//} 8. ^{//} 9. 10. 19.

^{///} 21. ^{//} 22. 23. ^{///} 26. [/] 27. [/] 29. 30. 31. Grando ve-

hemens 2. Nix [/] 14. [/] 15. [/] 19. 20. = 6.290. Dig. Dec.

Furens Procella 1. Nocte S W 4^x—2 p. m. S W b W 4.

Procella 3 S W 4^x—5 W 4^x Vesperi—6 primo Mane W S W 4.

——— 20 ante Lucem N W b N 4—21 toto Die S S E 4^x cum enormi Pluviâ, quæ omnem penitùs Nivem colliquabat ; isto etiam Die Fulgura & Tonitrua gravissima.

* Consensum Cutim inter & Intestina probè novit *Alex. Trallianus* “ αὐξίλαι γὰρ τὸ ῥιῦμα (ad Intestina scilicet) εἰς ὅτοι ἀν πυκνωθῇ τὸ Δίγμα.” *Trallian.* p. 216. ex Edit. *Goupyli*, sed etiam *Hippocrat.* Lib. 6. Epidem. Sect. 3. ipso Initio *Lutet.* Fol. 1548.

Nebula foetidissima 27. W S W 1x.

§ Altitud. maxim. 31. 30,0. N W 1x. } media 29.4.
 ——— minim. 22. 28,8. S S W 3x. }

Dies frigidissim. 19. 80. E N E 1. } media 61 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 8. 49. S W 3. }

Crebrae adhuc *Variolæ*: *Pleuritides*, *Peripneumoniæ*, *Rheumatismi* passim: Febres *petechiales* aliquæ adhuc, Tussis vehemens, & *Asthma* grave plurimos premit: Morbus colicus frequentissimus, hunc tamen Alvus cita admodum & biliosa brevè solvit.

Tota Pluviae Quantitas Anno MDCCXL.
 Dig. Dec.
 = 24.042.

Nova Luna 6° JANUARIO. *Plena Luna* 20°.

Ab Initio Mensis ad Diem sextum spiravit Caurus, inde ad decimum quintum frigidissimus Boreas, tunc Libs pluvius irruit, à vicesimo sexto tamen ad Finem usque fremuit subinde Vultur-nus—Medio Mense acerrimum Gelu, Aërque valdè ficans; dum autem Africus perflavit factus est humidissimus, liquecente prorsus Gelu.

Pluvia 2. $\frac{1}{16}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{111}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 24. 25. 27.
 Dig. Dec.
 28. 29. Nix 10. 12. 14. = 1.936.

Procella 27. Nocte & toto Die, sequente S E
 b E 4.

§ Altitud. maxim. 1. 30,3. N W 1. } media 29.8.
 ——— minim. 16. 28,9. S S W 3. }

Dies frigidissim. 15. 79. E N E 1x. } media 61 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 22. 52. S W 3x. }

Vari-

Variolæ frequentes etiamnum ; Per plurimi Colicâ laborant, multi sanè ex Usu *Pomacei* novelli, haud pauci verò à superabundante Bile ; omnes liquida citaque Alvus exercet, nunc biliosa valdè, nunc mucosa. Multi acuti Pectoris Morbi ; Anginæ & *Rheumatismi* frequentes. *Apo-plexia* & *Epilepsia* passim.

Tabidi pulmonarii jam pessimè se habent, auctâ nempe plurimùm Tussi & Gravitate Spirandi.

Febris *petechialis* jam paulò magis sævit.

Fœda admodùm Scabies dominatur maximè inter Popellum, obstructis nimirùm Cutis Spiraculis, à gravi longoquè Frigore, detinetur Materia, quæ perspirare debebat, unde Glandulæ *miliares* obserantur atque roduntur tandem—In frigidis Regionibus & Tempestatibus semper grassatur *Scorbutica* Lues, densatâ plurimùm Cute, ac retentâ nimium salinâ Corporis Fuligine—annon hinc hujus *Prophylaxis*, annon hinc Cura ex facili elicitur ? Multò faciliùs utique curatur per Æstatem quàm durante Hyeme asperiore.

Nova Luna 4° FEBRUARIO. *Plena Luna* 19°.

Sublimè ut plurimùm stetit *Mercurius* in *Baroscopio* hoc Mense, idque etiam Initio, licet Vulturnus nonnunquam flavit, imò & ipse Auster ; Aër autem tunc fuit humidus valdè & crassus * ; à decimo octavo tamen ad Finem usque frequens Ventus borealis *Atmosphæram* tenuem fecit, perquam frigidam, & multò sicciorem.

* Vid. Vol. I. p. 181.

Pluvia 1. 5—7. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Dig. Dec.

26. Grando multa 15. 16. 17 = 1.456.

Barometer fuit ad 30. 5 * septimo etfi Ventus
S S E 2^x.

Maxima verò tunc Nebula.—Procella 16 Ma-
ne S 4^x.

Fulgur & Tonitru Vesperi. Quàm maximus
Halo circa Lunam 11. H. 9. p. m. S W b W 1.

8 Altitud. maxim. 27. 30,6. E N E 1. }
minim. 16. 29,2. S b W 3^x. } media 29.9²/₈.

Dies frigid. 24. 72. E N E 1. }
— tepid. 6. 53. Malacia. } media 59²/₈.

Multæ adhuc *Variolæ* : *Rheumatismi*, *Peri-
pneumoniæ*, *Pleuritides*, & veræ & nothæ passim.
Tussis vehementes, & diri admodum *Asthmatis*
Paroxyfmi frequentes : hinc Tempestas fuit max-
imè noxia tabidis, nam Tussim movet Boreas,
Pulmones verò constringit ac Sputa supprimit.—
Colica & *Diarrhæa*, seu Tormina sæviunt pluri-
mum.

Durat usque Febris maligna, inter Nautas ve-
rò præcipuè, & maximè in *Nosocomiis*.

Nova Luna 6° MARTIO. *Plena Luna* 21°.

Præalta fuit *Barometri* Statio toto *Martio*,
Ventus intereà perpetuus Orientem inter & Sep-
tentrionem ; Aër verò siccissimus ac frigidus
valdè, Gelu frequens admodum, imò ad Finem

* Vide Vol. I. p. 181.

usque Mensis asperum : per totum ne vel Guttula Pluviæ.

Dig. Dec.

Nix 18. 19. Grando 28 = 0.072.

Maris Æstus suppressit maximè Boreas longè frequens, paululùm etiam magna *Barometri* Altitudo *. Hoc sanè perpetuum est, quòd adventante procellosâ, pluviâque Tempestate et Sonitus Maris permagni, et Æstus enormes præcedunt, quinimò portendunt, his in Oris saltem; contrâ durante Apricitate, Ventoque boreali, minimi sunt semper et Fluctus et Æstus Maris.

AB. 5. H. 9. N N E 1.—levis 9. H. 8. E 1² —21. Vesperi E N E 2.

§ Altitud. maxim.	7. 30,5.	N E 1.	} media 30.031
minim.	31. 29,6.	N 1.	
Dies frigid.	30. 68.	E N E 2.	} media 56½.
tepid.	9. 50.	E b S 1 ² .	

Variolæ ubique *Epidemicæ*, plerumque tamen paulò mitiores, nisi inter Nautas, quorum plures equidem pereunt, unâ forsan conspirante Febre malignâ, quæ permanet adhuc: Credo etiam quòd *Scorbutica* Lues, quâ hoc Genus Hominum jam maximè afficitur, Variolas magis exitiales reddit: haud rarò Mictus adest cruentus, interdum Sputa sanguinolenta.

Plurimæ *Pleuritides* ac *Peripneumonix*, cæque vehementes admodùm + — sævit abundè *Rheumatismus* & *Arthritis*, nec infrequens est gravis *Angina* + — sævissimum *Asthma* quosdam diu ac

* Vide Vol. I. p. 17. † Όταν χιμείριον γένηται Ηε και έπισ-
θδ χιμείριον, χιμείριοναι η αι νοσοι, και βηχιδες, η περιπνευμονισαι,
η κυναρχικαι. Hippocrat. de Humorib. Sect. 7.

crudeliter premit—Tussis importuna valdè & laboriosa plurimos—Horum omnium ferè Sanguis extractus est perquàm tenax. *Phthifici* haud pauci subitò abripiuntur.

Nova Luna 4° APRILI. *Plena Luna* 19°.

Manet usque *Atmosphæra* Constitutio sicca valdè & frigida; Initio Mensis Gelu & maximæ Pruinæ; Ventus Aquilonius sæpiùs hoc Mense, sub Finem verò ab Oriente spirabat, Aër interim tenuis & maximè siccus, medio autem largissimæ Rorationes—Sub Finem multa Pluvia apud *Totness, Dartmouth, Kingsbridge, &c*; hìc ne vel Guttula.

Dig. Dec.

Pluvia 1. 5. 8. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. 20. 21 = 0.452.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 4. N 1. } media 29.9 $\frac{2}{3}$.
minim. 1. 29. 5. N 1 $\frac{1}{2}$.

Dies frigid. 2. 64. N 1. } media 47 $\frac{1}{2}$.
— tepid. 14. 41. Malacia }

Variolæ quaquaversùm *Epidemicæ*; *Pleuropneumoniarum* frequentes valdè: *Asthma*, Tussis vehemens, Verbo & acuti & *chronici* Pulmonum Morbi invalescunt maximè: haud pauci Sanguinis Sputo corripuntur; permulti *Phthifici* ad plures abeunt.

Plurimæ Febres putridæ, sæpe cum Eruptione *miliari*, sæpe cum *Petechiis* in australi *Damoniâ*—Sedulò inquirens has plerumque esse Propagines Febris nauticæ contagiosæ invenio, ea nempe Loca adeuntè uno, alterove Nautâ convalescente: parùm adeò tutum est recipere ex

Febre contagiosâ recuperatos : diu sanè Vestibus
adhæret Morbi Seminium.

Nova Luna 4° MAIO. *Plena Luna* 19°.

Ineunte & exeunte Mense Aër erat maximè
ficcus, medio autem densus & paulò humidior ;
quippe frequens decedit Imber Diem quartum
inter & undevicesimum, postea vix Guttula Plu-
viæ ; afflavit sæpe Vulturnus, Aquilo tamen Ini-
tio, sub Finem Caurus. Ros erat subinde uber-
rimus, à vicesimo præcipuè.

Erucae innumeræ Hortis sunt infensissimæ.

Pluvia 5. $\frac{1}{6}$. 7. $\frac{1}{8}$. 10. 13. 15 17. $\frac{11}{18}$. 19.
Dig. Dec.

= 0.928.

Procella levis 19 Mane SSE 4x: Imbres gra-
vissimi 30 ad Septentrionem hîc nulli.

Altitud. maxim.	21. 30.1.	E b S 1.	} media 29.6 $\frac{2}{3}$.
minim.	18. 29.1.	S W b W 2x.	
Dies frigid.	14. 52.	N b E 1x.	} media 37 $\frac{2}{3}$.
calid.	27. 24.	N N W 1.	

Vix unquam memini *Variolas* magis ubique
grassantes ; *Rubeoli* passim, seu *Rossalia Frid.*
Hoffmanni.—Angina, Tussis, *Asthma* frequens.
Febres quædam tertianæ*, lentæ quædam ac
nervosæ, plures *petechiales* ; jam autem multò
magis floridæ sunt Maculæ.

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, p. 20. 21.

Nova Luna 2° JUNIO. *Plena Luna* 17°.

Ventus hoc Mense varius; Zephyrus autem prævaluit: Aër plerumque crassus; fervida admodum sub Finem Tempestas.—Vis immensa Erucarum omnium Generum omnia ferè Olera devorant: Cicadæ innumeræ, Muscæ infinitæ ac Afili Pecora maximè infestant.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. 3. 6. 7. $\frac{1}{2}$ 8. 9. 16—18. $\frac{1}{2}$ 19. 20. $\frac{1}{2}$ 21.

$\frac{1}{2}$ Dig. Dec.
24. 26. 27 = 1.250.

Lumen insolitum 29. H. 11. p. m. Arcus nempe igneus lucidus valdè ab Horizonte prope S E ad Gradus saltem nonaginta projectus.

§ Altitud. maxim. 13. 30,0. N W 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$.
— minim. 8. 29,3. W S W 2. }
Dies frigid. 10. 34. W b N 1 $\frac{1}{2}$. } media 27 $\frac{2}{3}$.
— fervid. 29. 18. S E 1. }

Variolæ maxime *epidemicæ* longè latèque, per multos occidunt; hîc tamen non sunt adedò lethales, nisi accedunt *Petechiæ*. Aura* subfrigida & Potio subacida liberalis est *variolosis* nunc maximè necessaria, brevî aliter suffocantur; terribus enim jam est Odor confluentium *Variolarum*: neque hoc inter mala Signa numerandum est, modò cætera favent. Levis Febris *rubeolosa*, seu pustulata passim. Anginæ, & Faucium Tumores crebri. Febres nauticæ sparsæ.

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, Cap. de Variolis, p. 162.

Nova Luna 1° JULIO. *Plena Luna* 17°.
Nova 31°.

Torrida valdè & aridissima Tempestas omnia ferè adussit, vix viridem vides Herbam nisi in Pratis humidissimis, matura tamen hinc Messis & opima, Frumentum optimum.—Mensis Initio venit ab Oriente Ventus, pòst septimum ab Aquilone ad vicesimum usque, inde ad Finem parum erat constans. Ros plurimus omni ferè Nocte. Innumerabiles garrulæ Cicadæ: Muscæ & Afili Armenta vexant admodum.

Quamvis *Atmosphæra* est siccissima, ut *Hygrosopia* monstrant, levi tamen Fumo offuscata videtur, quod quidem haud rarè per siccas valdè & apricas Tempestates accidit *.

Dig. Dec.

Pluvia 5. 6. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 25. 28. 29 = 0.764.

Fulgura 3 Nocte ESE 3. Tonitru quoque è longinquo. Permagnum Lumen boreale & lucidum valdè, effulgente licet Lunâ, 12, per totam fere Noctem, N 1.

§ Altitud. maxim. 9. 29.9. NNE 1^x. } media 29.5 $\frac{8}{17}$.
 ——— minim. 5. 29.3 ESE 2^x. }

Dies frigid. 20. 30.0. N 1. } media 22 $\frac{1}{7}$.
 ——— fervid. 14. 14. N 1^x. }

Dies valdè fervidæ 1. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 24. 28.

Variolæ undique. Febres multæ putridæ magnâ cum Oppressione Præcordiorum, arida Linguâ,

* Vide Observat. Mense Junii 1740.

ac Urinâ valdè biliosâ. Cholera & *Diarrhœa* valdè frequens; porracea, nigra sæpè rejiciuntur; Tormina plerumque sæviunt multùm, Bilis subatræ plurimum dejicitur. Ob Æstum enormem omnes maximè debilitantur Sudore profuso penè digesti.

Non solùm humidissima Sanguinis dissipat fervida Tempestas, sed & ejus Partem maximè actuosam, Vim porrò Fibrarum vehementer enervat: Quid inde? restat crassior atque segnior Moles Humorum, unde in Vasis *meseraicis*, Hepate, Splene, & ubicunque tardior est, ex ipsâ Lege Naturæ, Sanguinis Motus, Obstructio facilis oritur & prompta nimis. Atqui cum & ipse Calor immodicus Sales Oleaque Corporis torreat quotidie & exacuat, fit major in Dies majorque Humorum Acrimonia, inde Bilis acerrima: hinc Cholera, hinc Tormina sævissima, hinc putridæ Febres—Quid igitur? diluendus est affatim Sanguis, demulcenda quoquè perpetim hujus Acrimonia. “Faciám utiquè, ast quò
“bibitur plus, eò sudatur amplius.” En & hujus Mali Remedium sine vel Medicinæ Tædio; admisce modò Vini rubri generosi aliquid Potioni dilutæ, mirabere sanè expertus tantilli tantos esse Effectus; constringit nempe Vascula, Cutis coarctat Meatus, & confirmat Humores: Epoto tantum uno, alterove Vini rubri Gallici, aut Portugallici Cyatho, vidi multoties profusos extemplò sedatos Sudores, etiam in Ipsis Febribus colliquantibus.—Cave tamen, Cane pejus & Angue, Infusum *Theæ*, calidosque Liquores; nèc verùm intereà, dum Corpus æstuat, perfrigidi Poculi Poenas lue.

Plena Luna 15° AUGUSTO. Nova Luna 29°.

Sicca fuit satis & calida, imò nonnunquam fervida, Tempestas hoc Mense, unde Messis lætissima ac fœcunda valdè, nec tamen defuit tempestiva Pluvia, quæ Solum, exustum prorsus, recreavit maximè, ita ut sub Finem *Augusti* renovata quasi viridisquè videretur Facies Agrorum.

Ventus fuit varius, sæpiùs è Septentrione, qui Cœlum semper sudum & plerumque calidum fecit.

Pluvia 2. 5. 6. 7. 13. $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{20}$. $\frac{11}{21}$. 22. 25.

$\frac{11}{26}$ Dig. Dec.

$26 = 2.140$.

Immensæ interdum Rorationes. Erucae & Cicadæ innumeræ.

§ Altitud. maxim. 16. 30,0. NE 1.	} media $29\frac{1}{2}$.
—— minim. 21. 29,2. SSW 1.	
Dies frigid. 25. 36. ESE 2.	} media $27\frac{2}{3}$.
—— fervid. 10. 20. N 1.	

Variolæ adhuc maximè *epidemicæ*, jamque multò peiores, Maculis lividis scilicet haud rarò stipatæ. Febres putridæ, perlongæ (*Mesentericæ* forsàn) plurimæ inter Popellum atque Nautas præcipuè; quædam verò valdè *phreneticæ*, hæ autem multò citiùs jugulant. His tumidus est plerumque Venter & astrictus; retentâ ideò in Visceribus biliosâ Colluvie, lenibus Purgantibus commodissimè fugantur; parùm certè profunt Sudores, minimè verò præmaturæ, & ipso Morbi Initio erumpentes, qui certissimè ferè supprimunt Urinam & Alvum, obrepente mox Phrenitide. Mirum est utiquè quàm multum atræ Bilis

Bilis * *ἄνω καὶ κάτω* ejicitur sæpe. Sub Finem Mensis Angina (plerumque mucosa) frequens admodum, Dentium quoquè Dolor, Faucium; que Tumores multis infesti sunt. Cholera & *Dysenteria* grassatur plurimum; idque semper ferè accidit post Æstates præcalidas, non solum ob Bilem adustam acresque factos Corporis Succos, sed adventante subitò autumnali Frigore patula Cutis nimium citò occluditur, unde quod perspirandum erat ad interiora ruit.

Plena Luna 14° SEPTEMBRI. *Nova Luna* 28°.

Quanquam & calida fuit *Atmosphæra* & sicca Mensis Initio, pluvius tamen & procellosus Auster, septimo adveniens Die, mutavit prorsus Aëris Temperiem; vicesimo tepida valdè & pulchra Tempestas recurrit, flante plerumque ab Oriente Vento, Ros interim perplurimus; ad Finem Auster iterum Pluviaque.

Cicadæ adhuc infinitæ inter Herbas, jam virides, lætissimè garriunt.

Pluvia 4. ^{'''} 7. ^{''} 8. 9. 10. ['] 14. 15—18. 28. ^{''} 27.
^{''} Dig. Dec.
 28. 30=2.756.

Procella 7 primâ Luce S S E 4—13 E 4: maxima Procella apud *Londinum* & Oras *Angliæ* boreales *8 Die.

Fulgura 24 Vesperi. AB. magna ad multam Noctem durans 21 N E 1—27 H. 9. p. m.

* *Ἡ μέλαινα χολὴ τῷ φθινοπώρου πλείστη τὴ καὶ ισχυροτάτη ἐστίν.*
Hippocrat. de Natur. Hominis, Sect. 25.

$\frac{1}{2}$ Altitud. maxim. 21. 30,1. NE 1. } media 29.5 $\frac{14}{100}$.
 ——— minim. 28. 28,5. S b E 3 $\frac{1}{2}$. }
 Dies frigid. 30. 41. NW 1. }
 ——— calid. 23. 26. ESE 1. } media 32 $\frac{2}{100}$.

Variolæ usque grassantur. Febres *Synochæ*; necnon intermittentes quædam *anomale*, quæ verò Typum multò magis regularem servant post leniorem Alvi Fluxum, sive Arte, sive Sponte productum: Vomitu repetito sæpe eliduntur penitus.

Per plurimi Tumore Faucium Dentiumque Dolore & Aurium vexantur; crebrò inde in Meatu Auriculari Abscessus: Aliqui Anginâ gravi corripiuntur.

Diarrhæa & *Colica* frequens, quibus Medela facilis ex *Rhabarbaro Catharsis* & repetita, fortior utiquè dira Tormina plerumque movebat.

Plena Luna 13° OCTOBRI. *Nova Luna* 28°.

Haud parcâ cadente Pluviâ per *Octobris* Initia Atmosphæra facta est longè humidior, atqui nono ortus ab Oriente Ventus ad decimum octavum duravit, Cœlumque fecit apricum plerumque ac siccum; inde Libs, mox Vulturnus, multam demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{3}$. 4. $\frac{11}{5}$. 6. 7. 9. 13. 15. 19. 20.
 $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 24. $\frac{1111}{25}$. $\frac{1111}{26}$. 28. 30 = 3.498. Dig. Dec.

Procella 21 Nocte SW 4 $\frac{1}{2}$ — 25 Noctu SE b S 4.

$\frac{1}{2}$ Altitud. maxim. 14. 30,2. ENE 1. } media 29.5 $\frac{3}{100}$.
 ——— minim. 21. 29,0. SW 4 $\frac{1}{2}$. }

Dies

Dies frigid. 18. 50. E b N 1.

— tepid. 7. 36. S W 2.

} media 43½.

Variolæ passim : multæ Febres putridæ, ac *Catarrhales* ; Fluxiones porro & Tumores Fau-
cium levi quasi cum Anginâ frequentes, sæpiùs
omninò sine Febre. Multi *Asthmate* premuntur.
Pustulata Febricula (*the Chicken and Pigs or Swine's
Pox*) plures Infantes ac Puerulos corripit ; sæpe
abeuntibus Vesiculis Stigmata linquuntur quasi à
Variolis ; quod quidem haud parvam denotat
Humoris Acrimoniam, adeòque postulat pur-
gantia idonea atque demulcentia.—Turpiter per-
sæpe falluntur Aniculæ dum hujusmodi Stigmata
pro veris *Variolarum* Vestigiis jactitant.—*Vari-
olæ* quippe & Morâ, & Maturationis Modo, ab
his longè diversæ sunt—abeunt nempe *Rubeoli*
tertio, vel quarto, *Variolæ* autem non nisi, licèt
quam citissimè, post Diem octavum.

Plena Luna 11° NOVEMBRI. *Nova Luna* 27°.

Eurus Initio, Aquilo sub Finem prævaluit,
Boreas interdum, sæpiùs tamen Libs & Auster
pluviosus ; Aër fuit plerumque crassus valdè ac
tepidus, ad Finem autem rigidum Gelu invasit.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{///}{6}$. $\frac{////}{7}$. $\frac{1}{8}$. 16. 17. $\frac{1}{18}$. $\frac{///}{19}$. $\frac{//}{20}$. 21.

$\frac{///}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{//}{25}$. 26 = 4.024. Dig. Dec.

Grando 23. Procella 19. p. m. S W 4.—
gravis 25 Nocte S W 4^r.

Fulgur & Tonitru ad mediam Noctem ab H.
8. p. m. 6° S W 2.

8 Alti-

§ Altitud. maxim. 14. 30,4. ENE 1. } media 29.8 $\frac{1}{3}$.
 ——— minim. 23. 29,2. SWbW 3. }
 Dies frigid. 30. 66. NE 1. } media 52 $\frac{4}{5}$.
 ——— tepid. 6. 41. WSW 2. }

Variolæ sparsim—Jam ingruunt *Morbilli*, ut plurimum quidem benigni: Febre pustulosâ, & *Rubeolis* Pueri perplurimi corripuntur—Videtur adeò jam inesse Sanguini *Diathefis* quædam peculiaris ad Exanthemata gignenda, quod sæpe sanè notatur; *Variolis* nempe, *Morbillis*, Papulis, & omnium Generum Pustulis, unâ grassantibus—Fortè acris & biliosa Colluvies, quæ Mense *Julio*, *Augusto*, & *Septembri* Intestina torquebat, nunc tendit ad Cutim—Anne deducenda hinc est Indicatio curandi per Sudores, Vesicantia, &c. in Febribus per talem Constitutionem sævientibus?

Febres lentæ *nervosæ* sparguntur, item *Peripneumoniæ* nothæ. *Asthma*, *Angina*, *Rheumatismus* frequens.

Tusses & Destillationes permultos laceffunt cum Tumoribus Faucium, Dentiumque Doloribus, sæpe admodum acerbis.

Plena Luna 11° DECEMBRI. *Nova Luna* 26°.

Ineunte Mense Aër erat crassus valdè, humidus ac subtepidus, post octavum verò multò frigidior, ad Finem frigidissimus: Boreas perflavit sæpiissimè, Vulturus frequenter, præsertim Mensis Initio, Auster interdum. Maxima fuit *Atmosphæræ* Mutatio Die ultimo, Mane nimirum omnia rigidissimo constricta Gelu, Vesperì Pluvia

via perpetua Thermometro à Gr. 80 ad 65 ascen-
dente, irruente Vulturno.

Pluvia 1. 5. 6. $\frac{1}{8}$. 9. 10. 15. 17—19. $\frac{1}{20}$.
21. $\frac{1}{31}$. Nix 25. $\frac{1}{29}$. Grando 9 = 1.070.
Nivis plurimum erat difflatum.

Altitud. maxim.	1. 30,2. Eb S 1.	} media 29.7 $\frac{1}{10}$.
minim.	9. 29,4. W N W 1 $\frac{1}{2}$.	
Dies frigidissim.	31. 80. Mane ENE 1 $\frac{1}{2}$.	} media 63.
tepid.	7. 50. SSE 2 $\frac{1}{2}$.	

Etiannum *Variolæ*; *Morbilli* frequentes; An-
ginæ, *Pleuritides*, *Peripneumoniæ*, & veræ & spu-
riæ, plurimæ: *Rheumatismi* atque *Asthmatis Pa-
roxysmi* vehementes multos corripunt. Coryzæ,
Destillationes, Tusses, Dentium Dolores Fauci-
umque, Colli, ac Capitis Tumores permultos
affligunt undique.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLI fuit
Dig. Dec.
= 20.354.

Plena Luna 9° JANUARIO. Nova Luna 25°.

Ipsò Anni Principio horrida Tempestas, Pro-
cella, Pluvia, Grando, Fulgura, Tonitru; nec
multò lætior fuit totus hic Mensis, quippe nim-
bosus admodum & squalidus: à xiii ad xx per-
petua ferè Procella, Aër interim humidissimus
ac valdè nebulosus; tunc Eurus paululùm dis-
pulit Nubes; mox autem Libs turbidus recur-
rit; ipsò *Januarii* Exitu Corus: à septimo ad
decimum acre Gelu.

Plu-

Pluvia $\frac{///}{1.}$ $\frac{//}{2.}$ 3. 4. 6. $\frac{///}{11.}$ $\frac{//}{12.}$ $\frac{///}{13.}$ $\frac{//}{14.}$ 15.

$\frac{1}{16.}$ 18—20. 24—27. $\frac{//}{28.}$ 29. 30. Grando 1.
Dig. Dec.

2. 17. Nix 7 p. m. ENE $2^x = 3.520.$

Procella 1. SW 4—2 primo Mane WSW 4_x
—gravis totâ Noctē 13 SW 4^x —14 a. m. SW
4—15 WbS 4_x —16 SW 4—19 SW 4—28
SW 4.

Mirror *Barometri* Altitudinem tantis furentibus
Procellis.

$\frac{3}{4}$ Altitud. maxim. 22. 30, 2. E 1. } media 29.6 $\frac{7}{10}$.
minim. 14. 28, 8. SW 4. }
Dies frigid. 10. 74. NNE 1^x . } media 57 $\frac{3}{10}$.
— tepid. 19. 50. SW 4. }

Variole frequentes, *Morbilli epidemici*: Pleu-
ritides, Peripneumoniæ, Anginæ, permultæ;
Arthritide & *Rheumatismo* plurimi plectuntur.

Sub Finem *Morbillorum* sæpiùs accedit sævis-
sima Tuffis atque Peripneumonia, quæ Morbum
haud parùm fatalem reddit: quamprimùm hæc
invadit Sanguis est protinùs mittendus, qui ple-
rumque est viscidus admodùm & tenax: idque
ferè notatur in omnibus Febre acutâ, hac Tem-
pestate, laborantibus; utiquè haud boni est Omi-
nis, si fluidus sit & floridus nimium, quod an-
ginosis accidit interdum & peripneumonicis, at-
que ut plurimùm pessimè significat.

Plena

Plena Luna 8° FEBRUARIO. Nova Luna 23°.

Quanquam per Initia Mensis blanda fuit satis Tempestas, advolans tamen octavo Boreas, Aërem fecit multò frigidiorē; post xiii Ventus varius, xx° autem Boreas recurrit cum aspero Gelu ad Finem ferè perdurans. Aër fuit perficus & valdè frigidus; *Barometri* Statio præalta.

Pluvia 3. 4. 6. 12. 13. 15. 17. 18. 19. Nix
Dig. Dec.
11. 18. 22. 23. 24. Grando 21. 22 = 1.200.
AB. 20. N. 1. Procella 6 Nocte S W S 4.

§ Altitud. maxim. 27. 30,4. ENE 2. } media 29.9 $\frac{1}{2}$.
—— minim. 19. 29,4. SW 2. }
Dies frigid. 28. 68. ENE 2. } media 61 $\frac{1}{2}$.
—— tepid. 1. 54. W 1. }

Morbilli epidemici, Variolæ passim *Rheumatismus*, & *Pleuropneumoniæ* multos corripunt, Tusses ac Tonsillarum Tumores plurimos: Sæva Arthritis, & *Asthma* grave frequens admodum. Diu spirante Vento à Plagis orientalibus * *Asthmatici* semper pessimè se habent; imò novi plures, qui, etsi Lectulo inclusi, talem Ventum mox adventantem præsentunt, atque prædicunt.

Tabifica Tussis, & foeda Scabies plurimos Equos consumit, ac jugulat.

* Vid. Not. F. 1728, Vol. I. de Aëre & Morbis Epidem.

Plena Luna 10° MARTIO. *Nova Luna* 25°.

Siccus maximè & frigidus fuit totus hic Mensis, Aër tenuissimus, vix Imberculus aliquis, Nix nulla, perpetuus spiravit ab Oriente Ventus ad Septentrionem plerumque vergens, hinc acre sæpe Gelu maximæque Pruinae; minimi verò Maris Æstus, at alta semper *Mercurii* Statio—Sub Finem Martii graves ruebant Imbres ad Orientem, hic nulli.

Deg. Dec.

Pluviola 26. 27 = 0.016.

Levis AB. 5. Vesperi NNW 2—maxima 15. H. 9. NbE 1—16 H. 10 NbE 1—24 H. 8. p. m. ENE 1^r.

Zona lucida subflava, ad Modum Iridis quasi, à NE ad SW extensa, transiens porrò per ipsum Lunæ Corpus Die 6 H. 9. p. m. NbE 1.

Altitud. maxim.	4. 30,5. NE 1.	} media 30.0 ¹⁸ / ₁₉ .
minim.	21. 29,8. ESE 1.	
Dies frigid.	1. 68. NE 2.	} media 57 ²⁷ / ₂₉ .
tepid.	31. 51. NbW 1.	

Sparse *Variolæ*, *Morbilli Epidemici*, haud rarò lethales: jam & Pectoris & Pulmonum Morbi sæviunt admodum; Pulsus est multum incitatus & valdè durus, Spiritus difficilis, & inter tussendum acutissimus Dolor, Sputa densa, tenacia, rarò Sanguine tincta—Sanguinis Missio, & Potio diluta, subtepida, liberalis, sola ferè fuere Remedia, Nitro plurimo adjecto.

Tusses, *Catarrhi*, Dentium Dolores ac Fauces, omnes ferè infestant: Angina verò & *Rheumatismi* plures: Asthma pertinax & grave haud pau-

paucos premit; Longi & sævi Arthritidis *Paroxysmi*.

Omnes penè Equi, nisi Stabulis bene curantur, Scabie ac purulentâ Tussi vexati tabescunt; plurimi pereunt.

Plena Luna 8° *APRILI*. *Nova Luna* 23°.

Ineunte *Aprili* tempestiva Pluvia sitientes Agros rigavit, paulòque post grata Tellus lætam Herbam & Flores innumeros potruit, quos fovebat in Dies Ros uberrimus; his tamen infensa est maximè infinita Quantitas Erucarum omnigenarum. Post undecimum Ventus, inter Orientem & Septentrionem ferè perpetuus, siccissimam & tenuissimam reddidit *Atmosphæram*.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{11}{6}$. 7. 8. $\frac{1}{11}$. 12. $\frac{11}{22}$. Grando 6.
Dig. Dec.

11 = 1.152.

§ Altitud. maxim. 1. 30.4. N b W 1. } media 29.8 $\frac{1}{2}$.
minim. 7. 29.0. N W 2. }

Dies frigid. 7. 57. } media 46 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 23. 38. E 1. }

Variolæ plures usque, *Morbilli epidemici*, & sæpe funesti. *Rheumatismus*, Angina, Pleuritides * *Peripneumonix* frequentes; *Ophthalmix* crebræ — Sanguis Febricitantium emissus jam ferè semper est viscidus admodum. Tussés graves, Raucedines, Tonsillarum ac Maxillarum Tumores perplures afficiant. Tempestas est ta-

bidis prorsus infensissima : Febres tertianæ aliquæ * & *Hemitritææ*.

Febris putrida contagiosa, ac pestifera valdè, cum ingente Virium Damno, maximâ Præcordiorum Oppressione, Tremore Tëndinumque Subsultu, Vigiliis, Delirio, Linguâ nigrâ & sæpe aridâ valdè, Faucibus squalidis, & Halitu foetidissimo, jam apud *Launceston* ejusque Viciniam sævit admodum, estque profectò funesta maximè — Pulsus vacillat plurimum mox ab Initio Morbi, idque vel in Robustis : Urina est plerumque lurida, & vapida quasi, sæpe subnigra & olida, rarissimè aliquid inest Sedimenti, interdum verò continet fursurosa quædam inæqualiter sparsa : haud rarò Statu Febris erumpunt atræ *Petechiæ*, sæpe Papulæ, aut Pustulæ livescentes cum oleoso Sudore ac valdè graveolente : Nihil fuit lætius quàm floridæ Pustulæ in ipsâ Morbi *Ἀκμῇ*, Nihil funestum magis lividis & subnigris ; meræ Maculæ nunquam non aliquid Mali denotabant. Alvus nigra, foetida maximè, & citissima, plures sub Finem abripuit : Aliqui Phrenitide post Per-vigilium correpti sunt, plures quasi Veterno, idque sæpe vel ipso Morbi Initio ; si insciis his oborta est Alvi Dejectio certissima sequuta Mors est, Biduo vix exacto.

Genita hæc in Carceribus Febris, & per Comitia provincialia disseminata longè latèque, Plurimos Letho dedit, optimaque sæpe elusit Consilia — Certè qui fuere Sanguinis prodigi nimis Ægrum utiquè, non Morbum, jugulabant ; per-rarò enim secundam Sanguinis Missionem toleravit, si modò ullam.

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 21.

Tres tantum hac Febre laborantes vidi, utpotè tunc haud prosperà Valetudine gaudens, brevì Domum petere cogebar : Sedulò autem Pharmacopolas atque Chirurgos de Morbo percontans didici Sanguinem ab Ægrotantibus detractum primò fuisse rutilum satìs & valdè fluidum, alterà tamen Vice missum lividum semper aut nigrum—Hoc ego ipse profectò notavi, imò vix concretum aliquid in Sanguine cujusdam Generosi, etsi diu antè extracto : desideratus hic & à suis, & ab omnibus, Die decimo tertio interiit stupidus, delirus, purpureis Maculis & lividis Pustulis aspersus.

Cui ignota sunt Comitìa *Oxonienſia* 1577, atque nupera apud *Taunton* Anno 1730, ubi pestifera Mephitis tot tantisque Viris mox fuit Exitio?—Perfrequens est utiquè Generatio Febris pestilentis in augustis immundisque Carceribus; etiam ipse Aër conclusus in Fodinis, Speluncis, Puteis, tandem evadit exitialis admodum; idque longè citius si accedunt quoquè plurima Animalium *Effluvia*, quæ & ipsa porrò magis magisque in Horas virulenta fiunt, brevique pestifera maximè*—*Atmosphæra* stagnans, Frequentia Hominum polluta, mox valdè rancet & ad Respirationem inepta est prorsus : imò Aquæ dulcis Balneum Sorde cutaneâ fœdatum putrescit atque putet brevissimè.—Nec mirum est hoc utiquè quandoquidem à quolibet adulto Homine Unciæ quadraginta ferè rancidi Vaporis quotidie exhalant.

* Mirabilis sanè est Historia apud *Lancisum* (Lib. 1. Cap. 6. de repentinis Mortibus) cujusdam Juvenis, protinus extincti, dum effoderet Quercum antiquam, cujus in Cavernâ magnâ prægrandis Serpens latitabat.

Ociùs hæc eveniunt omnia accedente Calore, quò magis enim Sales Oleaque Animalia attenuantur, & exagitantur Tepore, eò magis ad Putredinem vergunt—Putrescentium autem Animalium Corpora maximè Hominum, plùs semper minùsve noxium Contagium dispergunt; magnas ideò post Strages, putrescentibus nempe Cadaveribus, Febres pestilentes sæpiùs grassantur.—Carnis putrefactæ Fœtor nobis est planè intolerabilis, monente scilicet Naturâ, ut hunc quàm maximè vitemus—Profectò cum valdè putidum expirant Odorem Ægrotantium Corpora à Contagione summoperè cavendum est, nam noxia admodùm spargunt *Miasmata*: id in *Variolarum* Maturatione præcipuè notatur, tunc enim maximè fœtent, & longè longèque magis sunt contagiosæ quàm per Initia Morbi, ut omnibus notum est.

Purgandus est ergo frequenter, atque ventilandus, corruptus Carcerum, Navigiorum, ac *Nosocomiorum* Aër, ubi plurimè congesti sunt Homines, ne longiore Morâ fiat pestiferus—imò, & si sit aliquatenùs pollutus Fumis idoneis corrigendus est, quos inter utilissimus est Aceti & Camphoræ Vapor.

Commodissima porrò erit hæc Aëris Purgatio in Ædibus privatis, ubi ægroti decumbunt, * apertis scilicet subinde Fenestris, accensis Focis, &c; inde namque non tantùm illi, sed & ministrantes, puriorem respirabunt Auram.—Mementi equidem haud rarò me fuisse Gravitate Capitis, Nauseâ, Languore valdè affectum, dum per duas, tresve Horas Febre malignâ laborantes

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 162.

visitassent, mox verò refectum prorsus obambu-
lando in Aëre aprico, aut equitando. Si hoc non
datur acre Acetum, Camphora imbutum, olfacito
subinde, atque expue sæpissimè Salivam.

Plena Luna 8° MAIO. Nova Luna 23°.

Per *Maii* Initia *Eurus* perflavit, isque fortis
admodum, à xvi autem ad xxiv Libs pluviosus
Atmosphæram humectabat plurimum, quæ fuerat
antè siccissima. Non tantum Agros irrigando
gratissimæ fuerunt hæ Pluviæ, sed & insuper E-
rucas perimendo; grassabatur enim plurimum
tunc Temporis ista Pests Herbarum. Porro
maximum impendebat Segeti Nocumentum à
novo quodum Genere Erucarum nigrarum (erant
autem robustæ & prælargæ) hæ Agmine vasto à
Montibus, Torrentis ad Instar, ruentes totos de-
vastabant Agros. Amœnissimus planè ac inso-
litus est Telluris Ornatus, Flores infiniti!

Pluvia $\frac{''}{6}$. $\frac{'''}{7}$. 15. 16. $\frac{'}{17}$. 18. $\frac{'}{19}$. $\frac{'''}{20}$. 21.—
Dig. Dec.

24. 30 = 2.364.

Procella 4 E b S 4—5 E S E 4—6 Mane E
S E 4x. Halo quàm maximus circa Lunam 5.
H. 9. p. m. E S E 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30,2. E b S 2. } média 29,6 $\frac{2}{3}$.
—— minim. 21. 29,4. S W 3. }
Dies frigid. 5. 48. }
—— tepid. 24. 32. S S W 2x. } média 38 $\frac{1}{3}$.

Morbilli valdè *epidemic*i; *Variolæ* & *Peripneu-*
moniæ frequentes: *Tussis* & *Asthma* perpluri-
mos infestant, multi tabidi moriuntur; multi

Hydrope laborant. Febris quædam *Catarrhalis* & *Rheumatica* passim proserpit, in quâ Lingua subatra est aut fusca & valdè squalida, Ora *apthosa*, Halitus teter, Urina lurida, Pulsus celer, mollis, submissus, crebrò etiam *Petechiæ* lividæ, Tussis parva est, at magna Præcordiorum Oppressio—Mihi quidem videtur Species quædam Peripneumoniæ nuper malignè grassantis.

Plena Luna 7° JUNIO. Nova Luna 21°.

Ne vel Guttula Pluviæ decidit Diem ad usque vicessimum *Junii*, Aër interim fuit maximè ficcus & calidus, Ventus Orientem inter & Arctum; post autem Auster haud parùm Pluviæ demittebat.

Pluvia	$\frac{''}{20}$	21.	$\frac{'}{22}$	$\frac{'''}{23}$	$\frac{''}{25}$	26.	27.	$\frac{''}{28}$	$\frac{''}{29}$
Dig. Dec.									

30 = 2.020.

Permagnus Halo circa Lunam 3 H. 10. p. m.
N N E 2. Fulgur & Tonitru 25 Vesperi.

Altitud. maxim.	4. 30. 1.	NE 2x.	} media 29.6 $\frac{1}{2}$.
minim.	26. 29. 3.	SW b S 1.	
Dies frigid.	3. 32.	N N E 2.	} media 25.
fervid.	13. 17.	N 1x.	

Morbilli sunt valdè *epidemici*, & sæpe funesti, Tussi admodùm violentâ consequente, ac Febre quasi peripneumonicâ, quæ plurimos jugulat Infantes. Ubi Cuticula aspera fit valdè & Furfure velut aspersa quarto, vel quinto ab Eruptione Die, fausti est Ominis; è contrâ ubi Maculæ & Papulæ lividæ sunt, aut lividæ, malum omnino.—Febris putrida passim sæpe cum Pustulis rubris ardentibus, sæpe cum permagnis *Petechiis*.
Angi-

Anginæ, Pleuritides, Peripneumonix, magis jam quàm solent frequentes hoc Anni Tempore — *Ophthalmia* plures porro, & Tumores Capitis *erysipelatosi*. — Tussis vehemens *convulsiva*, non solum Pueros sed & Adultos etiam sæpe invadit, præcipuè ad Mensis Finem — Multi Canes rabidi discurrent.

Plena Luna 6° JULIO. *Nova Luna* 20°.

Ad Diem vicesimum quintum *Julii* Tempestas frigida, atque plerumque pluviosa, Vento ferè quotidie variante, Cauro nunc flante, nunc Africo; Aër fuit interim crassus ac multò humidior.

Pluvia $\frac{///}{1. 2. 3. 5. 7. 9. 10-13. 17. 18. 19}$
Dig. Dec.
— 21. $\frac{///}{23. 24. 25}$ = 2.106.

Altitud. maxim. 27. 30, 1. ENE 1. } media 29.5 $\frac{17}{18}$.
minim. 19. 29, 2. SW b S 2. }
Dies frigid. 26. 38. NNW 2. } media 60 $\frac{16}{36}$.
calid. 31. 22. E 1^x. }

Iidem ferè grassantur Morbi, Tusses tamen sunt vehementiores, haud rarò Sanguinem exantlant. Haud pauci jam Ictero & Hydropelaborant: per siccas valde & calidas Tempestates biliosum Sanguinis Principium augetur, mobilissima dissipantur, restant crassiora; hinc Obstructio & Icterus, hinc Hydrops, ruptis nimirum Vasis *Lymphaticis*; adeoque *Ascites* sæpe consequitur Morbos arquatos.

Sub Finem hujus Mensis Conjux mea dilectissima occidit hydropica, lugentibus Amicis,

Vicinis, Bonis omnibus : Mulier sanè pia, prudens, venusta !—Erat illa quadragenaria, gracilis, agilis, temperans maximè ; atqui paulò infirma, heu & hydropicâ Stirpe nata ! nunquam verò antehac vel levissima habuit Signa Hydropis ; nisi quòd, undecim circiter abhinc Menses, dum Curru agitata velociùs per octo, decemve Milliaria Domum peteret, intumuère Crura Pedesque plurimùm—Hujus autem brevissima Mora, nam postridiè evanuit omninò Tumor—Vere tamen elapso, post acerbum Colicum Dolorem, icterico Colore fœdata elanguit, emacuit, perparcam reddidit Urinam, eamque crassam ac fulvam maximè, imò vel subatram—Tandem Tumor aquosus Pedes, Crura, etiamque Abdomen, invasit. Mox Ruri se recipiebat, equitabat quotidie, *Emeticis, Catharticis, Diureticis, Saponaceis, Deobstruentibus, Chalybeatis*, breviter optimâ & idoneâ Medicinâ (quippe duos, tresve Medicos perdoctos consultabam) utebatur diligentissimè—Multò hinc melius quod ad omnia ferè se habebat, ni quòd Urinam parcam valdè, turbidam & subnigram redderet usque. At per breves hæ Induciæ ! paulò enim pòst recrudescabant Mala, adeò ut sub Finem *Maii* redirent & Icterus & Ventris Crurumque Tumor ; augebatur porrò *Ascites* indiès, in tantum utiquè ut Medio *Junio* decumbentem penè suffocaret Moles Aquarum, sursùm nempe compulso Septo transversò—Protinùs idèò ad *Paracenthesin* confugimus, quam firmo admodùm Animo perfert : detractus est Seri subviridis, ad Ignem concrefcentis Congius quasi cum Dimidio—Post duos, tresve Dies se mirè refectam percipit, imò redit brevì & Stomachi & Corporis Vigor. Rus pe-

tit iterum, equitat alacriter, evanescit Cutis Flavido, vividi sunt oculi, Spiritus facilis.—Lætissima jam mihi Spes Salutis effulsit; sed enim quàm vana! nam vix tribus exactis Hebdomadis increvit rursus Abdominis Tumor ad Molem enormem: iterum ergo emissæ sunt Aquæ ad eandem ferè Quantitatem, sed ichorosæ, sed fœtidæ, sed sanguinolentæ minimèque ad Flammam coagulantes—Perstabat ex Foramine Trochære factò, Fluxus prælargus Humoris subalbidi, purulenti, olidi, quo consumpta peribat optima Matrona Die Julii 27°.—Sed quò me rapit dulcissimæ Uxoris Amor?—Ast!—*Quis Desiderio sit Pudor aut Modus tam cari Capitis?*

Ὀλύμπια Δώματα νείει—persequar ad Astra.

Plena Luna 5° AUGUSTO. Nova Luna 19°.

Per totum hunc Mensem lætissima Tempestas, prospera Messis, optimum Frumentum; Aër fuit siccus admodum ac purissimus: Ventus plerumque ab Oriente venit, sæpe haud parum calidus: maxima subinde Roratio!

Innumerabiles Vespæ, Cicadæ, Erucae: Multi Canes rabiosi.

Dig. Dec.

Pluvia 16. $\frac{11}{17}$. 26. 27 = 0.434.

§ Altitud. maxim. 9. 30.1. E B N 1. } media 29.7 $\frac{1}{2}$.

minim. 16. 29.5 S 2^x.

Dies frigid. 19. 34. E 2^x. } media 26 $\frac{1}{2}$.

— fervid. 3. 18. E 1.

Morbilli adhuc Epidemici, Variolæ passim, Cholera frequens: Febres quædam intermittentes,

tes, quotidianæ ut plurimum : perpauci aliter Morbi.

Plena Luna 3° SEPTEMBRI. Nova Luna 17°.

Hic quoque Mensis fuit plerumque siccus, sed pro Anni Tempore valdè frigidus, imò duodecimo Mane Glacies super plurima Stagna, atque Pruina maxima per Agros; Ventus ab Occidente sæpe vergens ad Austrum, sæpiùs tamen ad Septentrionem; à xvi° ad Finem Orientem inter & Septentrionem perflavit. Ob magnam Siccitatem omnes ferè Fontes arescunt: maximæ Rotationes sæpe ac Pruinæ.

Pluvia 2. $\frac{1}{4}$. 6. 7. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{1}{10}$. 11. 14. 27. $\frac{1}{28}$.

Dig. Dec.

29 = 1.402.

Altitud. maxim. 18. 30.0. ENE 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$ 4.
minim. 29. 29.1. N 2^x.

Dies frigid. 12. 55. Nb E 1^x. } media 41 $\frac{1}{3}$.
tepid. 1. 29. SW 2.

Cholera, *Ophthalmia*, *Variolæ*, necnon Febres putridæ passim: Juniores Vermibus infestantur maximè.

Febriculæ quædam levi cum Anginâ quasi, Tussi, Dolore Dentium Fauciumque Tumore frequentes valdè: ex facili leni Sudore discutitur, aut breviter mitiore *Cathartico* fugatur. Haud Dubio repentinum Autumnî Frigus fuit in Causâ hujus Febriculæ, imminutâ scilicet plurimum *Perspiratione Sanctorianâ*.

Morbilli epidemici, ac sæpe lethales, vehementissima Tussis ut plurimum comitatur, undè haud

haud rarò Peripneumonia suffocans sub Finem, interdum spumofum atque fincerum Sanguinem expuunt; hinc frequenter nimis cita Mors aut certa *Pbtbifis* — *Diarrhæa* mucosa, perliquida, enormis *Morbillos* sæpe subsequitur; inde Abdomen durum & maximè tensum, at reliqui Corporis summa Macies, tandemque Tabes funesta: idque semper ferè si atra dejiciuntur & valdè foetida.

Optimum & Tussis & Peripneumonix Remedium est opportuna Sanguinis Missio, ducta mox leni Clysterè Alvo, imò blandè purgata; *Diacodio* interea licet compescere Tussis Sævitiā, a cremque avertere Distillationem admoto inter Scapulas *Epispastico*; *Dietam* verò diluentem, mollem, omni Carne vacuum instituere oportet. Sive derepentè recedunt pustulosæ Maculæ, sive lividæ aut plumbeæ quasi evadunt, mox oritur summa Præcordiorum Oppressio, Anxietas, Delirium, &c; tali in Casu Linteis, aut Pannis calidis protinùs confricandum est totum Corpus, porrò ad *Cardiaca* idonea confugiendum est, qualia sunt *Lap. de Goa*, *Crocus Anglicus*, *Moschus*, *Camphora*, ex *Julapio* temperato, aut Vino tepido; nec utiquè novi meliora, nedum tutiora ubi *Morbilli* evanescunt, aut minùs vividi spectantur. Erumpentibus *Morbillis* ab Aëre frigido madidisque Sudore Indusiis summoperè cavendum est, his enim creberrimè reperiuntur *Exanthemata*; neque interea æstuoso in Aëre continendus est Æger, nec Stragulis nimium onerandus, nam & Spirandi Difficultatem adaugent, & Sudores immodicos eliciunt, præcipuè in Adultis, quo nihil pejus — Faceffentibus porrò *Morbillis* *Diarrhæa* ingruit sæpissimè: hinc summâ opus est

Cau-

Cautelâ, nec sanè præproperè sistenda est; por-
rige subinde modicam *Rhabarbari Dofin* cum
Nuce *Moschatâ* tostâ, Decoct. C. C. C.—*Oryzæ*
—*Fracastorii*; & Misturam absorbentem aliquam
ex Corall. rubr. lævig. Bolo Armenâ & Aq.
Cinnam. tenui confectam exhiberi jubeo.

Plena Luna 3° OCTOBRI. *Nova Luna* 17°.

Magna jam incipit Cœli Mutatio, plurima
nempe ruente Pluviâ, furente quoquè Procellâ,
& per Initia, atque Mensis Exitum: medio ta-
men Apricitas, Boreâ plerumque flante à xv ad
xxii: *Atmosphæra* multò fit crassior ac humidior.

	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Pluvia	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	13.	14.			
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	16.	17.	25.	26.	27—29.	30.	31.							
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	27.	31												

Grando 3.
Dig. Dec.
27. 31 = 4.960.

Maximus Maris Æstus & Procella Vesperi 2.
W S W 4 Procella 3 primo Mane & a. m. N W
4, Nox procellosa 5. W S W 4, item 7 S S W 4,
—porrò 26 W N W 4. Procella cum Fulgure
27 primo Mane—29 Nocte S W b W 4—30 S
W b W 4—31 p. m. S S W 4. Glacies 20. 21. 29.

Altitud. maxim.	22.	30,2.	E N E 1.	} media 29.6 $\frac{1}{3}$.
minim.	3.	28,8.	N W 4.	
Dies frigid.	28.	59.	N N W 2.	} media 47 $\frac{1}{3}$.
tepid.	10.	40.	S W 3.	

Rheumatismus & *Diarrhœa* frequens, *Dysente-
riæ* quædam: *Raucedines*, *Faucium Asperitates*
ac *Tumores* plurimos vexant. *Variolæ* passim
multæ adhuc, cæque sæpe malæ admodum in-
dolis,

dolis, *Petechiis* scilicet lividis haud rarò comitantibus: imò ipsi Morbilli livescentes, jam multò plures jugulant quàm *Variolæ*, præsertim Adulteros, qui universâ quasi *Necrosi* pereunt anhelis, suffocati, stupidi prorsus.—Nil lætius evenit, abeuntibus *Morbillis*, quàm rupta & aspera valdè Cuticula.

Plena Luna 1° NOVEMBRI. Plena Luna 30°.
Nova 16°

Pluviosus fuit admodum & frigidus hic Mensis, crebrò etiam nimbosus: incipiente *Novembri* Ventus ab Occidente venit, à decimo autem ad Finem usque ab Oriente, flectens plerumque ad Septentrionem, aliquando tamen interfuit Vulturus—Aër per totum gelidus, caliginosus, humidus—*Barometri* Statio humilis.

	<u>///</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>//</u>	<u>/</u>	<u>///</u>	<u>///</u>
Pluvia	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
									13.
									20.

<u>//</u>	<u>////</u>	<u>///</u>		
21.	22.	23.	25.	26.
			29.	30.

Grando vehemens
Dig. Dec.

1. Nix 16=5.267.

Procella 1 p. m. & insequente Nocte S W 4x
——— 10 Nocte E 4x—25 Nocte S E 4x:
—vehemens 30 primo Mane E S E 4x.

Rigidum Gelu 15. 16. 29.

8	Altitud. maxim.	28.	30,0.	NE 1.	} media 29,3 $\frac{1}{8}$.
	minim.	13.	28,7.	ESE 3.	

Dies frigid.	29.	68.	NN E 1.	} media 59 $\frac{1}{2}$.
— tepid.	1.	53.	SW 4x.	

Iidem usque dominantur Morbi, atqui Distillationes Coryzæ, Tussis, *Rheumatismi* multò sunt severiores.

DECEM-

DECEMBRI.

Sæpe Boreas, sæpe hoc Mense perflavit Vultur-
turnus unde *Baroscopii* Statio fuit præalta, à
xviii ad xxii intervenit Libs decidente Pluviâ—
nec tamen hoc detrufit *Mercurium*, altior quini-
mò surrexit, adeò ut xxii Gradum 30.4 attige-
rit; quod quidem haud parùm mirabar, sed
Atmosphæra erat crassissima, & Euris mox præ-
valebat per Dies aliquot—Sub Finem tamen
Libs recurrit. Acre sæpe Gelu incipiente Men-
se, à xii ad xvii asperrimum.

Pluvia 18. ^{//}19. 20. 23. 27. ^{//}28. 29. [/]31.
Dig. Dec.

Nix 3. 7. = 1.342.

Ventus vehemens 14. 16 ENE 4x Procella
28. Mane S W 4x Circius furens 30 p. m.

§ Altitud. maxim. 22. 30.4. SSW 1x. } media 30.031.
minim. 29. 29.6. SW 1.

Dies frigid. 15. 76. ENE 2x. } media 63 1/3.
tepid. 31. 51. SW 3x.

Cita ac torminosa Alvus multos adhuc exercet,
imò interdum etiam cruenta: *Asthma* grave plu-
res premit—Tusses, Raucedines, Colli Tumores
& levis Angina plurimos. *Variolæ* passim, *Rheu-
matismi* multi. *Peripneumonix* aliquæ; & Fe-
bres lentæ putridæ.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLII
Dig. Dec.

= 25.783.

Nova

Nova Luna 13° JANUARIO. *Plena Luna* 28°.

Densa fuit admodum ac humida, toto ferè Mense *Atmosphæra*, plerumque etiam frigida, *Barometri* Statio interdum præalta, à magnâ partim Aëris Densitate. Ventus Initio ab Occidente spiravit, à nono autem ad decimum octavum ab Oriente, declinans ad Septentrionem,isque frigidus & glacialis; inde Libs multò tepidior.

Pluvia $\frac{''}{1.}$ 2—4. $\frac{''}{5.}$ 7. 8. 10. 19. 24. $\frac{''}{25.}$
Dig. Dec.
26. 28. 31. Grando 6—1.5 12.

Magna *AB.* 12. H. 8. p. m. Nebula valdè foetida 22 Malacia. Procella 5 tota ferè Die W S W 4—26. p. m. & per Noctem S W 4x.

3 Altitud. maxim. 11. 30,7. ENE 1. } media 29.9 $\frac{29}{19}$.
—— minim. 26. 29,3. S W 4x. }
Dies frigid. 21. 69. NNE 1. } media 59 $\frac{23}{13}$.
—— tepid. 7. 52. S W 3. }

Variolæ adhuc passim: *Rheumatismi*, Pleuritides, Tusses plurimæ; Angina mucosa, Tumores Faucium Dentiumque Dolores frequentes; Febres aliquæ lentæ—Cervi perplurimi pereunt undique.

Nova Luna 13° FEBRUARIO. *Plena Luna* 27°.

Crassa perstat & humida *Atmosphæra* Constitutio, est autem paulò tepidior, Ventus incertus valdè, variat ferè quotidie; Corus tamen prævaluit!

Pluvia

Pluvia 1. 2. $\frac{''}{3}$. $\frac{'}{4}$. 6. 9. $\frac{''}{11}$. 13. 14. $\frac{'}{15}$. 22.

Dig. Dec.

$\frac{'}{23}$. $\frac{'}{25}$. 27. = 1.584.

Procella & Fulgura 3. p. m. S W b W 4.

3 Altitud. maxim. 8. 30, 2. N W b W 1. } media 29.8 $\frac{1}{2}$.

minim. 3. 29, 3.

Dies frigid. 20. 64. N E 1. } media 54 $\frac{20}{8}$.

— tepid. 9. 51. W 1.

Febris *catarrhalis* & *Variolæ* passim, Tussis innumeros infestat cum Tumore Faucium, Tonsillarum, & levi sæpe Anginâ: Febres aliquæ tertianæ. Tempestas sanè est parùm morbosa; atqui plurimi etiam Seniores Lumbricis rotundis vexantur.

Fœdissima Scabies adhuc inter Equos, quæ diu jam duravit.

Nova Luna 14° MARTIO. *Plena Luna* 28°.

Frigidus succedit *Martius* Aërisque Temperies multò ficior; ineunte Mense Malacia crebra, exeunte verò nimbofa Tempestas *Barometrum* depressens plurimùm; à vii ad xxi Ventus aquiloni & Gelu subinde.

Pluvia 1. 3. 6. $\frac{''}{11}$. 13. 22. $\frac{'''}{25}$. 26. $\frac{''''}{27}$. 28.

$\frac{'}{29}$. 30. Nix & Grando 7. $\frac{'}{10}$. 11. 23. 25. 30.

Dig. Dec.

= 2.946.

Maxima AB. 8 Vesperi N N E 1. Nubeculæ lucidissimæ sequi videntur Venti Cursum.

Procella 25 S W 4.—26 à primo Mane per totam

totam Diem S W b S 4, at Vesperi & durante Nocte Circius vehementissimus—Turbo gravissimus 28 ab Horâ 5. p. m. ad 9. W N W 4^x.

§ Altitud. maxim. 15. 30, 2. N b E 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 26. 28, 8.

Diés frigid. 8. 66. N N E 1^x. } media 55 $\frac{22}{30}$.
 — tepid. 9. 51. Malacia }

Variolæ frequentes, Febres intermittentes plures & quotidianæ & tertianæ. *Rheumatismus*, necnon Tormina passim; Tussés ubiquè. Gravedines, Dolor Dentium, Capitis & Tonfillarum Tumores cum Asperitate Faucium multos molestant.

Scabies fœdat Equos maximè, extrema Macie confecti plures pereunt, aliqui Anginâ atque Tussi suffocantur.

Nova Luna 13° APRILI. *Plena Luna* 27°.

Pars prior *Aprilis* fuit valdè frigida, posterior tepida satîs; Ventus ab Septentrione undecimum Diem adusque, sæpe cum Nive, Grandine, Gelu: à xiii ad xvii orientalis, pòst varius; plerumque tamen è Plagis australibus.

Pluvia 1. 4. 5. 8. 11. 13. 14. 18—21. 23.
 25. 26. 27. 28. Grando 1. 4. 5. Nix. 2. 5. 6
 Dig. Dec.
 = 1.662.

Levis AB. 1. H. 8. p. m. N b E 2. Fulgur & Tonitru 21 Nocte, Circius vehemens 22.

VOL. II.

H

§ Alti-

8	Altitud. maxim.	6.	30,1.	N 1.	} media 29.7 $\frac{1}{2}$.
	minim.	26.	29,3.	SS W 3.	
Dies frigid.	2.	64.	N 2.	} media 49 $\frac{1}{2}$.	
tepid.	30.	35.	SS W 2.		

Variolæ adhuc ; multæ Febres intermittentes *, tertianæ potissimum : Pleuritides & Peripneumoniæ plurimæ : Febris putrida passim cum Eruptione *miliari* rubrâ plerumque ; omnes ferè levi Anginâ per Initia corripuntur, sub Finem Cuticula multùm desquamatur.—Plures tabidi moriuntur.

Dysenteria cruenta multos, inter Popellum præcipuè, perimit, Vermes teretes ferè semper ejiciuntur, etiam ab Adultis, imò & à Senioribus—Nescio pol unde, sed per plures jam Menses juniores, necnon Ætate provectos, longè magis infestaverunt Vermes quàm memini unquam. An ab immensa Copiâ Fructuum omnigenorum, quæ undique per Æstatem & Autumnum Anni 1742 maximè scatebat ? his certè utitur nimium Vulgus semper cum abundant, imò & abutitur ; quippe Cerasa, Pruna, Poma perpetuò devorat.

Maximè sæviit hæc *Dysenteria* in Oppido *Plimton*, ejusque Viciniâ, Solo scilicet pingui & uliginoso, Morbisque plùs satìs obnoxio, Febribus lentis præfertim & intermittentibus : duravit autem ab Initio *Aprilis* ad *Maii* Finem. Huic plerumque accessit Febris, rectiùs fortasse dicerem hæc fuit ipsius Febris *Symptoma* ; nam ab ipso sæpe Principio, atque ante ulla Tormina, haud levis urgebat febriculosus Ardor cum Pulsu inci-

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 20.

tatiore, ac Linguâ scabrâ; quid quod & sæpissimè cum manifesto satis Horrore ingruerat Morbus, & non rarò utique More *Hemitritææ* Cursum tenebat—Haud certè sciò an fuerit Febris *epidémica*, mox describenda, ad Intestina translata: hoc sanè mihi compertum est, *Dysenteriam epidemicam* non esse frequentem Veris Sobolem*.

Ut ut fuerit, aderat semper Febris plùs minùsve, Sanguinem ideò plerumque incipiente Morbo detrahi curabam, ne gravior foret Intestinorum Inflammatio, indeque acerbiora Tormina, certiorque demùm Gangræna—Urgebant semper per Morbi Initia Nausea & Vomitus; Monitis adedò Naturæ obsecundans nunquam non Ventriculum elui jubebam, dato *Ipecacoanbæ* Decocto aut Infusione, epoto mox affatim Oryzæ aut Pulli Jusculo. Hoc peracto porrigendum est *Rbabarbarum* subinde cum liberali, diluente & demulcente Potione, quâ lenitur Acrimonia Humororum & in Sanguine & in Visceribus, dum *Rheum* acrem expellit Colluviem. Ita sanè necessaria est lenis Alvi Purgatio Initio omnis *Dysenterizæ*, ut si hæc omittatur, Astringentia verò & *Opiata* præproperè dantur, mox gravissima accedunt Tormina, Stomachi Ægrotudo, Singultus, *Apt hæ*, tandemque Intestinorum, *Sphacelus*, quem cita Mors excipit.—Hoc equidem Monitum in *Dysenteriis* curandis perpetuò observari debet; in hac autem, de quâ nunc agitur, pernecessarium est utiquè, quia procedente Mor-

* (Δυσήληξη) γίνηται Θέρως ἄρη, δεύτερον Φθινοπώρον, ἥσσοι Ἡγο-, ἤκιστα χειμῶνος. *Aret. Cappad.* Cap. de *Dysenteria* ad Finem.

bo Lumbrici ferè semper ejiciuntur. Quid sperandum Hoste in imis Visceribus hærente? Quid si hostem Calomelano expugnes? Hoc feci hercle sæpius, nec pœnitendo certè Eventu, quinimò lætâ sæpe reportatâ Victoriâ.

Non ita tamen Purgantibus insistendum est, quasi Nil ultra desiderat Morbus; Tormina namque *Anodynis* subinde sopienda sunt, nimiusque porrò Fluxus Humorum est cohibendus; intereà corroboranda sunt etiam Intestina—facit ad hæc omnia commodè satis *Confectio*, ut dicitur *Fracastorii* (præcipuè Nuce *Myristicâ* tostâ, aut Cinnamomo adjecto) si debitâ exhibeatur *Dosi*, & si sit necesse, *Extracto Thebaico* adjuta. Decoct. C. C. C. aut Lac dulce cum Aquæ fontanæ Duplo & Cinnamomi paululo coctum, aut Serum Lactis tenuissimum, in quo Ferrum ignitum sit extinctum, sorbenda sunt subinde. Si Bilis acris abundet, si *Dysenteria* sit valdè cruenta, & sinceri Sanguinis plurimum dejiciatur Tinctura Rosar. rubr. probè acidula juvat, aut Vinum rubrum austerrum dilutius—Plerumque, sub Morbi Finem, excruciat maximè gravissimus quasi Intestinorum Descensus, & perpetuus desidendi Conatus; hoc nihil æquè levat ac *Diascordium*, aut Theriaca Andromachi, ex Lacte dulci, aut Decocto albo, Clystere data. Sed de Morbo *dysenterico* mox plura.

Sub Finem *Aprilis* per omnem hanc Regionem grassata est Febris quædam levis plerumque, interdum verò haud parùm truculenta, Senibus & Pueris pulmonariis.—Simul & semel innumeros corripuit Horrore quodam vagante, & Gravitate Capitis, mox quoquè Dolor ejus accessit, Artuumque porrò & Dorfi, plurimos tamen universa quasi Lassitudo molestavit. Protinùs maxima

ima fuit Distillatio acris per Oculos, Nares, Fauces, sæpissimè etiam in Pulmonem, unde Sternutamenta ferè perpetua, ac vehemens plerumque Tussis : Omnibus adfuit Pectoris quædam Strictura, & Gravitas permolesta. Secundo adeò Die invaluit Febris, Pulsusque multò citatior factus est, auctâ quoque Spirandi Difficultate, præcipuè si Sanguinis Missio fuerat neglecta. Sitis utiquè non admodùm urgebat, at Lingua erat peralba, veluti Cremore Lactis suffusa : Oculi leviter inflammati, atque in imâ Orbitâ dolentes, Lumina refugiebant.

Non uno Tenore processit Febricula, sed nunc Algor, mox Ardor incessit, nullo prorsùs servato Ordine ; cum eo tamen ut haud rarò tandem in Tertianam aut Semitertianam * facefferit. Erat autem ominis multò peioris *Peripneumonia* *, seu *Pleuropneumonia*, quæ quidem ob Sanguinis Abundantiam, atque Tussis Vehementiam accedebant interdum, his præsertim, qui calidiore Regimine & Medicinâ usi fuerant : nec infrequens, eandem ob Causam, erat Pleuritis * aut *Rheumatismus* acutus, præcipuè neglectâ Sanguinis Missione, ineunte Morbo.

Sanguis extractus fuit nonnunquam valdè glutinosus, plerumque tamen floridus, at non multo Sero scatens ; varius autem fuit in variis, quo magis ardebat Febris utiquè eo tenacior : qualiscunque verò visus est Sanguinis Status, haud magnum ejus Dispendium ferebat hic Morbus ; imò, si vel *Peripneumoniæ* aliquid subesset minimè largam sine maximâ Virium Ruinâ, rarò

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

plus Vice simplici Venæ Sectionem tolerabat : nec in hac solum, sed in omni Febre *Catarrhali epidemicâ*, hoc ferè perpetuum notavi ; namque minuendo Naturæ Vires nimium *Perspirationem* inhibet, indèque acrem auget Colluviem.—aliqua tamen Sanguinis Missio, ipso Morbi Initio, in robustis adultis, lautè viventibus, *plethoricis*, juvat semper.

Per totum Febriculæ Decursum sputabant largissimè, quod Pectori Levamen erat maximum ; Tussis autem Importunitas haud leviter *Tracheam* atque Pulmões exasperabat ; Oleum ideò *Amygdalinum*, *Sperma Ceti*, imò & *Papaveris* aliquid, *Diacodium* putà, *Tinctur. Thebaic.* aut *Elixir Pargoricum* desiderabat : Ultimum hoc porrò utiles blandosque Sudores movebat, nec intereà gravabat Pectus. Frequenter equidem Pulmonum Gravitas & Præcordiorum Oppressio *Oxymel Scillitic.* *Lac Ammoniac.* *Syrup. Croci*, aut tale quid, deposcebat—atqui, hoc in Casu, fuit instar omnium ferè lene *Emeticum* ; quod quidem, mox post Venæ Sectionem, totum hoc sæpissimè discussit, & non uno solum Nomine Opem tulit.

Pars Ægrotantium longè major faciles, æquales, benignos habuere Sudores secundo, vel tertio Die, qui, unâ comitante Exspuitione largâ, Febrem quinto profligârunt, sæpe etiam citius, manente tamen ut plurimum haud parvo Virium Languore—Hæcce autem Nihil promovit felicius quàm diluens, demulcens, tepidus Potus ; Serum nempe Lactis dilutissimum, Hordei, aut Avenæ, aut conditi Eryngii Decoctum ; Hederæ terrestris, Tussilaginis, *Glycyrrhizæ*, Infusio ; imò per plurimis *Coffee* Potus profuit maximè cum Lactis dulcis pauxillo—Apage verò *Sales Spiritusque*,
ut

ut vocant, *volatiles*, calida *Alexipharmaca*, & id Genus alia, quæ turbant certè plurimùm, parùm verò utiliter exturbant Morbum.—Cæterùm Febrèm, acriùs atque diutiùs inhærentem, *Hauftu Salino communi* * moderabar.

Crebrò autem sub Febriculæ Finem multæ, rubræ, urentes Pustulæ erumpebant, sæpe repentina, imò & profusa Diarrhœa accedebat sævis interdum cum Torminibus, factâ nimirùm morbosæ Materiei ad Intestina *Metastasi*—Hinc fortè & *Dysenteriae* plurimæ, quæ & hîc quoquè tunc Temporis passim grassabantur; mucosæ fateor, rarò cruentæ—Aded tamen parùm cohibendus erat hic sese levandi Naturæ Conatus, ut per Alvum sæpius Sponte facesseret Morbus; atque ided Manna, *Rhabarbaro*, *Tartaro solubili*, *Tamarindis*, &c, promovendus: fortiora tamen Purgantia horrenda plerumque excitabant Tormina Viresque penitùs disjiciebant.

Febris hæcce, utcunque longè latèque maximè vulgaris, paucis fuit Exitio; quandoquidem tertio ut plurimùm quartove Die evanuit, modò se reciperent maturè eâ correpti—Res fuit herclè *Dietæ* potiùs accuratæ, ac debiti Regiminis, plerumque quàm Medicinæ elaboratæ; non quòd non interdum multò plus Curæ atque Diligentiae poposcit. Sudores æquales, at moderati, Sputa multa, facilia, Urinæ largæ, lutulentæ facilè sublevabant Morbum: mirabar sæpissimè immensam Urinæ Subsidentiam; quâ tamen Nil auspiciatius.

* Vid. supra Mense *Junio* 1740.

Eadem prorsus videtur hæc Febris, quæ per totam Europam, hoc Vere, sub Nomine *Influenza* grassata est : apud Gentes tamen Australes longè magis quàm hic fuit pestifera ; quinetiam & apud Londinenses ipsos Funera auxit maximè, imò uno duntaxat Hebdomade ad Mille saltem.

Nova Luna 12° MAIO. *Plena Luna* 27°.

Sicca fuit admodum, perpulchra & calida *Atmosphæra* Diem adusque vicesimum secundum ; Boreas perpetuus ad xvii, indè Vulturnus, pòst xx Libs pluviosus.

Pluvia 16. 20. 22. 23. $\frac{1}{25}$. 26. $\frac{1}{27}$. 28. $\frac{1}{29}$.
 $\frac{1}{30}$ Dig. Dec.
 $30 = 0.866$.

Fulgur & Tonitru è Longinquo 20 p. m. levis
 Procella 27 Noctæ S W b S 4x Grando 30——&
 & $\frac{1}{2}$ conjunctissimi sexto Die H. 11. p. m. adeò
 ut unum tantum Planetam quasi exhibeant.

☿ Alitud. maxim. 8. 30,1. NE 1. } media 29.6 $\frac{3}{4}$.
 ——— minim. 21. 29,2. S S W 2. }
 Dies frigid. 1. 36. Malacia. } media 30 $\frac{1}{2}$.
 ——— fervid. 7. 22. N N E 1. }

Plurimi *Apoplexiâ* correpti sunt, & plures erepti, nec hic tantum sed & aliis in Locis : an ab enormi, ac intempestivo Æstu Sanguinem subito nimis expandente ? Febres quotidianæ & tertianæ creberrimæ longè latèque ; *Variole* & *Morbilli* passim. — Tussis ferina * frequens & pertinax

* Consule quæ dixi de Pertussi Puerorum, Vol. 1°.

maximè, sæpe post *Morbillos* funesta — Fugat hanc optimè modica Sanguinis Detractio, & lenis Alvi Purgatio, confert Rusticatio, frequens Equitatio, atque accurata & lenis *Dieta*; ubi parùm hæc proficiunt Medicamenta ex Argento vivo præparata & *Cortice Peruviano* rarò fallunt, quoniam Lentorem attenuant Sanguinis, & Vermes pellunt, qui jam diu perplurimis maximè sunt infesti, nec cedit plerumque Tussis nisi his ejectis: — Haud rarò prodest Balneum frigidum, ubi omnia incassùm exhibita fuere: cave tamen ne adsit Febricula, vel *Hæmoptoe*.

Dysenteria cruenta, aut mucosa, sævit maximè apud *Plimton* & Vicinitatem: Perplures Lumbricos dejiciunt, nec tamen indè multùm levantur; imò sæpe haud multò post frigidus Sudore correpti mox Animam agunt: credo quòd *gangrænosa* Sanies fædos hos Inquilinos expellit: unàque cum his exeunt interdum Carunculæ lividæ, foetidissimæ, haud dubia utiquè *Signa Sphaceli Intestinatorum* *.

Venæ Sectionem, quam superiore Mense ad *Dysenteriam* consului jam etiam magis necessariam invenio ipso protinùs Morbi Initio, ob magnum sanè & insolitum Tempestatis Calorem: turgescit enim indè quamplurimùm rarefactus Sanguis, atque majorem excitat Inflammationem. — Vix unquam utiquè datur *Dysenteria epidemica* ubi Intestina non sunt, aliquo saltè Gradu, inflammata — Ubi autem viget Inflammatio, ibi rectè semper mittitur Sanguis quamprimùm;

* ἢν ὑπὸ Δυσεντερίης ἔχομεν οἶον Σάρας ὑποχωρήσωσι, διαχέσινον.
Hippocr. Aph. 26. Sect. 4.

Vires, Ætas, Pulsus, Constitutio & Anni & ipsius Ægrotantis Modum statuunt. — Movenda dein est leniter Alvus (deterſo priùs Ventriculo ſi Nauſea & Vomitus urgent) blandis tamen ſemper Purgantibus utendum eſt, quæ namque ex Aloe, Scammonio, aut Colocynthide confecta ſunt, in hoc Morbo Toxica ſunt prorsùs, non Remedia — Omnium ſanè optimum eſt Rhabarbarum, quod exhibendum eſt ſæpiùs (toſtum id ſemper ſi ab Indiis venit Orientalibus) cum Nucis moſchatae aut Cinnamomi pauxillo — Tinctura hujus ex Vini Spiritu, utpotè reſinoſa nimis, parùm proficit; longè melior eſt quæ Vino rubro extrahitur.

“ Adeonè verò purgandum eſt ſi cruenta ſit “ Alvus & perliquida ? ” etiam; acris etenim Inteſtinorum Colluvies ſit longiore Morâ acrior longè, vellicatque multò magis, unde majorem excitat Inflammationem, ipſumque adeò auget Morbum. — “ At Sanguine tincta eſt Alvi Pro-
“ luvies — ſit ita; ” nocetne modica Sanguinis Exſpuitio in Pulmonum Inflammatione; nonne hæc ſæpiſſimè, ſub certis Conditionibus, Morbum expedit? — Si alterutrius *Meſentericæ*, aut *Cæliacæ*, Arteriæ Ramuſculi, Inteſtinorum Tunicas perreptantes, obſtruuntur, factâ Reſolutione, factâ Coctione, obſtruens Materia ſæpiſſimè in Cavo Inteſtinorum funditur; ſolvitur adeò Obſtructio, ſolvitur Inflammatio, ſolvitur Morbus. — Dolentes, inflammatae *Hæmorrhoides* internæ Sanguinem frequentiffimè emittunt: an Periculo eſt hoc Ægrotanti, an Levamento? — Si ſit igitur Alvus moderatè tantùm cruenta Nihil horreſco: leni eluo Potione irritantem Acrimoniam, imò & corruptam blandè expurgo Colluviem, quæ citò aliter

aliter exulcerata facit Intestina, tandemque *sphacelata*, cujus Signa sunt certissima Ventris Proluvies atra, oleosa, foetidissima cum lividis Carunculis, Sudores frigidi, Singultus, Delirium. Porro singulare quoddam in hoc Casu nonnunquam observavi, *Symptoma* semper lethale, Urinam nempe limpidam, at parcam valdè; id præcipuè in perbono quodam hujus Oppidi Sacerdote, cui primò Nausea, Vomitus, Alvus torminosa atque cruenta valdè levi cum Febre, Lingua perarida, Urina ferè nigra: Die quinto omnia magis pacata, sexto tamen recrudescebant Tormina, Dejectio atra, saniosa cum Grumis quasi carnosus horrendi Foetoris, Urina perparca, frequens autem, at prorsus limpida, etsi *Rhabarbarum* assumpserat quotidie; mox adèd Singultus, leve Delirium, Sopor nimius, tandemque nono, Finis omnium Malorum, Mors. Hic utiquè Intestina ita *sphacelata* videbantur ut Nil omninò ad Sanguinem transmitterent.

In nullo sanè Morbo magis necessaria est diluens & demulcens Potio quàm in *Dysenteria*—in hac utiquè pura puta Aqua fontana haud parùm Pauperculos juvabat, qui ad Fontem quendam sacrum, si Diis placet, & *antidysentericum*, confugère—innoctus saltem erat & purissimus, multòque magis Nomen *Aquæ Vitæ* meruit quàm *Spiritus Vini ardens*, hoc Titulo celebratus, quo se nimium sæpe in hoc Morbo Popellus abutebatur. Aquæ bene frigidæ Potionem commendat vel ipse *Celsus* *, si vetus Vitium est; atqui inter Initia egelidam suadeo, quippe quæ & Intes-

* *Cels.* Lib. 4. C. 15.

tina eluit meliùs, & per *Meseraica* Vasa & *Lactea* ad Sanguinem diluendum transit faciliùs : cum verò elota sit acris Viscerum Colluvies, ea sanè firmanda sunt, adeòque tunc haud perperràm exhibetur frigida — hâc solâ utiquè, *Opii* pauxillo adjecto, nonnunquam *Dysenteriae* Curationem consummavi, probè purgatis priùs Intestinis — Non multùm equidem probo oleosa & glutinosa ; si horum aliquid, derasis ac Muco naturali privatis Intestinis, desideratur *Decoct. alb. Emulsio Amygdalina* cum *Gum. Arabic. Mucilago Semin. Cydonior.* exhibeantur ; in Victu porrò *Gelatina C. C.* cum *Icthyocollâ, Salop, Panatella,* aut id Genus alia.

Sed hæc de *Dysenteriâ* obiter — Nunc quid *Febris epidemica* facit videndum est — Sanè grassatur usque plurimùm, jamque frequenter plus habet *Peripneumonice* Indolis, interdum magis ad putridæ Naturam accedit : in alterutro Casu Sanguis emissus parùm videtur viscosus, etiam licèt Pectus haud parùm opprimitur — hanc porrò *Febrem* nunc comitantur magna *Faucium Asperitas*, quandoque ipsa *Angina* — Statu Morbi frequentes *Pustulæ* urentes erumpunt, faustæ semper, sequiturque permagna *Cuticulæ Desquamatio* : rarior autem jam adest *Diarrhæa*, multòque si accedit, levior est ; calida namque *Tempesta* magis nunc ad extra evocat *Humores*, adeòque *Pars* longè major *Ægrotantium* blando, at universali, oborto *Sudore* mox facillè liberatur ; atqui plures *Febre* quâdam intermittente corripiuntur * — *Quotidianæ* certè & *tertianæ* *Febres*

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

jam ubiquè regnant; exeunte attamen Mense
Catarrhalis epidemica ferè penitùs faceffit.

Nova Luna 11° JUNIO. *Plena Luna* 25°.

Siccus quoquè, & calidus ut plurimùm, fuit hic Mensis, medio tamen inter fuere duo, tresve Dies perfrigidi; spiravit Aquilo frequenter, Subsolanus interdum, Auster rarò, aliquando Ventus siluit prorsùs: exeunte Mense Rorationes maximæ—Stupenda Pruina, imò ipsa Glacies xiii primo Manè, idque per totam ferè Angliam.

Pluvia 3. 5. [/]10. 12. 13. ^{//}14. 15. 17. 26.
 Grando 13 Meridie cum Fulgure & Tonitru.
 Dig. Deg.
 = 0.838.

Procella, Fulgur, & Tonitru 14 Nocte—Fulgur & Tonitru primo Mane 26—Levis AB. 28 Nocte N 1.

☿ Altitud. maxim. 6. 29,8. NbE 1. } media 29.6 $\frac{6}{8}$.
 ——— minim. 3. 29,3. S 1. }
 Dies frigid. 13. 46. NbE 1. } media 28.
 ——— fervid. 7. 20. E 2. }

Variolæ adhuc & *Morbilli*, *Tussès convulsivæ* plurimæ: *Febres putridæ* & *Peripneumonice* passim, intermittentes verò, tertianæ potissimùm, *epidemicæ**; *Tussis*, *Tumor*, ac *Faucium Asperitas* permultos molestat.

* *Essay on Fevers*, P. 21.

Nova Luna 10° JULIO. *Plena Luna* 25°.

Frigidus insequitur *Julius*, atque ideò, quod solet plerumque, pluviosus; sæpe Libs turbidus fremuit, haud rarò Vultur, *Atmosphæra* hinc valde spissata est ac humidata.

Pluvia $\frac{''}{1.}$ 4. 5. $\frac{''}{6.}$ $\frac{''}{7.}$ 8. $\frac{'}{9.}$ $\frac{'''}{10.}$ 11. 15. $\frac{'}{17.}$
 18—20. $\frac{'}{21.}$ $\frac{'}{22.}$ 23. $\frac{''}{25.}$ 30. 31 = 2.866. Dig. Dec.

Altitud. maxim. 29. 29,8. N W b W 1. } media 29.4 $\frac{16}{100}$.
 ——— minim. 7. 29,0. S W 3x. }
 Dies frigid. 10. 38. S E b E 2. } media 32 $\frac{1}{2}$.
 ——— fervid. 21. 25. S W 1x. }

Variole sparsæ adhucdum. Febres intermittentes, plurimæ, præcipuè tertianæ *; perpauci cæteroquin Morbi.

Frigida fortassè crassaque *Atmosphærae* Intemperies Hyemis, ac Veris elapsi, plurimum congefferat serosi Lentoris, qui pro variis Hominum Temperamentis, nunc Febrem intermittentem, nunc *catarrhalem*, nunc putridam induxit.

Nova Luna 8° AUGUSTO. *Plena Luna* 24°.

Favente Deo longè felicior eluxit *Augustus*, lætamque produxit Messëm: Tempestas fuit sæpe fervida valdè, atqui dum Agros torret Canicula, Herbæ uberrimo Rore foveantur. Ventus ab Oriente plerumque spiravit, sæpe verò deflexit ad Arctum, Libs rarus, Malacia frequens.

* *Essay on Fevers*, P. 21.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. $\frac{11}{5}$. 6. 15. 19. 20. 29. 30
 Dig. Dec.
 = 0.700.

Fulgur, Tonitru, & gravissima Pluvia apud
Launceston 17 p. m.—hîc etiam Fulgur, Toni-
 tru, & Pluvia 29 Nocte.

☿ Altitud. maxim. 23. 29.9. NNE 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$.
 ——— minim. 5. 29.3. SW 2^x. }
 Dies frigid. 29. 34. ESE 2^x. } media 27 $\frac{6}{8}$.
 ——— fervid. 9. 19. E 1. }

Variolæ ac *Morbilli* passim, multæ adhuc Fe-
 bres intermittentes Ruri; *Apoplexiæ* aliquæ, &
Choleræ: Pauci admodum ægrotant.

Nova Luna 7° SEPTEMBRI. *Plena Luna* 22°.

Durat usque perpulchra & maximè sicca Tem-
 pestas, quin & saluberrima *: Fontes & Rivuli
 penè exarescunt penitùs, at immensa Vis Roris
 decidit quotidie. Ventus ferè perpetuus ex Ori-
 ente, intercurrente tamen nonnunquam Aquilone,
 Austro rarissimè.

Dig. Dec.

Pluvia 2. 5. 6. 8. 16. 17. = 0.250.

☿ Altitud. maxim. 24. 30.0. ENE 1. } media 29.8.
 ——— minim. 5. 29.6. S 1. }
 Dies frigid. 30. 48. NE 1. } media 36.
 ——— calid. 19. 30. EbN 1. }

Ineunte Mense haud pauci Febre quâdam an-
 ginosa correpti sunt, quæ paulò post More peri-

* — οἱ Ἀρχαὶ τῶν ἐπομβρίων ἔσιν ὑγιεινότεροι. Aph. 15.
 Sect. 3.

pneumonic Pulmones invadebat, magno interdum cum Ægrotantium Periculo. *Asthma* frequens, Scabies undiquè, paucissimi aliter Morbi.

Nova Luna 6° OCTOBRI. *Plena Luna* 22°.

Pluviosa Tempestas ingruit, citoque Pede itruit Hyems, crassus hinc fit Aër & humidus. Initio Mensis Corus prævaluit, à x ad xiv frigidus Boreas tunc Vultur, paulòque pòst nimbofus Aufser.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 4. $\frac{1111}{6}$. 7—9. 15—17. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 21.
 $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{11}{25}$. 26. $\frac{111}{27}$. 29. $\frac{11}{31}$ = 3.658.
 Dig. Dec.

Levis Procella 16 SE b S 4_x—23 Vesperi S SW 4_x—Vehemens 23 media Nocte SE b S 4^x—gravis totà Die 25 S 4. Amplissimus & subluteus Halo circa Lunam 19. H 8. p. m.

Altitud. maxim. 1. 30,0. N 1. } media 29.5 $\frac{16}{18}$.
 ——— minim. 25. 29,0. S 4. }
 Dies frigid. 14. 55. NE 1. } media 44 $\frac{11}{18}$.
 ——— tepid. 27. 39. Malacia. }

Febris quædam *Sporadica*, quæ & Fauces ac Pulmones graviter afficit. Tusses, Dolores & Tumores Faucium frequentes; *Rheumatismi* graves passim.

Nova Luna 5° NOVEMBRI. *Plena Luna* 20°.

Ineunte *Novembri* Corus plerumque spiravit, Medio Boreas, à xix autem nunc Libs, nunc Aufser, nihilominùs altam satìs Stationem retinuit
Baro-

Barometer, Atmosphaera verò crassa fuit valdè ac tepida.

Pluvia $\frac{''' }{1.}$ $\frac{' }{2.}$ $\frac{' }{3.}$ $\frac{' }{4.}$ $\frac{' }{5.}$ $\frac{''' }{6.}$ 11. 16. $\frac{''' }{17.}$ 18.
 $\frac{''' }{19.}$ 20. 25. $\frac{''' }{28.}$ $\frac{' }{29.}$ = 2.512.
 Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru 2 H. 4. a. m. Pruina & Gelu 9. 14 N E 1^x.

§ Altitud. maxim. 24. 30,2. S b E 1. } media 29.9.
 ——— minim. 18. 29,4. S W b W 3. }
 Dies frigid. 14. 62. N E 1^x. }
 ——— tepid. 6. 42. W S W 2. } media 49 $\frac{2}{3}$.

Blanda admodum Tempestas, pauci Morbi; Febres tamen quædam anginosæ, scarlatina & pustulosæ; Tussis crebræ.

Nova Luna 5° DECEMBRI. Plena Luna 20°.

A primo ad Diem septimum Decembris perflavit Eurus, post Corus, aut Libs, interdum Aquilo: à xxiv ad Finem usque Ventus perpetuus ex Oriente, isque sæpe perfrigidus: præalta fuit ut plurimum Baroscopii Statio.

Pluvia 1. 8. $\frac{''' }{9.}$ $\frac{' }{14.}$ $\frac{' }{15.}$ $\frac{' }{16.}$ $\frac{''' }{17.}$ $\frac{' }{18.}$ 19.
 Dig. Dec.
 Grando 14 = 1.514.

Maximæ Pruinæ sæpissimè hoc Mense, Gelu rigidum frequens.

§ Altitud. maxim. 21. 30,6. N E 1. } media 30.0 $\frac{1}{3}$.
 ——— minim. 17. 29,1. S W 2. }
 Dies frigid. 31. 73. E N E 2^x. }
 ——— tepid. 8. 46. S W 3^x. } media 59 $\frac{2}{3}$.

Tempeſtas eſt adhuc maximè ſalubris, Morbi multò rariores ſolito : Tuſſes frequentes, etiam *convulſivæ* plurimæ inter Pueros—Pleuritides, & Anginæ aliquæ, *Rheumatismus* paſſim.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLIII

Dig. Dec.

= 20.908.

Nova Luna 3° JANUARIO. *Plena Luna* 18°.

Conſtans ab Oriente Ventus, toto ferè Menſe, *Mercurium barometricum* in alto ſuſtinuit Loco, ſelectens verò plerumque ad Septentrionem Aërem fecit ſiccum & frigidum valdè, hinc Gelu ſæpe aſperriſſimum; imò 28°, 29°, vel ipſum Mare ad Littora congelatum erat.

Dig. Dec.

Pluvia $\frac{///}{7.} \frac{/}{11.} \frac{/}{15.}$ 30. Nix 27 = 1.068.

8	Altitud. maxim.	18.	30,6.	E N E 1.	} media 30,0 $\frac{12}{10}$.
	minim.	7.	29,6.	S 2.	
	Dies frigidiffim.	29.	76.	N E 1.	} media 64 $\frac{1}{2}$.
	tepid.	11.	56.	S b E 2.	

Tuſſis inter omnes ferè vehemens & laborioſa; ſæviffimi *Aſthmatis Paroxyſmi* : Dolores Dentium, Raucedo, Fauciumque Aſperitas plures moleſtant; Pleuritis, vel Peripneumonia, corripit multos, *Ophthalmia* aliquos—Tuſſis *convulſiva* inter Pueros *epidémica*, ad quam proſtigandam magis fuit neceſſaria Sanguinis Miſſio quàm memini unquam, etiam in Puerulis tenerrimis, quorum Sanguis haud rarò non levi obductus erat Glutine : porrò non ita feliciter ſucceſſit *Corticis Peruviani* Decoct. quod ſanè perpetuum eſt ubi Sanguis eſt denſus admodùm ac tenax, atque In-

flam-

flammationibus aptus; unde pessimè Pleuriticis
& Peripneumoniacis exhibetur.

Nova Luna 2° FEBRUARIO. *Plena Luna* 16°.

Varia fuit Tempestas variusque Ventus hoc
Mense, frequens autem ab Oriente *Barometrum*
tenuit ad altum satis Gradum, Malacia subinde
per Initia; per totum *Atmosphæra* densa, ac sæpe
frigida, haud multum tamen Gelu.

Pluvia $\frac{2}{7}$: $\frac{2}{8}$: 9. 11. 17. $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{20}$. 21—23.

$\frac{2}{24}$. 26. 28. 29. Grando 9 N b W 1*—24 N
Dig. Dec.

W 3=1.722.

Circius vehemens 24. p. m.—vehementissimus
28 Noctu.

— 29 a. m. Maximus & lucidus Halo
circa Lunam 18.

§ Altitud. maxim. 13. 30,3. ESE 2. } media 29.8.

— minim. 29. 29,2. NW b W 4. }

Dies frigid. 6. 67. E 2. } media 56 $\frac{1}{2}$.

— tepid. 23. 49. WSW 2*. }

Variolæ aliquæ, rubra *miliaris* Eruptio cum
Febriculâ passim & Febres *rheumaticæ*.—Tussis
violenta inter omnes ferè, pluribus *catarrhalis*
est prorsus, multis tamen *asthmatica*; hinc Pe-
ripneumonia frequenter oritur, haud rarò Spu-
tum Sanguinis, quod quidem aliquos in Tabem
pulmonariam præcipitat.—Tussis *convulsiva* eti-
am Adultos quosdam corripit, qui solummodò
repetitâ Sanguinis Missione levantur, & Vomitu
leni.

Nova Luna 3° MARTIO. *Plena Luna* 17°.

Incipiente *Martio* perplurima Grando, Cauro sæpe perflante : à xii ad xxiii Ventus Orientem inter & Septentrionem constitit, inde Libs ; ad ipsum Finem Aquilo : Aër fuit siccus plerumque & frigidus.

Pluvia $\frac{''' }{1}$. 2. $\frac{' }{3}$. 4. $\frac{'' }{5}$. 6. $\frac{' }{7}$. $\frac{'' }{9}$. 11. 23. 25.
 $\frac{' }{26}$. $\frac{'' }{27}$. 28. 30. Grando 2. 3. 6. 7. 8. $\frac{' }{10}$.

$\frac{' }{1}$ Dig. Dec.

Nix 8. $\frac{31}{31} = 2.632$.

Procella 2 N W b W 4x—5 S W b W 4—11
 N W b N 4x Lumen boreale fulgidum valdè
 22 H. 9. p. m. E N E 2x.

§ Altitud. maxim. 15. 30,1. E N E 2. } media 29.5 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 5. 29,2.
 Dies frigid. 14. 62. N N E 2. } media 55 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 28. 46. W S W 2.

Febres aliquæ tertianæ, & semitertianæ : Tussis molestissima & pertinax admodum undique, quæ ex Naribus sæpe, sæpe de Pulmone, Sanguinem erumpere facit, accedit interdum Peripneumonia—hinc *Phtibisci* plures, præsertim qui antea fuerant *Asthmatici*. Pleuritis & *Rheumatismus* passim, sub Mensis Finem *Pleuroperipneumonia* frequens valdè—Cruor extractus est perquam crassus atque maximè tenaci & flavo obductus Glutine.

Nova

Nova Luna 1° APRILI. *Plena Luna* 15°.

Ineunte Mense Nix & Grando multa flante Aquilone, mox turbidus Auster : à xii ad xvi Eurus, indè Aquilo rursùm ; Corus sub Finem. Aër fuit sæpe gelidus valdè ; maximæ Pruinæ sæpissimè per medium Mensẽ, imò & interdum Gelu.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1111}{4}$. 6. $\frac{111}{7}$. 8. $\frac{1}{9}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{111}{12}$. $\frac{11}{15}$. 22.

$\frac{11}{28}$. 30. Nix & Grando 1. $\frac{1}{2}$. 3. 4. 9. 26
Dig. Dec.

= 3.390.

Procella 7. p. m. S. 4x Gelu 14. 15.

§ Altitud. maxim. 19. 30,1. N N E 1. } media 29.6 $\frac{1}{3}$.
—— minim. 5. 29,0. S S W 3x. }

Dies frigid. 3. 65. N N E 3. } media 50 $\frac{6}{7}$.
—— tepid. 24. 41. N W b W 1. }

Pleuritides & Peripneumonix valdè frequentes, sæpe conjunctæ sæviunt : Multi *Asthmate*, multi *Rheumatismo*, multi Pleuritide spuria, laborant, plurimi Tussi gravissimâ. *Morbilli* passim, *Variolæ* quamplurimæ per Viciniam, necnon in citeriore *Cornubiâ* ; haud paucæ Febres tertianæ * — *Paraphrenitis* solito frequentior.

Vix sanè observavi unquam Cruorem ab Ægrotantibus detractum, magis densum atque glutinosum quàm hoc Tempore, idque sæpe post quartam, imò & sextam Sanguinis Missionem — hoc profectò notavi præcipuè in primario *Nos-*

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

comii nautici Chirurgo, qui ineunte Mense *Parapbrenitide* fuit peremptus.

Bonus hic & ingeniosus certè Vir Mane, tertio *Aprilis*, inhorruit, mox Rigore maximo correptus, inter visitandum *Ægrotos*, se recepit, protinùs sævissimo Dolorè Dorsi ac imi Pectoris dextri percitus succubuit, febricitavit vehementer—Missus est extemplò Sanguis ad xxvi ; me dein arcessiri voluit—Fotum emollientem, & laxans *Enema*, præcipio, *Nitrique* plurimum & *Spermatis Celi*, Potum diluentem, porro & subtepidum, liberalem; furente tamen usque Dolorè, sub Noctem alteram Sanguinis Missionem ad xxvi . Fortumque iterùm, & *Enema* è Lacte dulci cum Sale marino plurimo, quo bis, terve dejecit Alvus; mox *Diacodii* zss sumpsit ac *Tinct. Thebaic.* gut. xxiv—Tota Nocte ejulavit, difficillimè spiravit, Tussiculâ aridâ vexatus Nil expuit—bene Mane adeo, Die quarto, xxiv Sanguinis detractæ sunt, Fomenta etiam & *Cataplasmata* demulcentia admota, paulòque pòst injectum est emolliens *Enema*, quo rejecto epotus est *Hauftus Anodynus*: pacata hinc omnia per Horas aliquot, accessit Vesperì Somnus—Infidæ autem hæ Induciæ! Nox maximis in Molestiis acta; Febris vehemens, Spiritus brevis, interruptus, difficillimus, Dolor acerrimus, Sitis ingens, Lingua arida—Ergo V^o *Aprilis* H. 9. a. m. repetitur V. S. ad xxii saltem, *Mannæ* porro 3x cum Sale *Mirabil. Glauber.* zss ex Jusculo avenaceo assumptæ sunt; ter hinc, quaterve, respondit Venter, sævissimus tamen usque urget Dolor, Pulsusque celerimè vibrat, exilis quidem, sed durus admodum; bis Noctu repetita sunt *Anodyna*, unde Sopor aliquis, at perturbatus valdè—Cum pa-
rùm

rùm hæc omnia proficere viderim *Camphoram* cum *Nitro*, &c, exhibui, *Haustusque Salinos* ex *Sal. C. C. Succo Limonum*. &c ; ut nimirum per Sudores forsan Morbum elicerem ; Femoribus porro atque Dorso *Vesicatoria* applicari jussi—Sudavit paululum inæqualiter, mox autem Rigor invasit, Dolorque Dorfi & Lateris immensis recruduit, adeo ut jam non modò exclamaret, sed & fureret planè—quintà adeò Vice, Die 6^o nempe, post Meridiem, Sanguis emittitur ad xxv circiter : ad Fomentum dein & *Clysmā*, necnon *Anodyna* confugimus, hinc Quies aliqua, sed Languor magnus, obrepfit denique Somnus. Post sex vel octo Horas inalgescens horruit, ejulavit, deliravit, se Flammis atque Ferro excruciatum intus, dextro è Latere, exclamavit ; (durum valdè, sed retractum, persensit Hypochondrium dolens*) anhelavit quasi ex citissimo Cursu—interim maximo Nisu, at summo Angore, quasi Gladio perfoffus, Suspirium edere anxie desideravit—Dubius omninò quid facerem ultra sextam Sanguinis Missionem suadeo ad xxii circiter, Fomenta iterum *Cataplasmata* & *Anodyna*—Supervenit Sopor, Tremor, Tendinum Subsultus, Singultus : atqui se relevatum prædicat ; quievit utiquè plurimum, sed aliena murmurans & incondita—Frigidulus occupat Sudor Frontem, dum Genæ intenso Rubore flagrant, nigrescunt Ungues, frigescunt Manus ; facilius verò movet, imò & se Sponte in Lecto erigit, melius se multò autumans, si modò Gravitas Spiritus immen-

* Si Septum transversum percussum est, Præcordia fursum contrahuntur. *Cels. Lib. 5. C. 26.*

sa, & aliquantus usque Lateris Dolor ac Pondus abessent—At ego Hominem planè moribundum video, Septo transverso nempe *sphacelato*: tamen Sopores inter, Singultus & Deliria, atterit Noctem, Die 7^o Mensis, paulò ante Meridiem, obiit Vir, si quis alius, Vitâ dignus longiore.—Mox post Mortem lividum quasi à Contusione apparuit totum Latus dextrum, Os *Ilium* adusque. Hic Casus fuit verè *paraphreniticus* *, cujus perpaucae extant apud Scriptores Medicos Historiæ: credo equidem longè sæpiùs occurrit quàm vulgò putatur.

Ab hoc Ægroto intra Quatriduum detractæ sunt Sanguinis Unciæ ferè centum, cujus singula Portio erat quàm maximè viscida, etiam ultima, licèt Sero permulto tenuissimo limpido innatabat Crassamentum (parvula velut Insula globosa, penè tamen prorsùs submersa) quod firmissimo quasi Corio erat obductum, vix utiquè Scalpello penetrandum †,

Nova Luna 1^o— *MAIO. Nova Luna* 30^o.
Plena 15^o

Ventus orientalis hoc Mense prævaluit, à xix ad xxiv Zephyrus: Aër fuit siccissimus, sub Finem valdè calidus—blandissima plerumque Tempestas.

Pluvia $\frac{''}{3}$. 8. $\frac{'}{10}$. 11. 12. $\frac{''}{13}$. 18. 21. $\frac{'}{22}$,
 Dig. Dec.
 Grando 13=1.236.

* *Essay on Fevers*, P. 240.

† *Ibid.* P. 188.

Fulgur & Tonitru 3 Nocte.

§ Altitud. maxim. 15. 30, 1. ENE 1. } media 29.6 $\frac{26}{100}$.
 ——— minim. 22. 29, 2. SW 3. }

Dies frigid. 14. 47. ENE 2. } media 36 $\frac{6}{100}$.
 ——— fervid. 30. 20. ENE 1. }

Febres intermittentes *epidemicæ*; Pleuritis & Peripneumonia frequens, *Morbilli* passim: *Variole* plurimæ, quarum haud paucæ mali admodum Moris; forsan à profusis Sudoribus; quibus Adulti, præcipuè incunte Morbo, sæpe corripuntur—Sed & Puerulis non multò minùs sunt exitiales, qui nimirùm Confluentibus, nigris, cruentis non rarò obruuntur.

Plena Luna 13° JUNIO. *Nova Luna* 29°.

Sicca duravit & calida Tempestas ad Diem Mensis vicesimum, Eurus intereà spiravit frequenter, postea verò Ventus ab Oris australibus multam invexit Pluviam, Aëremque fecit multò frigidiorè.

Pluvia 4. 5. 8. 10. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

//// Dig. Dec.
 27. 28. 29. 30 = 2.786.

Fulgur & Tonitru 5 Vesperi—22 Horà 9. p. m.—23. p. m. Nebula valdè foetida 26. p. m. Malacia.

§ Altitud. maxim. 14. 29, 8. EbN 1. } media 29.5 $\frac{15}{100}$.
 ——— minim. 28. 29, 0. SSE 2. }

Dies frigid. 24. 36. SbW 2. } media 27 $\frac{33}{100}$.
 ——— fervid. 17. 16. NNW 1. }

Febres

Febres intermittentes sparsim, tertianæ ac *Hæmitritææ* potissimum; Pleuritides, Peripneumoniæ; & Anginæ aliquæ. *Variolæ epidemicæ*, interdum valdè malignæ, utpotè *Petechiis* & *Hæmorrhagiâ* aliquando stipatæ.

Plena Luna 13° JULIO. *Nova Luna* 28°.

Per Initia Mensis Pluvia frequens, parca post; Aër plerumque crassus, Ventusque varius, Malacia interdum; à xvi ad xxii spirabat Eurus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{30}$.
Dig. Dec.

= 1.324.

Levis Procella 3. p. m. S W b W 4_x.

Altitud. maxim. 7. 30,0, N N W 1. } media 29.6 $\frac{20}{100}$,
minim. 3. 20,2.

Dies frigid. 4. 36. W N W 1. } media 29.4 $\frac{4}{100}$.
calid. 20. 22. E 1_x.

Variolæ epidemicæ, sanè sunt haud parùm funestæ; sæpe parvæ, atræ, sessiles cum Foveolâ in Pustularum medio lividâ aut nigrâ—interdum erudo diffuunt *Ichore*, qui subjectam Carnem erodit, imò & nonnunquam ipsâ Gangrænâ afficit—Linguae, Faucesque sub Morbi Declinationem sunt valdè squalidæ, ac frequenter scabræ admodum & atræ; accedit porrò sæpissimè *Diarrhœa* profusa; aliquando Tragoedia clauditur More peripneumonico;—largissimè tamen plerumque expuunt Ægri, præsertim per Initia. Si quid in his *Variolis* malignis possit Medicina, id utiquè faciunt *Alexipharmaca* subaustrera cum acido

acido plurimo * ; *Tincturâ* utor sæpissimè *Corticis Peruviani Alexipharmacâ* cum multo *Elixire* aut *Spiritu Vitrioli*, sæpe *Vino rubro Gallico* his acidis adjectis, præsertim sub *Febris Decessu*, intereà *Potionem* liberalem, acidulam, demulcentem suadeo atque *Victum idoneum*—Proficiunt hæc interdum maximè, sed ut plurimum atra *Variolas* atra Mors sequitur.

Ubi ingruente Morbo *Variolæ* luridæ, lividæ, aut parùm acuminatæ visuntur, *Febrisque* adest lentior, generosa quædam *Cardiaca* exhibenda sunt, *Epispastica* porrò applicari debent, quicquid contrà reclamatione *Sydenhamus*, ejusque Sequaces (quos inter, in plurimis, etiam & ego sum)—*Crocus* hic & *Pulv. Contrayerv. C. Moschus* & *The-riaca Androm.* imò & dulce *Vinum Locum* habent—Miram sanè Vim habet *Moschus* per Cutim expellendi, nec tamen intereà calefacit nimium : Si crudæ sunt *Pustulæ*, si prorsus aquosæ *Myrrham* adjicio, cui inest *Coctioni* fovendæ plurimum—Atqui quando turget Sanguis, furit *Febris*, ardent omnia, porrigere talia bæchantis est *Medici*, non prudentis, qui *Diis Manibus* devovet *Ægrotos*—utinam non talia vidissem!—Adeò Nihil in hoc Morbo perpetuum est, nedùm utiquè in ullo.

Plena Luna 12° AUGUSTO. Nova Luna 26°.

Incipiente *Augusto* benigna fatis fuit *Tempestas*, ab xi autem ad Finem usque pluviosa plerumque & frigida Vento mutante subinde ; Initio Mensis Ros perplurimus.

* *Essay on Fevers* (Cap. de Variolis) P. 151.

Pluvia 1. 3. 11—14. $\frac{1}{15}$. 16. $\frac{///}{17}$. 19. 22.

$\frac{///}{23}$. 25. 26. 27. 29. $\frac{///}{31} = 2.074$.
Dig. Dec.

Procella 17 Nocte S W 4—28 W S W 4_x—
31 primo Mane S W 4.

Fulgur & Tonitru 13 Vesperi.

§ Altitud. maxim. 4. 30.0. N W b W 1. } media 29.6 $\frac{6}{39}$.
minim. 18. 29.1. S W 3^x.

Dies frigid. 30. 41. N W 2. } media 31 $\frac{23}{38}$.
calid. 5. 25. N W b W 1.

Plurimæ *Variolæ*, Febres intermittentes passim,
Tussēs frequentes, sub Finem Mensis Anginæ
aliquæ: Nisi à *Variolis* paucissima Funera.

Plena Luna 10° SEPTEMBRI. *Nova Luna* 25°.

Et frigidus fuit & valdè humidus hic Mensis,
Libs sæpe perfremuit; à xvii ad xxiv Vultur-
furens, hinc humilis *Baroscopii* Statio, at Maris
Æstus tumidi, ac inordinati admodum—xxvi
vehemens Procella Mane E S E 4_x Meridie S S
E 4 Vesperi S S W 4^x vastissimos concitavit
Fluctus atque Maris Æstum immensum, qui
longè latèque inundavit Littora; multò sanè
magis quàm fuit visum antehàc unquam*.

Pluvia 1. $\frac{1}{3}$. 4. 5. $\frac{///}{6}$. 7. $\frac{1}{9}$. $\frac{///}{10}$. 11. $\frac{///}{12}$. 13.

$\frac{1}{15}$. 17. 18. $\frac{1}{20}$. $\frac{///}{21}$. $\frac{///}{24}$. $\frac{1}{26}$. 27. 30 = 4.470.
Dig. Dec.

Halo amplissimus circa Lunam 8. H. 8. p. m.

* Vid. Vol. I. P. 18.

☿ Altitud. maxim. 2. 29,9. W N W 2. } media 29.3 $\frac{1}{5}$.
 ——— minim. 26. 28,9.
 Dies frigid. 30. 48. N W 1. } media 39 $\frac{1}{2}$.
 — tepid. 9. 34. S S W 3. }

Variolæ multæ, jam verò paulò mitiores;
Morbilli passim: perpauci certè hic Morbi; *Colice* tamen, *Rheumatismus*, ac *Tussis* quosdam
 vexant; *Alvi Fluxus* plurimos.

Plena Luna 9° OCTOBRI. *Nova Luna* 23°.

Nimbosa Tempestas hoc Mense & valdè squa-
 lida, *Pluvia* ferè perpetua, immensa undique Di-
 luvia; infremuit *Libs* sæpissimè, intervenit au-
 tem *Caurus* frequenter, haud rarò *Vulturnus*, xii
 ac xiii *Boreas* frigidus.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$
 Dig. Dec.
 = 5.608.

Procella levis 2. S W 4 $\times$ —vehemens admo-
 dum 3 Nocte W S W 4 $\times$.

——— 4 a. m. W b N 4—8 Vesperis S W
 4 $\times$ —9 S W 4—22 primo Mane W S W 4 $\times$.

Fulgur & *Tonitru* 3 Nocte—perpetua *Fulgu-*
ra & *Tonitrua* Nocte 22 S W 4—*Maximus*
Maris Æstus 9°.

☿ Altitud. maxim. 13. 30,2. NE 1. } media 29.4 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 4. 28,6.
 Dies frigid. 13. 60. Gelu. } media 48.
 — tepid. 19. 42. S W b W 3. }

Variolæ

Variolæ passim ; Tormina & Alvi Fluxus plurimos exercent : oriuntur hæc credo majore ex Parte à *Pomaceo* novello—Poma namque ob nimium Madorem citissimè putrescunt, hinc fortè magis ad *Diarrhæam* disponunt quàm si firmiora fuerant & generosiore Succo prædita.—Tussis sævæ & creberrimæ, hinc aliquando Peripneumonia, aut Pleuritis — Peripneumoniæ nothæ quoquè haud sunt raræ. Febres putridæ nonnullæ. In Genere tamen multò pauciores sunt Morbi acuti quàm quis crederet, habitâ scilicet Ratione Tempestatis infaustæ—frequentes forsan Procellæ dirimunt pravas ac morbosas *Atmosphæræ* Congestiones, vehemens veluti Motus Oceani Aquarum Putrescentiæ obstat.

Plena Luna 9° NOVEMBRI. *Nova Luna* 23°.

Per Initia *Novembris* pluvia Tempestas & interdum nimboſa, Corus sæpe, haud rarò *Africus* : à x ad xxi *Aquilo*, subinde *Malacia*, Libs dein furens ad xxv ; *Boreas* post & *Apricitas* pulchra.

Pluvia 1. $\frac{///}{2}$. $\frac{//}{3}$. $\frac{/}{4}$. 5. 6. $\frac{///}{7}$. $\frac{/}{8}$. $\frac{//}{9}$. 11. 13.

$\frac{/}{16}$. $\frac{///}{22}$. $\frac{/}{23}$. 24. $\frac{/}{25}$. Nix & Grando 9. $\frac{/}{17}$.
Dig. Dec.

Pluvia nivosa 20 Nocte = 3.740.

Procella 2 Meridie S W 4x—6 Nocte S W 4x
—22 Nocte S b W 4. *Circius* vehemens 17—
Acre Gelu a 17 ad 21.

§ Altitud. maxim. 29. 30,5. ENE 1. }
minim. 23. 28,7. S b W 3*. } media 29.7 $\frac{6}{8}$.

Dies

Dies frigid. 20. 69. N b E 1. } media 56 $\frac{11}{18}$.
 — tepid. 7. 44. S W 1 $\frac{1}{2}$.

Pleuritica & Peripneumonicae Febres intermittentes porro ac *Variolæ* passim; *Rheumatismi* plurimi: Tussis, Dentium Dolores, Faucium, Auriumque, cum Tumore Glandularum, valdè frequentes—Colica quamplurimos infestat, partim à *Pomaceo* novello, partim etiam ab abundante & acriore Bile; Tormina sæpe sunt admodum sæva magno cum Ardore Urinæ.

Plena Luna 8° DECEMBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem *Barometer* hoc Mense, Aër autem fuit plerumque crassus valdè, sæpe perfrigidus, sub Finem multò lenior—ineunte *Decembri* Aquilo persæpe flabat, exeunte Corus atque Libs, Vento interdum omninò silente.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. 11. 17. $\frac{1}{20}$. 21. $\frac{1}{22}$. 23.
 Dig. Dec.

25. 28. Grando 12. Nix 13 = 1.394.

Procella 11. p. m. ad mediam Noctem durans
 N W b N 4.

AB. 14 H. 9. p. m. N E b N 1—24 Vesper
 N W 2 $\frac{1}{2}$.

§ Altitud. maxim. 14. 30.6. N E 1. } media 30.0 $\frac{3}{4}$.
 — minim. 11. 29.3.

Dies frigid. 14. 70. valdè rigidum Gelu. } media 57 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 23. 50. S W b S 3.

Morbi colici plurimi, ab Acrimoniâ Bilis aliqui, plures longè tamen à *Pomaceo* impuro, nec bene defæcato—in his Alvus est plerumque
 cita,

cita, sæpe accedit *Dysenteria* mucosa, sæpe biliosa, aliquando cruenta.

Tusses innumeræ cum Tumore Faucium, Maxillarum, *Parotidum* — Peripneumonia passim — Febris *catarrhalis* valdè frequens; solvitur sæpe multâ effluente crassâ ac ardente Urinâ.

Gallos inter & Hispanos Captivos sævit admodum Febris quædam *catarrhalis* maligna, jugulatque per plurimos: accedunt sæpe *Petechiæ*, haud rarò *Parotides*, sæpe Pustulæ urentes aquosæ: Dolet Initio maximè Caput, Dorsum, ac Regio Præcordiorum, protinùs supervenit Phrenitis, anhelosa Respiratio, Tremor, Subsultus, brevè Mors.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLIV
Dig. Dec.

= 31.444.

Plena Luna 7° JANUARIO. *Nova Luna* 21°.

Incipiente Anno altum fuit *Baroscopium*, sæpe Boreas, sæpe perflavit frigidus admodum Vulturus, hinc Gelu acre frequenter: post vicissimum Mensis Diem nunc Libs, nunc Caurus: Aër erat plerumque maximè humidus præsertim Gelu liquante atque Nive.

Pluvia 3. 4. ^{///} 10. ^{///} 11. ^{///} 12. 13. 20. ^{///} 21. 22.

23. ^{///} 25. [/] 27. ^{///} 28. 30. Nix ^{///} 9. 17. Grando 27.
Dig. Dec.

31 = 2.910.

Gravis procella cum Nive perpetuâ 9° S E 4.

§ Altitud. maxim. 1. 30,4. N 2. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
minim. 26. 28,7. S W 3. }

Dies

Dies frigid. 9. 69. SE 4. } media 61 $\frac{2}{3}$.
 — tepid. 25. 54. SW 3. }

Morbi colici adhuc passim; *Rheumatismi*, Pleuritides ac Peripneumoniæ, & veræ & nothæ, sparsim. Plurimi Faucium, Maxillarum, *Parotidum*, imò & Capitis sæpe Tumore laborant, accedente Tussi plerumque & Coryzâ: *Ophthalmiæ* frequentes.

Febris *catarrhalis* maligna jam grassatur maximè, & per plurimos Captivorum mittit ad Inferos: etiam nunc haud rarò Nostrates, qui cum his multum versantur — Plures sæpe diutissimè trahit, sæpiùs autem magis est acuta & More Peripneumoniæ, aut Anginæ suffocantis, jugulat — accedunt sæpe *Petechiæ*, sæpe *Dysenteria* cruenta — hæc tamen nec certo Ordine, nec Tempore — Horum multi Gangrænâ Pedum corripuntur à Frigore forsan & Sordibus.

Plena Lūna 5^o FEBRUARIO. Nova Lūna 20^o.

Frigidus admodum fuit hic Mensis, Boreas persæpè flavit, interdum Vulturnus, Libs rarissimè: Aër siccus semper & tenuis, Gelu subindè asperrimum: præalta erat Medio *Februario* *Barometri* Statio.

Pluvia $\frac{1}{5}$. 9. $\frac{1}{14}$. 19. 22. Grando 2. 6. 23.

Dig. Dec.

Nix $\frac{26}{28}$ = 0.838.

Nix plurima 26 etsi Ventus erat W S W 3. Therm. 70.

Magna AB. 9. H. 10 Noctis N N E 1. — Levis H. 7. p. m. E N E 2^r.

& Altitud. maxim. 18. 30, 6. ENE 2^x. } media 29. 8¹/₂.
 ——— minim. 5. 29, 2. SE 1^x. }
 Dies frigid. 25. 75. NE b N 1^x. } media 65¹/₂.
 ——— tepid. 15. 58. ESE 2. }

Asthma sævissimum plures premit; Tusses, Pleuritides & Peripneumoniæ valdè sunt frequentes; imò & sæpe graves admodum, quippe difficulter & parcè expuitur—Sanguis extractus est perquam tenax, & crassissimo Glutine obductus, Serum autem viride, aut subflavum, at perliquidum—hoc quoquè in *Rheumatismo* notatur, qui jam haud paucos graviter & diu torquet.

Inter Captivos sævit usque Febris maligna *cattarrhalis*, immensamque Stragem edit; ministrantes Aniculas, imò & quosdam Chirurgos nunc invadit, etiam & occidit.—Sæpe in summo Febris Incremento, sæpe sub Finem, erumpunt Pustulæ aquosæ, urentes, crebrò Papulæ livescentes, interdum luridæ, aut subatræ Maculæ, *Apt hæ* frequenter—Nihil horum autem multum juvare videtur, longè magis enim est ex Re *Ægrotantium* Sputum abundans (modò non sit lividum, saniosum, foetidum, quòd frequenter nimis evenit) blandusque & æqualiter diffusus Sudor—profusum verò extimesco semper, qui sæpe oleosus, mox frigidus, tandem fit lethalis; idquè certò certius obrepente Horrore—Nil in tali Casu magis est ex Usu quàm Vinum rubrum cum Aromaticis coctum—præcipuè si urget *Diarrhæa*, sive mucosa, sive cruenta: quòd frequenter accidit.

Plena

Plena Luna 6° MARTIO. Nova Luna 22°.

Per Initia Martii pluviola fuit valdè & squallida Tempesta, Aër inde crassus admodum & humidus; spiravit sæpissime Libanotus, Corus crebrò, Vulturnus interdum.

Pluvia $\frac{///}{4.}$ $\frac{1}{5.}$ $\frac{1}{6.}$ $\frac{1}{7.}$ $\frac{///}{8.}$ $\frac{///}{9.}$ $\frac{///}{10.}$ $\frac{///}{11.}$ $\frac{///}{13.}$ $\frac{///}{15.}$

$\frac{///}{17.}$ $\frac{///}{24.}$ $\frac{1}{25.}$ $\frac{1}{27.}$ $\frac{1}{28.}$ $\frac{1}{29.}$ Grando & Nix $\frac{1}{1.}$ $\frac{1}{2.}$

Dig. Dec.

3=4.694.

Procella primo Mane 1 W S W 4—9 Nocte S W b S 4x—29 Nocte N W permagnæ Nebulæ à 24 ad 27.

Altitud. maxim. 25. 30.0. N W 1. } media 29.5 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 10. 29.1. W 3. }

Dies frigid. 2. 64. S W b W 2 Nix. } media 51 $\frac{4}{5}$.
 — tepid. 21. 42. N 1. }

Tusses valdè frequentes, Tumores Colli, Maxillarum, Capitis undiquè; plurimæ Febriculæ *cattarrhales* — maligna sævit adhuc maximè inter Captivos, necnon inter Nautas nostros. — Pleuritides ac Peripneumonix haud paucæ & veræ & spurix.

Plena Luna 5° APRILI. Nova Luna 20°.

Pluvius quoquè erat hic Mensis & algidus Corus Initio spirabat, à xiv ad xxviii Boreas ferè perpetuus, Pluviâ tamen decidente frequenter eâ verò valdè frigidâ.

Pluvia 1. 3. 4. $\frac{1}{5}$. 6. $\frac{11}{8}$. 9. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. 12. 13.
 17. $\frac{111}{20}$. $\frac{111}{21}$. $\frac{11}{22}$. $\frac{1}{23}$. 25. $\frac{11}{26}$. $\frac{11}{28}$. $\frac{11}{29}$. Grando
 Dig. Dec.
 gravis 7. 11=3.912.

Circius vehemens totâ Noctē 3.—prælargus
 Halo circa Lunam 2. H. 10 Noctis—foetidissi-
 ma Nebula per totam Diem 13. S 1x—Glacies
 ubiquè 27 Mane E N E 2.

Altitud. maxim. 16. 30, 1. ENE 2x. } media 29.5.
 ——— minim. 21. 2x, 8. N 2x.

Dies frigid. 27. 55. } media 48½.
 — tepid. 14. 40. E 1.

Rheumatismus passim, *Ischias* solito frequentior,
 eaque certè acerbissima: Pleuritides & Peri-
 pneumoniæ, tam veræ quàm nothæ, haud pau-
 cos corripiunt; Tussēs, Tumores Faucium, at-
 que Dentium Dolores cum Gutturis Asperitate
 plurimos: quædam Febres intermittentes, inter
 juniores *Morbillose* & *Scarlatine* aliquæ.

Catarrhalis Febris usque graffatur, diu inter-
 dum trahit Ægrotos, citò sæpius Cursum absol-
 vit, sub Finem plerumque expuunt largissimè
 lentam salsamque Pituitam, crebrò sine ullâ
 Tussi, cum importunâ sæpe Tussiculâ, id porrò
 multo cum Levamine; Urina est tenuis ut plu-
 rimùm, rarò valdè rubra, Lingua subalbida, vix
 unquam nigra aut scabra, leve tamen Delirium,
 seu Desipientia ferè semper adest Morbi Statu.—
 Plures etiamnum jugulat *catarrhalis* maligna.

Plena

Plena Luna 4° MAIO. Nova Luna 20°.

Blanda fati's Tempeſtas ineunte Menſe, Euro afflante ; poſt Diem autem decimum uda, frigidaque, Libs ferè perpetuus.

Pluvia 2. 11—15. 16. 17. 18. 19. 20—
Dig. Dec.

31. Grando 16—19. a. m. = 1.732.

Procella 16 primo Mane S W 4x. Fulgur & Tonitru 19. a. m.

Altitud. maxim. 5. 30.0. ENE 2. } media 29.4³/₁₁.
minim. 16. 28,9.
Dies frigid. 20. 48. WbN 2x. } media 40³/₁₁.
tepid. 6. 33. E 2.

Morbilli, ac *Febres Scarlatinae* hîc & per *Vici-*
niam epidemicæ, gravis ſæpiſſimè accedit *Tuffis* &
Affectio peripneumonica, queis Nil magis occur-
rit quàm opportuna Sanguinis Miſſio.

Multæ *Febres Catarrhales* adhuc, quædam
pravæ admodum & diu durantes : *Urina* ple-
rumque cruda eſt valdè, ſubindè quaſi lactea,
Nihil prorsùs deponens per totum Morbum ;
Lingua eſt humida utplurimum, at ſqualida &
ſublutea ; atque expuunt affatim, idque fauſto
ſemper Omine—contrà ubi *Lingua* ſit nigra &
arida, parcèque prodeunt *Sputamina* rarò eva-
dunt ; mox enim anhelî, delirantes, trementes,
palpantes facti *Fato* tandem ſuccumbunt, niſi ob-
ſtant *Veficatoria*, ac *Sudor liberalis*, qui ſanè
(neſcio unde) jam haud ita facilis erumpit : *Al-*
vus etiam fuſa largiter *Ægrotantibus* frequenter
ſuccurrit maximè.—*Capitis Gravitas* & *Vertigo*

per Initia Febris ferè semper adsunt, leve Delirium verò & Surditas procedente Morbo; toto Decursu Screatus maximus, etsi Tussis interdum abest omninò.—Usque adeò per Salivæ Ductus molitur Natura *Crisin*.

Variolæ, Febres *miliares* & pustulosæ passim; Scabies frequens, *Ophthalmiæ*, necnon Anginæ aliquæ.

Haud infrequens est Peripneumonia quædam notha, quæ diutissimè sæpe perdurat, demùmque instar Febris lentæ *nervosæ* opprimit Ægrotos, etsi Initio haud parùm exarserat.—Horum Sanguis extractus tenuis ut plurimum & floridus spectatur, quod mala inter Signa semper est, nec largam hujus Effusionem patiuntur tales sine summo Vitæ Discrimine, quamvis valdè difficilis videatur Spiritus ac magna Pectoris Oppressio: Mirum est utiquè quantum detracto Cruore mox debilitantur *—Sæviit hæc præcipuè per Australes Provinciæ Oras; nec fuit alia forsàn quàm *Catarrhalis epidemica* in Pulmones maximè conversa—*Camphora*, *Crocus*, *Lap. Contrayerv. Gum. Ammoniac. Oxytel. Scillitic.* cum Sero *Sinapino* tenuissimo aptissima fuere Remedia; *Vescicatoria* porrò perquàm utilia.—Pustulis sub Finem erumpentibus, ac Sudore, rarò pereunt.

Plena Luna 3º JUNIO. Nova Luna 18º.

Fuit & hic Mensis frigidus admodum & pluvius, Africo sæpissimè perflante. Coro sæpe, interfuit autem Vultur usque ad xxi ad xxiv—Aër fuit

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 225.

maximè crassus ac humidus, tristisque Tempestas; hyemalem potius quàm æstivam putares adeò omnia sunt uda & squalida; rarò vides Papilionem, imò vix Muscam; torpent omnia.

Pluvia 1. 5. 6. 7. 8. 9—13. 14. 15. 19.
Dig. Dec.
22. 23. 24. 25. 27. 28=2.760.

Tonitru & Fulgura gravissima 22° Nocte inter Horam x & xii; longè latèque perfremuit hæc Procella.

Altitud. maxim. 18. 29. 8. W N W 1. } media 29.53.
minim. 25. 29. 2. S W 3x. }
Dies frigid. 12. 48. W N W 2. } media 37.1.
calid. 22. 24. S E 2. }

Crebri adhuc valdè sunt *Morbilli*, quibus sæpe etiam Adulti corripuntur: *Rheumatismus*, Tumor Faucium, Angina, Tussis frequens: Febres intermittentes passim.

Febris putrida maligna jam grassatur multùm; sæpe cum Pustulis rubellis, sæpe cum *Petechiis*—enormes interdum *Hæmorrhagiæ* ex Ore, Naribus, Utero accedunt; præcipuè ubi Maculæ prælargæ sunt ac lividæ, aut nigræ, aut violaceæ * —Levis adest Horror Initio, mox Dolor Capitis & Gravedo cum Vertigine, in plurimis Nausea & Vomitus; protinùs in omnibus magna Præcordiorum Oppressio & Anxietas permolesta, adeò ut perpetuè urgeant Vigiliæ, undè certò certius obrepit Delirium, tandemque aliquando Veternus. Urina plerumque est maximè cruda ac tenuis, rarò aliquid deponens, sub Morbi Finem verò

interdum livida quædam aut furfurosa quasi, nonnunquam etiam nigra prorsus. Lingua, Dentes, Faucesque nigræ, aridæ, squalidæ sunt, ex Ore fœdus admodum exspirat Halitus. Pluribus accidit *Diarrhœa* mucosa, aut subnigra, cum Strigmentis interdum sanguinolentis.—Multi diu conflictant Morbo, haud pauci intra Dies octo succumbunt; nec desunt plures, qui prorsus evadunt.

Maxime sæviit hic Morbus inter Captivos, Nautas atque nostros, multos etiam jam per Viciniam attigit—An ex Contagione, an ab ipsâ *Atmosphæra* Constitutione haud certè scio: parùm namque contagiosus videtur nisi in ipsis *Nosocomiis*: magna utiquè est undique Virium ac Animi Dejectio apud omnes, etiamque sanos.

Plena Luna 2° JULIO. *Nova Luna* 18°.

Jam tandem *Æstas* affulget, *Pluviæ* parùm nisi ipso Initio & sub Finem Mensis, afflavit plerumque Ventus septentrionalis, australis rarissimè. Sol fuit fervidus sæpe, multò hinc tenuior facta est *Atmosphæra*, & sicciior longè, maximæ subindè Rorationes, interdum *Nebulæ* lenissimè spirante Vento.

Pluvia $\frac{''}{1}$. 2. 3. 18. 19. 27. $\frac{''''}{28}$ = 1.208. Dig. Dec.

Altitud. maxim. 30. 30.0. N b W 2. } media 29.738.
minim. 1. 29.2. S W b S 2. }

Dies frigid. 30. 36. } media 28½.
fervid. 13. 22. N 1. }

Febres quædam intermittentes, quædam *Peripneumonix*, *Ophthalmix* plurimæ — *Morbilli*
epide-

epidemici, iique sæpe funesti ; Tussis vehemens, ac *bellica* Febris, plerumque accedunt, duranteque diu ; sæpe Alvi Fluxus colliquans evanescentibus *Morbillis*, haud rarò *Ophthalmia*, Angina, & Ulcera Faucium succedunt, aliquandò *Parotis* cum *Erysipelate* Capitis ; plus semel hoc Mense notavi Faucium & Oris Gangrænam, Maxillæ porrò & Vomeris Ossis Cariem, unde Mortem miserrimam ; post *Morbillos* scilicet.

Febris putrida maligna quæ dudum sæviit, dominatur usque, maximè inter Nautas atque Captivos ; sæpe cum Maculis parvis, obscuris vel subatris, cum luridis interdum Papulis per totum Corporis Habitum ; sæpe Pustulæ largæ, erodentes erumpunt : Jam insuper magis urget Vomitus quàm antehàc, quem *Diarrhæa* gravis mox excipit : porrò haud rarò multò magis diffuunt Sudoribus : adeò tamen parùm hæc juvare videntur, ut potiùs Vires pessudent plurimum—Atqui si Fluxus Alvi citò nimis sistitur, Delirium obrepit certissimè, aut Sopor profundus, cum duro Abdominis Tumore, ac Singultu ; quo non aliud magis pestiferum *Symptoma*. Omnes ferè Morbi Statu plùs minùsve delirant, ac surdescunt semper—Quicquid fuit emissum Sanguinis vel rutilantem & speciosam habuit Faciem, aut lividam, aut atram, & Mucò viridi vel livescente obductum, semperque solutum nimis*—Proximè mihi accedere videtur hæc Febris ad Naturam istius malignæ quam Anno 1740 descripsi, adèoque Medicinâ utor eadem ferè, Deo dante, satìs feliciter.

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108.

Plena Luna 1° — AUGUSTO. Plena Luna 30°. 2
 Nova 16°

A tertio Die Mensis ad decimum septimum Pluvia multa, & triste Cœlum: flavit Initio Vultur, postea Libs — hinc vero ad Finem usque Apricitas pulchra, longè grata Messoribus: maximæ nunc Rorationes; jamque tandem lætè garriunt Cicadæ innumeræ, porrò Muscæ, modò quasi reviviscentes, volitant ubiquè, valdèque sunt molestæ.

Pluvia $\frac{///}{4}$. 5. $\frac{//}{6}$. 8. $\frac{///}{9}$. $\frac{//}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. 14.
 Dig. Dec.
 $\frac{///}{15}$. $\frac{1}{16}$. 20. 21. 23. = 3.516.

Multa Fulgura & Procella 8 Nocte S S W 4x
 — 9 Mane Procella S W b W 4 — 15 Nocte S S W 4x Nebulæ magnæ 24. 27. 28.

§ Altitud. maxim. 28. 30,0. NNW 1. } media 29.5 $\frac{6}{11}$.
 ——— minim. 9. 29,0. SW b W 4. }
 Dies frigid. 17. 40. W b S 3. } media 32 $\frac{2}{3}$.
 ——— calid. 3. 25. ESE 1. }

Morbilli frequentes, Variolæ sparsæ, at mitiores: Ophthalmiæ plurimæ, Dysenteria passim. — Sævit adhuc Febris maligna inter Nautas atque Captivos, rarior tamen multò est alibi, nec ita frequenter Petechiis scedata.

Nova Luna 14° SEPTEMBRI. Plena Luna 29°.

Ineunte Septembri Pluvia frequens, ab octavo autem Diē ad vicesimum octavum, nisi decimo sexto, nulla prorsus, Nebulæ interim sæpissimè,
 & Ro-

& Rorationes maximæ: Sol fervidus medio Mense, at maxima Pruina xx°. Ventus ab Oriente spiravit toto ferè Mense, à xx° ad xxviii velox admodùm.

Pluvia $\frac{''}{2}$. 3. 4. $\frac{'}{5}$. 7. 8. $\frac{'}{16}$. 28. 29. $\frac{'}{30}$.
 Dig. Deg.
 = 1.078.

Fulgur & Tonitru Mane 2°. Procella 22 E
 S E 4x.

Maximus Halo circa Lunam 26 Nocte.

§ Altitud. maxim.	11. 30,1.	E 1.	} media 29.6 $\frac{3}{4}$.
minim.	2. 29,2.	SE b E 2.	
Dies frigid.	24. 46.	E 3.	} media 35 $\frac{3}{10}$.
calid.	15. 26.	E SE 1.	

Variolæ frequentes, *Diarrhææ* & Morbi colici passim; aliquæ *Dysenteriae* cruentæ.—Plures adhuc Febre putridâ, malignâ laborant cum *Peccchiis*, Delirio, Singultu, &c.—*Asthma* sævissimum multos opprimit; plurimique Tumore Faucium, Maxillarum, *Parotidum* vexantur; *Ophthalmiæ* multæ.

Morbilli epidemici etiam inter Adultos, ac plures jugulant, sæpe More peripneumonico, sæpe lentâ *hecticâ* Tabe; haud rarò *Dysenteria* cruenta accedit, sæpiùs verò enormis mucosa *Diarrhæa*, nonnunquam accedunt dirissima Oris Ulcera, atque indè Maxillarum Caries.

Nova Luna 14° OCTOBRI. *Plena Luna* 29°.

Tristis fuit admodùm & maximè pluvius hic Mensis, vix Dies unus & alter apricus, Aër valdè crassus & humidus: Corus perflavit Initio, post Libs furens sæpissimè, Auster subindè, non rarò sub Finem Vulturus.

Pluvia

Pluvia $\frac{''}{1.}$ $\frac{''}{2.}$ $\frac{'}{3.}$ $\frac{''}{4.}$ $\frac{''''}{5.}$ $\frac{''}{6.}$ $\frac{''}{8.}$ $\frac{''}{9.}$ $\frac{''}{10.}$ $\frac{''}{12.}$ $\frac{''''}{15.}$
 $\frac{'}{16.}$ $\frac{'}{17.}$ $\frac{'}{18.}$ $\frac{'}{19.}$ $\frac{'}{20.}$ $\frac{'}{21.}$ $\frac{'}{22.}$ $\frac{'}{23.}$ $\frac{'}{24.}$ $\frac{''}{26.}$ $\frac{''}{28.}$

$\frac{''}{29.}$ $\frac{''}{30.}$ $\frac{''}{31.}$ Dig. Dec.
 Grando 3. 22 = 5.896.

Circius vehemens 1° Mane. Procella 5° Mane
 S 4—8 SW 4_x p. m. Iris vivida lunaris 1. H. 7.
 p. m.

§ Altitud. maxim. 14. 30,2. E 1. } media 29.3 $\frac{25}{19}$.
 ——— minim. 5. 28,7. S 4. }
 Dies frigid. 30. 54 SSE 2_x. } media 46 $\frac{11}{9}$.
 ——— tepid. 11. 38. SS W 2. }

Morbilli adhuc plurimi: *Variolæ epidemicæ*;
 Morbi colici & *Rheumatismi* passim, *Ophthalmiæ*
 multæ: Quidam Peripneumoniâ nothâ laborant,
 aliqui *Apoplexiâ* perculsi sunt. Tussēs, Coryzæ,
 Gravedines, ac Febriculæ *catarrhales* permultæ:
 Febres lentæ & *nervosæ* haud raræ.

Nova Luna 12° NOVEMBRI. *Plena Luna* 28°.

Venit ab Oriente Ventus ad Diem xiv, ad Sep-
 tentrionem vergens plerumque, tunc Aquilo, mox
 Auster furens Pluviam demisit plurimam, paulò
 tamen post rursùm frigidus Aquilo; ad ipsum
 Finem Libs. *Atmosphæra* fuit ut plurimùm geli-
 da, crassa admodùm ac humida.

Pluvia 1. $\frac{'}{2.}$ 12. 13. $\frac{''}{14.}$ $\frac{''''}{18.}$ $\frac{'}{19.}$ 20. $\frac{'}{21.}$

$\frac{''''}{22.}$ $\frac{'}{23.}$ $\frac{'}{26.}$ $\frac{'}{30.}$ Dig. Dec.
 Nix 15. 16 = 3.522.

Fulgura multa sine Tonitru 1 Nocte SE 1^x.
 Procella 18 S b W 4—19 p. m. SW 4_x. Cir-
 cius

cius vehemens 19 Nocte. Subitus admodum & maximus *Baroscopii* Descensus 18, à 29. 7. scilicet ad 28. 8 intra sex vel octo Horas. Gelu regidum 16. 17. 21. 25. Denfiffima & valdè foetida Nebula 23. p. m.

§ Altitud. maxim. 6. 30,3. E N E 1^x. } media 29.7³.
 ——— minim. 19. 28,7. N W 4^x. }

Dies frigid. 16. 71. N b W 1. } media 57¹/₆.
 — tepid. 1. 46. S E 1^x. }

Variolæ undiquè *epidemicæ*, jamque quædam malæ admodum sunt Indolis; utcunque per totum Autumnum fuerant benignæ. *Ophthalmiæ* plurimæ, ac *Epiphoræ* pertinaces admodum. Pleuritides aliquæ & Peripneumonix.

Ineunte Mense Febris quædam *catarrhalis* recurrit, seu potiùs ingruit; vehemens Dolor Capitis atque Pectoris Oppressio urgent, Nausea perpetua ac Vomitus pituitosa. Pulsus valdè velox, at mollis, rarò tensus: Lingua sordida, sub-lutea, vix unquam *arida*; Urina turbida admodum pallidam, at flavescentem, prælargam, per totum Morbi Decursum, deponens Subsidentiam. Expuunt omnes largissimè. — Sanguis rarissimè valdè tenax est. interdum verò nonnihil glutinosus, omnes Vertigine & Somnolentiâ nimia laborant. Quosdam *Diarrhæa* lenis liberat, quosdam Sudor blandus æqualis, plures liberrimam Sputamina maximè secta priùs Venâ & proritatâ Vomitione; ubi nimirum Artis est Subsidium adhibere Naturæ.

Novæ

Nova Luna 12° DECEMBRI. *Plena Luna* 27°.

Incipiente *Decembri* flavit Boreas, consequente frigidâ & siccâ Tempestate : ab xi ad xv pluvius Vulturnus, paulòque pòst turbidus Auster ; sub Finem Mensis Eurus : Aër fuit crassius valdè, & medio Mense humidus maximè.

Pluvia 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19.
20. 21. 22. 23—25. 26. 30—3. 4. 10. Dig. Dec.

Procella 13. p. m. S E b S 4—19 totâ Nocte
S 4—20 Mane S W 4.

———— 23 Nocte S W 4—24 totâ ferè Die
S W b W 4.

☿ Altitud. maxim. 2. 30,4. ENE 1°. } media 29.5 $\frac{3}{4}$.
———— minim. 14. 29,0. SSE 3°. }
Dies frigid. 7. 70. NE 2°. } media 59 $\frac{3}{8}$.
———— tepid. 19. 50. S 4. }

Tussis vehemens, *Asthmatica*, frequens : *Variolæ* maximè *epidemicæ* longè latèque ; quædam confluentes sunt, parvæ, sessiles, nigræ, quædam tamen valdè benignæ. — Febriculæ pustulosæ (*the Chicken and Swines Pox*) plurimæ inter Pueros : Pustulas has subrubras & aquosas pro Variolis sæpe agnoscunt Mulierculæ (nam & Vestigia crebrò diu relinquunt) haud rarò tamen paulò pòst tristi Eventu vident Errorem, dum Variolæ, eæque malignæ, reverà invadunt.

Jam increbescunt valdè Febres peripneumoniciæ, periculosæ quidem & haud rarò lethales. Aliqui parùm aut nil expuunt plures biliosa admodùm sincera & perliquida aut spumosa &

minime cocta, nonnulli Saniem ferè subatram : anhelant maximè & summâ Pectoris Gravitate premuntur—Majus mihi videtur impendere Periculum Peripneumoniciis ubi permagna urget Pectoris Oppressio, & grave quoddam Præcordiorum Pondus, etsi levis tantùm & obtusus adfit Dolor, quàm si Pectore, aut Latere magis acutè torquentur : hîc enim Sanguinis Missio certum plerumque adfert Levamen : in priore Casu, ita sæpe non juvat ut etiam haud parùm sit noxia. Jam utiquè plures occurrunt Peripneumoniæ, ubi immensa est Pectoris Gravitas, & Spirandi Difficultas magna, & Tussis haud levis, & multus in Pulmone Strepitus, quæ vix tamen admittunt Venæ Sectionem *—Sperares forsan magnum à repetitâ Sanguinis Missione Auxilium, accidit è contrâ Debilitas maxima, Sputi Suppressio, Anxietas gravissima, Vigiliæ perpetuæ, mox Delirium, Tremores, frigidi Sudores, tandemque nimis frequenter Mors inopinata : sæpe etiam inter Gemitus & Colloquia.—Atqui hunc Sanguinem inspicere diligenter ; nimium semper apparet solutus, quamvis floridus plerumque, & speciosus, & diu Seri tenax ; aspice altera Vice detractum Cruorem, Crassamentum lividum vides, & laxum maximè, plurimo fulvo, turbido aut subviridi, aut subrubicundo innatans Sero : tertia, nigrum ferè & saniosum, vix ullo Modo cohærens—Pessimi hoc semper Ominis notavi in Peripneumoniâ, & plerumque lethale *.

Sunt autem & nunc multi *Pleuroperipneumoniâ* laborantes, præsertim Ruricolæ, quibus Dolor

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108, 211.

est Pectoris aut Lateris vehemens, Tussis violenta, Spiritus ex Ore fervens, interruptus, difficilissimus, Pulsus plenus, durus, atque velox, rubicunda ac turgida Facies—Postulant hæc citam & largam Sanguinis Missionem, imò & repetitam, unde mox relevantur plurimum—Horum autem Sanguis densus admodum & viscosus est, ac dum frigescit Pelliculâ obductus albidâ, & coriaceâ quasi—Porrò Sanguine misso, Diluentia subacida, nitrosa, & quæ Sputo movendo sunt, Morbum ut plurimum brevè solvunt.

At prior Peripneumoniæ Species, hoc Mense, hîc magis sæviebat, in quâ Urina plerumque Initio erat cruda prorsus, sæpe tenuis, subindè autem quasi lactea, sub Finem verò parca, turbida, subnigra. Lingua atro veluti Muco oblita, vel sicca admodum & prærubra, Colore Corticis Granati æmula, sæpe tamen glabra valdè, livescens, & splendida quasi, at aridissima, cum Bullâ nigrâ interdum ad Linguae Apicem—Pestifera hæc & funesta sunt; potissimum si saniosa, nigra, & valdè foetida Sputamina ejiciuntur.

Res est herclè non levis Momenti duas has Peripneumoniæ Species probè distinguere, maxime per Initia Morbi; cum & ingens Pectoris Oppressio & Spirandi Difficultas, Febris Ardor & Sævitia Tussis, utramque comitentur, & æquè postulare videantur Sanguinis Missionem. Prior attamen, & jam frequentior, Peripneumonia, vix quartam Sanguinis Partem adimi patitur sine summâ Virium Ruinâ, quam posterior & fert facilè, imò & sæpissimè poscit.—Unde igitur petenda Distinctio est?

Si Pulsus celer valdè, exilis & contractus est, aut mollis, inæqualis & vacillans, si Anima ducitur

citur laboriosè & cum frequente Suspirio, potius quàm cum Anhelatione æstuante, si urget magis Pectoris Gravitas quàm Dolor, si Urina cruda est, tenuis, & vapida, si profusi aut inæquales, frigiduli Sudores erumpunt, si Languor magnus & Manus tremulæ, cautissimè protectò mittendus est Sanguis & perparcè; si modò liceat omninò secare Venam. At si frigefactus Cruor nimis apparet solutus, & parùm firmè cohærens, utcunquè floridus sit, protinùs siste Manum, ni jugulare vis ægrotantem. Si de mittendo Sanguine dubitas, an scilicet conveniat necne, hoc certè cognosces Signo; nunquam igitur dubio in Casu, primâ Vice, esto Laticis vitalis prodigus; qui sæpe corrigendus est utiquè, non profundendus: —At si plenus, velox, tensus, aut durus Pulsus validè vibrat, ardetque Febris, si fervidus expirat Spiritus atque densus, si Pectus dolet admodum, rubetque Vultus & turget, mittendus semper est Sanguis pleno & Flumine & Modo; etiam bis, terve, repetenda est Venæ Sectio si urget usque spirandi Difficultas atque Dolor, maximè si extracto Cruori inhæret Crusta subflava & glutinosa valdè.

Nunc grassatur plurimùm Febris quædam putrida, diu admodum sæpe detinens Ægrotos, multisque certè lethalis: haud rarò ad vicesimum Diem, imo aliquando ad tricesimum usque protenditur.

Levis Rigor Initio totum, pererrat Corpus, subito mox Calore incertoque exceptus; sic Vicibus alternis: Lassitudo insuper & vagus Dolor omnia fatigat Membra; nunquam non protinùs accedit Capitis Dolor, sæpe acutus admodum in Fronte, in Temporibus, in Sincipite,

interdum in imis Oculis: Pulsus interea celer, tremulus, inæqualis est, etiam & haud rarò intermittens planè, ac fortiore Digiti Pressu interruptus prorsus.—Urina verò tenuis est ac mera quasi Vappa, aut Jumentorum instar turbida *, sed nihil omninò deponens *—haud multùm inarescit Lingua, nec sitiunt valdè, sordescunt tamen semper Fauces—Vomitibus interim biliosus, viridis, aut fuscus urget vehementer, sæpe haud parùm foetidus; Anxietas enormis, Jactatio perpetua, ac Pervigilium contumax, semper, accedente Morbi Statu, Delirium inferunt & Tremores, Tendinumque Subsultus: Sub Finem Lingua Labiaque tremula fiunt, nigra & aridissima, Dentes atrii & sordidissimi. Singultus, Oculi vitrei, Sudores frigidi, Ungues lividi, Pulsusque deficiens, instantem denunciant Mortem; licet interdum stupidi sine Sensu, Motu, aut Loquelâ jacent per Dies aliquot integros priusquam extremam agunt Animam, Coxis interea Natibusque *Necrosis* affectis.

Hoc modo huic Febri succumbunt multi; at sæpiùs multò magis effera sævit—Premittit ipso Morbi *Insultu* Anxietas, & Præcordiorum Pondus immane, acerbissimus Capitis atque Dorfi Dolor, Vomitus perpetua, viridis, atra, horrenda, Singultus continuus, nigrescit Lingua, Dentesque protinùs, furit mox Phrenitis. toto Corpore tremunt, tandemque frequenter *Caro* premuntur, nec evigilant unquam—Sextum inter Diem ut plurimùm & nonum erumpunt *Petechiæ*, sæpe lividæ, sæpe etiam aterrimæ, quæ interdum

* Οὕτως ἀνάλισται, οἷον ὑποζυγίων. Aph. 7c. Sect. 4. Vide *Holler*. in Aphorismum.

repentè

repehtë vanescunt, profuso fluente Sudore, vel *Diarrhœâ*; quibus *Ægri* sæpissimè laborant. Crebrò Sanguinem stillant Nares, aliquando profundunt, unde Delirium sæpe mitescit, sed indè Vi-res deprimuntur maximè—quod idem de Fluxu Alvi dicendum est, qui multò sæpius accidit—Citiùs equidem tardiùsve semper ferè, durante Febre, per Alvum molita est Natura *Crisis*, at frequenter nimis Morbus tantùm Morti cessit; haud rarò autem successit Victrix Natura—Si Dejectiones nigræ, perliquidæ, aut saniosæ sunt, & maximè foetidæ, utiquè nihil spero, præcipuè si absque Voluntate descendunt: nec multò sanè melioris est Ominis inflatum atque durum Abdomen, perdurante Ventris Cursu, præsertim si Singultus advenit. & perpauca redditur Urina; quam subatram penè notavi, imò & nonnunquam planè nigram.

Hanc habes hujus Febris Historiam, Lector; quam sive *scorbuticam*, sive malignam, sive pestilentem dices, nihil moror; est sanè valdè funesta, atque haud pauca prodit magnæ Putrescentiæ, etiam & Contagii, Signa. Quicquid est perparcam, si modò ullam admittit Sanguinis Detractionem, ex majore Venâ saltem, sine stupendâ Virium Jacturâ—Vomitum autem plerumque moveo, seu promoveo potiùs, quia Sponte ferè urget semper; Alvumque *Clysmate* duco, si sit astricta. Mitioribus postea utor *Alexipharmacis*, iisque subausteris & Acido imbutis, inter quæ vix meliora, nedum tutiora, probo quàm Vinum ipsum rubrum cum Aquæ fermè Dimidio, in quo porrò Macis & Cinnamomi paululum sit incoctum, adjecto Malo *Aurantio* Hispalensi tosto, ac deinde contuso & infuso: jucundus admo-

dùm est hic Porus & Morbo percommodus. Si vis alia, *Tinct. Rosar. Decoct. Lusitan. cum Aq. Cinnam. & Sp. Lavend. C. paululo, Serum & Lactis vinosum tenuissimum, Locum habent: nec siti-entibus, atque avidè desiderantibus, nego subindè Vinum Pomaceum subtepidum: Sales Alcalinos volatiles & Spiritus, ut dicuntur, respuo prorsùs *, nisi cum Salinis utor Haustibus. Hæc, vel similia, præcipio ad Febris usque Statum; intereà verò si vehemens sit Infania Cucurbitulas scarificatas Hum-eris Cervicibusque applicari jubeo, sæpe deìn *Epispastica*, maximè si Languor opprimit. Blanda porrò *Eccoprotica* exhibeo tertiis, quartisve Diebus, si Alvus est dura nimis—in ipsà Febris *Acutè* parùm certè moveo, perspicuens diligenter quid Natura faciat, aut ferat.*

Si perficca Cutis est & aspera *Campboram* cum *Theriac.* aut *Mithridat.* necnon *Haust. salinos vo-latiles*, aut *Jalap. Campborat. cum Aceto, Sp. La-vend. C. & Syrupò Crocino* præscribo; idque ut plurimùm bonis Avibus si blandi Sudores erum-punt, & floridæ Pustulæ urentes—Si parùm hæc proficiunt alia tentanda est Via, per Alvum nem-pe ac Urinam; adeòque *Rhabarbari paululùm cum Sale Succino & Nuce Myristicâ* alternis saltem Diebus ministro, aut *Mannam Calabrinam, Cre-morem Tartari & Tartar. solubil.*—Si liquidus ni-miùm sit Venter compesco Fluxum paulatim *Tinct. Rosar. Decoct. alb. Confect. Fracastor.* fortio-ra *Opiata* suadeo rarissimè; si *Theriacam* exci-pias—Jam summa mihi Cura est sustentandæ Naturæ molli restaurante Victu, & Medicinâ ido-neâ; *Panatellam, Juscula leniora, Panem bis coc-*

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 118.

tum ex Vino, *Gelatinam C. C. Sago, Salap.* aliaque hujusmodi præcipio—pro Medicamento autem maximè *Tinct. Cortic. Alexipharmac.* quæ mihi longo jam Tempore, Febre putridâ declinante, explorata atque probata est; atqui huic semper fermè adjicio *Elixir. Vitrioli*—Hac *Methodo* herclè, ac Medicinâ, perplurimos ex ipsis *Or-ci* *Faucibus* ereptos novi,—surdastros tamen semper, atque stupidos diu; *Linguâ* indelibili penè *Nigrore* fucata.

Tota *Pluviæ* *Quantitas*, Anno MDCCXLV.
Dig. Dec.
fuit = 35.476.

Nova Luna 10° JANUARIO. *Plena Luna* 26°.

Ventus fuit parùm constans hoc Mense, sæpe frigidus, sæpe nimbosus: ab Oriente spiravit Initio, septimo & octavo Libs irruit; à x ad xvi Eurus aut Boreas, indè ad vicessimum nonum Corus, aut Libs, hic plerumque furens, ad ipsum Finem Boreas.

Pluvia 1. 7. 8. 16. 18. 19. 20. 21. 23. 24.

25. 26. 27. 28. Grando 29. Nix 30 = 3.496. Dig. Dec.

Procella 23 Nocte S W b W 4. — 25 totâ Die S W b W 4.

— 27 p. m. S W b W 4. Circius vehementissimus Nocte inter 27 & 28. Rigidum Gelu & maxima Pruina 5. 6. 13. 14. 15. 29. 31. maximus Halo circa Lunam 20 Vesperis.

Altitud. maxim. 5. 30. 4. NE 1. } media 29. 8 $\frac{7}{8}$.
minim. 27. 28. 8. }

L 3

Dies

Dies frigid. 31. 70. NE 1. } = $59\frac{3}{8}$.
 — tepid. 25. 50.

Variole adhuc *epidemicæ*, plerumque autem satis benignæ; inter Nautas tamen & Milites haud paucos occidunt: An quòd à pravo Victu & pessimâ *Spirituum Ardentium* Ingluvie horum Sanguis fit magis acris & putridus? an quòd à *Scorbuticâ* Lue, imò &c. sæpissimè *venereâ*, polluitur?—Hoc sanè perpetuum est, quòd omnis Febris *epidemicæ* magis est inter hos pestifera quàm vel Oppidanos inter aut Ruricolos. Faucium Tumores, & Tusses undiquè, *Morbilli* plures & *Rheumatismi*.

Febris putrida, *nervosa*, maligna usque grassatur, pluresque opprimit, atque multos diu admodum trahit.

Peripneumoniæ multæ mali admodum Moris cum Spirandi Difficultate & Anxietate maximâ, Dolo in imo Pectoris, atque Tussiculâ perpetuâ, perpauca sæpe exantlante, sæpe laniosa prorsus. Hæ post tres, quatuorve Dies in malignam *nervosam*, aut *petechialem* degenerant, Viresque summoperè deprimunt—Vix Sanguinis Missionem adeò admittunt, multò minus repetitam aut largam*.

Nova Luna 9° FEBRUARIO. *Plena Luna* 24°.

Boreas perflavit sæpissimè durante *Februario*, Aëremque fecit siccum & valdè frigidum, acri admodum sæviente Gelu; altam intereà tenuit Stationem *Barometer*—interdum verò Libs pro-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 184—186.

cellosus *Mercurium* depressit maximè, multam-
que demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{8}$. 15. $\frac{11}{17}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{20}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{24}$.

26. 27. Nix multa $\frac{1}{14}$ —28. Grando gravis 18

Dig. Dec.

Nocte=2.680.

Procella 18 Nocte S W b W $\frac{1}{4}$. AB. 9.

H. 8. N E 1—27 N E 2.

Altitud. maxim. 2. 30, 6. E N E 1. } media 29. $7\frac{2}{3}$.
minim. 20. 28, 4. S W b W $\frac{1}{3}$.

Dies frigid. 13. 76. N N E 2. } media 64.
tepid. 26. 52. N W 1.

Plurimæ adhuc *Variolæ*, ut plurimum mitiores,
Nautis tamen, Militibus, atque Captivis adhuc
valdè funestæ, qui quidem evadunt, Furunculis
& Ulceribus maximè vexantur, sæpe *bettica*
Febre.

Tussis sævissima, *Asthma* pertinax, Anginæ,
Fauciumque Tumores permultos cruciant. —
Rheumatismi, Pleuritides, ac *Pleuroperipneumonia*
sunt valdè frequentes.

Dominatur usque Febris quædam peripneu-
monica, pestilens admodum pluresque opprimit:
magna semper adest Pectoris Oppressio & Præ-
cordiorum, vehemens plerumque accedit Capitis
Dolor, vel ipso Initio cum gravi Vertigine, cui
mox Delirium: tenuia, cruda, spumosa sæpe ex-
puunt, interdum biliosa valdè, satis liberaliter,
at parum aut Nil plerumque juvantia, aliquando
fœda, subnigra, & saniosa—interea haud mul-
tùm urgere Febris videtur, aut Sitis, nec est
Lingua admodum sicca, Muco attamen subatro

frequenter perfusa. Si, adveniente Morbi Statu, Urina (fulva priùs & turbida) derepentè tenuis mingitur & aquosa, sequitur mox semper Delirium, brevique post crebrò Singultus, atque lethalis Nervorum Distentio — Haud rarò hanc Febrem solvit *Diarrhœa critica*, utcunque in aliis Pulmonariis sit pertimescendus (nimius saltem) Alvî Fluxus. Læti plerumque etiam est Ominis Pustularum & Ulcusculorum Eruptio circa Labia, licet molesta est admodum — Papulæ porrò rubræ, urentes per totum ferè Corpus, olido succedentes Sudori, Morbum, præcipuè sub Declinationem, prorsus judicant totâ ferè post desquamante Cuticulâ * — Hoc adeò notans Judicium, quibusdam *Vesicatoria* à Capite penè ad Calcem usque applicari jussi; verùm enimverò Opinione minus jam successit Experimentum.

Nova Luna 11° MARTIO. *Plena Luna* 26°.

Prior Martii pars fuit sicca valdè & frigida, Boreâ flante cum rigido sæpe Gelu; a xii ad xxi Vulturius plerumque, Pluviâ frequenter cadente, Libs interdum; ad Finem recurrit Boreas.

Pluvia 6. 7. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 22.
 23. 24. 25. 26. 29. 30. 31. Nix 8. 10. 11.
 Dig. Dec.
 = 3.072.

AB. 14 Vesperî & Noctè W N W 1. Peramplus Halo circa Lunam 15 Vesperî W S W 1^x, maxima Nebula Manè, Vento silente.

* *Essay on Fevers*, P. 220.

Altitud. maxim. 3. 30. 5. NE 1. } media 29. 5 $\frac{1}{2}$.
 ——— minim. 23. 28. 8. S S W 3. }
 Dies frigid. 1. 69. N E b E 1. } media 56 $\frac{1}{2}$.
 ——— tepid. 18. 48. S E b E 2. }

Variolæ Sporadicæ; *Morbilli* jam iterum sunt valdè frequentes, sæpe etiam malæ prorsus Naturæ; quippe qui, haud facilè erumpentes, luridi sunt, aut lividi, quibus semper accedit Tussis sævissima, interdum Peripneumonia gravis, aliquando Tormina dira—Tusses, laboriosæ admodum, creberrimæ; Angina & *Asthma* frequens valdè. Plures Sanguinis Sputo corripuntur: Tabidi & Pulmonarii jam pessimè se habent.

Ubiquè nunc sæviunt Peripneumoniæ & *Pleuroperipneumoniæ*, æque sæpe valdè periculosæ: sunt qui nihil omninò expuunt aut difficillimè, sunt qui cruda & tenuia, parùm aut nil juvantia, sunt etiam qui saniosa prorsus ac valdè olida: Qui verò cocta, liberalia Sputa, pauxillo Sanguine tincta extussiunt facilè, intra perpauços Dies Morbo liberantur—atqui priora mali semper sunt Ominis, nec Pectus, nec Præcordiorum Oppressionem, nec Anxietatem levant, nedùm Febrem—Sed mox ab Initio ferè delirant tales, aut enormi debilitante Alvi Fluxu corripuntur; qui mox omninò Sputa suppressit, pessimo semper Eventu—at longè melioris Tæssera Fati est Urina copiosa, turbida, plurimùm subflavi Sedimenti deponens; cruda verò & aquosa est admodum perniciofa, prærubra autem & parca Nihil Boni denunciat *—Quibus, ingruente Morbo, Sanguis extractus est, eique superfœrnicur

* *Essay on Fevers*, P. 217.

Pellicula tenax, pallidè flavescens, citò plerumque relevantur contrà verò ubi solutior est debito Cruor, ac vel rutilans valdè, vel lividus *—Pluribus erumpunt Pustulæ magnæ, urentes, præcipuè circa Labia; frequenter etiam per Humeros, Brachia Cruraque; idque ferè semper bonis cum Ægroti Rebus.

Nova Luna 9° APRILI. *Plena Luna* 24°.

Initio Aprilis frigida Tempestas & sicca Euro spirante, Die quarto rigidum Gelu; post septimum Ventus inconstans, plerumque tamen Vultur-
turnus flavit, aut Aquilo; à xix ad xxii Aust-
er nimbosus; maximæ Nebulæ exeunte Mense.

Pluvia $\frac{5}{7}$. $\frac{7}{8}$. 11. 16. 17. 19. 20. 21.

Dig. Dec. 22. 24. 26. = 1.960.

Procella 19 Nocte S S E 4_x—20 a. m. S 4
gravis autem mediâ Nocte S 4^x.

Altitud. maxim. 27. 30. 2. N b E 1. } media 29.5 $\frac{28}{9}$.
minim. 20. 28. 9. S 4. }

Dies frigid. 4. 62. E b N 1. } media 48 $\frac{18}{9}$.
tepid. 29. 36. W N W 1. }

Variolæ plurimæ, *Morbilli epidemici*; *Morbillis* decedentibus sæpius accedit sævissima Tussis & Affectio peripneumonica, haud rarò *Hæmoptæ*, interdum *Diarrhæa* profusa & obstinata valdè; multos hinc enecant Pueros, imò & nonnunquam Adultos.

Angina frequens valdè, necnon Pleuritis, Peripneumoniæ veræ, *Pleuroperipneumonia* permul-
tæ, æque sanè haud rarò lethales, maximè cum
Angina subitò in *Pulmoniam* mutatur—est etiam
& jam passim insolita quædam Pleuritis (si sit ita
nominanda) ubi inter Scutula operta acerrimus
sævit Dolor, qui ad Sternum * usque protendi-
tur, maximâ cum Gravitate Pectoris & Spirandi
Labore, interdum & per totam Dorsi Spinam &
Hypochondrium immaniter cruciat, adeò ut vix
respirare aut tussire valeant, imò omni Molimine
Tussim aliquando suppressere nituntur ob Dolo-
ris Vehementiam; volunt se subindè in Lecto esse
erectos, mox verò ejulantes, impatientes, atque
prorsus impotentes recumbunt; urget adeò Jac-
tatio perpetua, Anxietas horrenda, Tormentum
intolerabile, Verbo *Hippocratico*, *Δυσφορία* gra-
vissima; continuâ vexantur Tussiculâ, at parùm
aut Nil expuunt, vel spumosa & cruda penitus;
accedit interdum Singultus, quem paulò post se-
quitur inæqualis, frigidus, oleosus Sudor, brevî-
que Mors. Est profectò acutissima Febris, &
intra perpaucos Dies jugulat: robustum quen-
dam Juvenem quarto Die inter tussendum vio-
lentâ Nervorum Distentione correptum atque
abreptum novi—Estne Morbus, quem *Hippo-
crates* *πλευρίτιν ἐν ὠτῳ*, seu *ωστιάδα* † vocat, Inflam-
mationem nempe vel *Diaphragmatis*, vel *Medias-*

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 239. † Sic describitur, Lib. 2. de
Morb. Sect. 54. Edit. *Linden*. Πύρος καὶ πυρετός καὶ βῆξ καὶ δύσπνοια
λαμβάνει—πόνει μάλιστα τὸ μισάφρον καὶ τοὺς βουβῶνας—rursum
Lib. 3. Sect. 21. τὸν ὠτὸν ὀδυᾶται ὡς πληγῆς καὶ ῥίγι καὶ ἀναπνέει
ἀθρόον—ὀδυῖναι δὲ ἐξίται διὰ τῆς ράχης εἰς τὸ στῆθος καὶ εἰς τὰς βουβῶνας
τείνουσι.

lini—Vox *Paraphrenitis*, quâ denotatur inter Recentiores Inflammatio *Diaphragmatis*, nusquam apud *Hippocratem* legitur.

Summum hîc Præsidium est in opportunâ Sanguinis Missione, *Nitrum* mox & *Sperma Ceti* cum *Campboræ* paululo opitulantur; porrò *Oleum Lini recens*, sive *Amygdalinum* cum *Elixire Asthmatico* & *Diacodio*, post Venæ Sectionem admodum juvare videtur, ad relaxanda nimirum Vascula nimis constricta, & ad Dolorem sedandum—Quibus autem *Pleuriticis*, aut *Peripneumoniacis*, Sputa copiosa, subflava, & modico Sanguine tincta ejiciuntur facilè, in Vado brevi sunt, idque sæpe intra perpaucos Dies—Horum sanè vix aliquis perit—Non ita tamen si cruda, tenuia, spumosa, aut merè sanguinea, aut saniosa, aut atra, extussiuntur: Hi namque perpetuâ vexati Tussi parùm aut Nil levantur, tandemque vix undecim elapsis Diebus Morbo succumbunt, vel purulenti fiunt & tabidi—Pedum Tumores aquosi, Febricula sub Noctem, Tussicula sicca & Spiritus difficilis, hoc denunciant, quæ profectò jam post Febres pulmonarias, multò sunt frequentiora solito.

Alia igitur atque alia in Morbis, nunc Vulgaribus, tractandis, datur Erroris Ansa; plures enim ab ipso Februm Initio profusis Sudoribus corripiuntur, alii *Diarrhœâ* ferossâ prælargâ—crederes hæc forsan Morbi Solutionem—minimè verò; quid quòd, exhaustâ liquidiorè Sanguinis Parte, restant Humores magis crassi, confusi, acres—Fateor me nuperrimè vidisse duas, tresve Febres *Mesentericas* (ut cum *Baglivio* loquar) per Alvi Fluxum judicatas, sed erat sub *Diaphragmate* Tensio, Dolor, Gravitas; perperam verò pro Peri-

Peripneumonicis epidemicis habitæ fuerunt; atque in harum unâ curandâ mirabatur maximè *Chirurgo-Pharmacopæus* me Potionem *Catbarticam* imperâsse, omisâ Venæ Sectione; at id ego fatîs feliciter.

Summâ porrò Opus est Cautelâ in *Pulmonariâ* quâdam nothâ medendâ, quæ jam etiam subindè occurrit; ita lento incedit Pede, ita parùm Doloris urget, dum maxima interim adest Oppressio; ut vix de Ægritudine querantur priusquàm de Ægrotis actum est penitùs, quos servassent ex facili matura Auxilia, scilicet *Epispastica* frequentia, lenis Alvi Ductio, & *Emetica* blanda, Diluentia insuper idonea, ac Detergentia modica; hæc inter Serum Lactis *Sinapinum* primum fortassè obtinet Locum—Adjiciam verò & hoc obiter, quod perrarò Sanguis in hoc Morbo, nisi Cucurbitulis scarificatis, atque ipso Initio, detrahatur commodè.

Nova Luna 9° MAIO. *Plena Luna* 23°.

Incipiente Mense perpulchra & valdè calida Tempestas, pòst autem frigidior, aliquâ cadente Pluviâ: ab undecimo ad decimum octavum sudum rursùs & fervidum Coelum, aspirante Subsolano, maximæ interim Rorationes—indè verò Pluvia frequens ad Finem usque, Africo flante à xxvi ad xxxi.

Pluvia 4. 5. 7. 12. 17. 19. 20. 21. 25. 27.

Dig. Dec.

29. 30. 31 = 1.760.

Fulgur sine Tonitru 16. 17. Nocte—Fulgur & To-

& Tonitru 19 p. m. Fulgura ac Tonitrua sæva
25 p. m.

§ Altitud. maxim. 5. 29,9. NW bN 1. } media 29 4 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 31. 29,0. SW 2. }
 Dies frigid. 6. 43. SE bE 2. }
 ——— fervid. 15. 19. NNE 1. } media 30 $\frac{2}{3}$.

Variolæ epidemicæ, Morbilli plurimi — Febres aliquæ biliosæ, valdè periculosæ; foedatur interdum Facies etiam in Peripneumonicis — *Dysenteria* frequens, imò & aliquando cruenta, Pleuritides & Peripneumoniæ multæ adhuc, at jam bene instituta Sanguinis Missio, Sputaque subcruenta aut subflava brevè Morbum solvunt. Arthritides sævæ, & pertinaces admodum etiam hac Tempestate — Plures à *Phtisi* pulmonariâ pereunt.

Nova Luna 8° JUNIO. *Plena Luna* 22°.

Per Initia Mensis pluviosa valdè & frigida Tempestat, ab octavo autem ad decimum quintum Apricitas, Cauro spirante aut Aquilone; indè ad Finem usque horrida, squalida, frigida Tempestat, algido Libanoto ferè semper furente, qui *Atmosphæram* fecit crassam valdè & maximè humidam.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. $\frac{1}{2}$. 3. $\frac{1}{2}$. 4. $\frac{1}{2}$. 5. 6. 7. 16. $\frac{1}{2}$. 18. 19.
 Dig. Dec.
 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 20. 21. 24. 25. $\frac{1}{2}$. 26. 27. 28. 30 = 3.070.
 Procella 4. 5. SW 4x — 25 Nocte SSW 4.

§ Altitud. maxim. 11. 29,8. N 1. } media 29,5.
 ——— minim. 4. 28,8. SW 4x. }

Dies

Dies frigid. 7. 42. S W b W 2. } media 34 $\frac{1}{2}$.
 — calid. 15. 26. Malacia. }

Morbilli usque valdè frequentes, sed jam multò magis eminentes ac pustulosi sunt quàm inunte Vere, nihilominùs tamen sævissima Tussis, interdum Peripneumonia vehemens, hos etiam comitatur.

Variolæ quoquè plurimæ, eæ autem benignæ sunt ut plurimum, utcunque exitiales sunt pustulosi *Morbilli*—*Pleuritides* & *Peripneumoniæ* passim; *Dysenteria* aliquæ. *Ophthalmia* & *Lippitudines* jam sunt frequentes admodum.

Nova Luna 7° *JULIO.* *Plena Luna* 21°.

Pluvius, algidus & tristis fuit hic Mensis, *Decembrem* potius quàm *Julium* adesse crederes; venit plerumque ab Occidente Ventus, vergens ad Austrum, & sæpe nimbosus; Aër interim nebulosus & maximè humidus—omnes Fructus crudi sunt prorsùs & planè fatui—Myriades Limacum perreptant undiquè, vix autem volitat Papilio—Omnium Arborum Frondes Foliaque, Mare spectantia, nigra sunt & veluti combusta.

Pluvia $\frac{///}{1.}$ $\frac{///}{2.}$ $\frac{///}{5.}$ $\frac{///}{6.}$ $\frac{///}{9.}$ $\frac{///}{10.}$ $\frac{///}{14-16.}$ $\frac{///}{18.}$ $\frac{///}{19.}$

$\frac{///}{20.}$ $\frac{///}{21.}$ $\frac{///}{22.}$ $\frac{///}{23-24.}$ $\frac{///}{25.}$ $\frac{///}{26.}$ $\frac{///}{28.}$ $\frac{///}{29.}$ $\frac{///}{30.}$

Dig. Dec.
 = 3.604.

Fulgur & Tonitru 5. p. m. plurima Fulgura 18 Nocte, levis Procella 18 Nocte S S E 4. Dies æstuosi 15. 16. 17. 18.

Altitud. maxim. 8. 29.9. W 1. } media 29.5 $\frac{1}{2}$.
 — minim. 19. 29.2. S W 3x. }

Dies

Dies frigid. 24. 38. W b S 3. } media 31 $\frac{1}{2}$.
 — fervid. 17. 18. S 1.

Variolæ Modò valdè *epidemicæ*, magisque etiam funestæ; utpotè sæpe confluentes, sessiles & atræ, sæpe crudæ, aquosæ, diffuentes; dira interdum excitant in Faucibus Ulcera, & enormem Salivæ acris Fluxum.—Morbilli adhuc grassantur.

Ophthalmiæ perplurimæ cum *Epiphorâ* maximâ atque acerrimâ, Dolor Dentium porrò plurimos torquet: in utrisque crebra *Catarsis* juvat magis quàm Missio Sanguinis.—Gravis in Pulmones Distillatio plures infestat, unde haud pauci in *Phtisin* pulmonariam incidunt.—Multi *Rheumatismi* & *Pleuritides* incipiente Mense, necnon *Peripneumoniæ* aliquando cum *Petechiis*.

Non solùm *Variolæ*, sed & omnes penè Morbi, jam peioris sunt Indolis quàm regnante Vere—An ab algidâ udâque Tempestate Cutis Meatus occludente, ac perspirantes Humores reprimente; unde serosa genita est Colluvies, eoque forsan acrior, quò magis Bilem Sanguinemque adufferat Fervor Solis immodicus durante *Mai*o: qui porrò è Terrâ immensam Vaporum Copiam excitavit, quam & *Junio* & *Julio* Mense, sub Formâ Pluviæ, ruentem vidimus?

Terribilis jam sævit *Scorbutus* inter Nautas, præcipuè quos secum reduxit *Martin*, Classis occidentalis Præfectus; excruciantur perplurimi Ulceribus foedis, lividis, sordidis ac valdè fungosis: mirum est profectò, & insolitum, quàm brevi Tempore spongiosâ Caro, Fungi ad instar, his Ulceribus succrescit, etsi paulò antè Scalpello derafa, eaque interdum ad Magnitudinem enormem.—Non solùm miseris his, at verè utilibus

libus Hominibus, per se infensa est maximè *Scorbutica* Lues, sed & illos etiam omni penè Morbo, qui ab Humorum Corruptione pendet, obnoxios admodum reddit; Febribus nempe putridis, malignis, *petechialibus*, pessimo *Variolarum* Generi, *Dysenteriae* cruentæ, *Hæmorrhagiis*, &c. — multo magis adeo bonis his fuit Exitio quam bellicum Fulmen.

Nova Luna 5° AUGUSTO. *Plena Luna* 19°.

Favente tandem ter optimo Numine effulget Apricitas, exoptata diu; læta hinc Messis, optimæ Segetes. Ventus per Initia Septentrionalis, post undecimum deflexit ad Occidentem, at à vicesimo tertio spiravit rursus ab Arcto ad Finem usque ferè: intervenit sæpe Malacia, Libs raro, Aër verò frequenter nebulosus & humidus: maximæ sæpissimè Rorationes.

Pluvia 8. 14. 15. 16. 18. 24. 25. 26. 30.

Dig. Dec.

31 = 0.846.

Fulgur & Tonitru 24 primo Mane.

§ Altitud. maxim. 28. 30.0. N N E 1. } media 29.7½.
minim. 16. 29.5. S W 3x.

Dies frigid. 27. 36. N 1. } media 30½.
calid. 3. 24. N 1.

Variolæ adhuc *epidemicæ*, quædam parvæ, atræ, malignæ, jam sæpe cum enormi Alvi Fluxu subatro. *Ophthalmiæ* & Dentium Dolores acerbis usque frequentes. Perpauci aliter Morbi.

Lætè jam tandem canunt Cicadæ, reviviscunt demùm Papiliones. Noces avellanæ copiosissimæ.

VOL. II.

M

Nova

Nova Luna 4° SEPTEMBRI. *Plena Luna* 18°.

Atmosphæra fuit admodum humida, imò & interdum algida hoc Mense; Libs sæpe Initio, sæpe Corus, medio Mense Aquilo, qui paulò sicciorem & frigidiorē fecit Aërem, adeò ut xiv & xxi gelaret.

Pluvia $\frac{''}{2.}$ $\frac{'}{4.}$ $\frac{'}{5.}$ $\frac{'}{7.}$ $\frac{'}{9.}$ $\frac{'}{10.}$ $\frac{'}{12.}$ 15. 16. 18.

$\frac{''}{19.}$ $\frac{''}{22-23.}$ $\frac{''}{24.}$ $\frac{''}{26.}$ $\frac{''}{27.}$ $\frac{''}{29.}$ $\frac{''}{30.}$ = 3.178. Dig. Dec.

Procella 5 p. m. S W 4x — 29 p. m. S W b S 4.

§ Altitud. maxim. 14. 30,1. N b E 1. }
 ——— minim. 29. 29,0. S W b S 4. } media 29.6 $\frac{6}{10}$.
 Dies frigid. 21. 54. N b E 2. }
 ——— tepid. 9. 33. W 2. } media 39 $\frac{2}{10}$.

Variolæ, usque grassantur; *Ophthalmiæ* frequentes, ut plurimum humidæ.—Tumores Fau-
 cium, Capitis, Colli cum sævo Dentium Dolore
 innumeros vexant; Destillationes ac Tussēs plu-
 rimæ—Febres miliares compositæ, (nempe ubi
 cum Papulis subalbidis commisceantur Pustulæ
 rubræ) crebræ sunt valdè apud *Totness*, & in
 australi *Devoniâ*.

Nova Luna 3° OCTOBRI. *Plena Luna* 18°.

Frigidus insequitur *October* oriens nimirum
Boreas Die quarto, ad vicesimum tertium usque
 duravit, si decimum nonum excipias; siccus hinc
 Aër, at frigidus ut plurimum, imò interdum Ge-
 lu haud leve; sub Finem prævalebat *Vultur* nus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{28}$.

Dig. Dec. $\frac{1}{22} = 2.238$.

Procella 1. p. m. S W 4—23 ab Horâ 11. a. m. ad 4 p. m. S W 4, etsi Mane acre Gelu Ventusque N E 1—26 a. m. S W 4. Circius vehemens 25 p. m. Fulgura 23 Nocte. AB. 7 NNE 1.

3 Alitud. maxim. 6. 30.4. NE 1. } media 29.8 $\frac{1}{8}$.
minim. 24. 28.8. SSW 3. }

Dies frigid. 23. 64. NE 1. } media 51 $\frac{1}{8}$.
tepid. 1. 42. SW 4x. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed paulò mitiores; Plures etiamnum *Ophthalmiâ* vexantur; per multi acutissimo Dolore Dentium atque Aurium, cum Faucium ac Glandularum Colli Tumore: Tussis vehementissimæ passim, imò haud pauci jam Morbis peripneumonicis & *rheumaticis* laborant.

Nova Luna 2° NOVEMBRI. *Plena Luna* 17°.

Ab ipso Mensis Initio ad xviii aut Boreas flavit, aut Eurus, isque sæpe perfrigidus, Cælum fuit intereà frequenter caliginosum, decedente subindè Pluviâ; post xix interdum turbidus Auf- ter, Septentrio interdum.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{18}$.

$\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{29}$. $\frac{1}{30}$. Nix &
Dig. Dec.

Grando 19. 22 = 3.306.

M 2

Procella

Procella 20 Nocte S 4—21 Mane S 4_x—22
Vesperis N W 4.

— 30 p. m. SSE 4. Nebula densissima
8 Malacia.

§ Altitud. maxim. 4. 30,2. ENE 2_x. } media 29.5 $\frac{2}{3}$.
— minim. 21. 28,6. SSW 3 $\frac{1}{2}$. }

Dies frigid. 7. 68. ENE 2_x. } media 58 $\frac{4}{5}$.
— tepid. 21. 50. }

Variolæ nunc sunt Moris plerumque benigni ;
Tusses *convulsivæ* sævissimæ inter Pueros undi-
quæ, plurimæ admodum & vehementes etiam
inter Adultos cum Tumore Capitis, Colli, Fau-
cium, sæpe & cum acerbo Dentium Dolore.
Ophthalmiæ passim, necnon Anginæ mucosæ :
Multi *Rheumatismo* pertinace atque *Arthritide*
laborant.

Gignit plerumque gelidum humidumque Au-
tumni Cælum Colluviem serosam, quæ nunc ad
Caput Pectusque ruit, nunc ad Artus, frequenter
ad Intestina defluit, unde *Catarrhi*, Tusses, *Rheu-
matismi*, *Arthritis*, *Diarrhæa*, *Dysenteriæ* tunc
Temporis ita sunt communes—Quod si *Æstas*
fuërit calidior solito, subitoque excipitur Frigore,
gravissima sæpe Mala incautis accidunt.

Nova Luna 1°— DECEMBRI. *Nova Luna* 31°.
Plena 16°

Pluit, quod solet, frequenter hoc Mense, Aër
verò fuit crassissimus ac humidus maximè : Libs
ferè perpetuus ad vicesimum secundum, postea
Vulturnus, aut Boreas frigidissimus ad Finem
usque. Densitas *Atmosphæræ* *Barometrum* susti-
nuit ad altam satis Stationem.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{2}{2}$. 3—5. 7—9. $\frac{7}{11}$. $\frac{12}{12}$. $\frac{13}{13}$. 14
 —16. $\frac{1}{17}$. 19. 21. $\frac{1}{24}$. $\frac{26}{26}$. 27 = 2.780. Dig. Dec.
 Gravis Procella 12 Vesperi S W b W 4^x. AB.
 28. H. 7. p. m. E N E 2.
 8 Altitud. maxim. 22. 30,3. N N W 1. } media 29.7 $\frac{2}{3}$.
 — minim. 12. 29,0.
 Dies frigidiff. 31. 76. NE b E 2. } media 56 $\frac{1}{3}$.
 — tepid. 5. 50. S W 2. }

Peripneumoniæ passim, *Ophthalmiæ* plurimæ, Tussis undique, eæque sævissimæ, quibus tamen vexantur maximè Pueri, quos non rarò Distentio etiam Nervorum corripit. Arthritis pertinax ac *Rheumatismus* multos cruciant.

Variolæ adhuc sæviunt plurimùm, multòque magis jam funestæ sunt, confluentes quippe, crudæ, luridæ, aquosæ; quædam diffuunt valdè ac nigrescunt.—Per Salivæ Ductus & Alvi quærit plerumque Natura Morbi Exitum—Urina copiosa *hypostatica* nunquam non juvat—Lenia adeò *Eccoprotica* cum *Diureticis* semper ferè exhibeo declinante Febre: Morbo autem incrementum, seu potius ad Statum procedente, quæ Concoctionem Humororum promovent; qualia sunt *Lap. Contrayerv. Myrrh. Mosch. Mithridat. Theriac. Andromach.* &c.—Nec verum tacere debeo eximias *Ficum* & *Cicerum* Dotes ad *Variolas* maturandas, quas tanti fecerunt *Arabes*; apud quos sanè prima *Variolarum* Historia—Imò & ipsâ Portione *Coffee* hunc ad Finem utor sæpissimè feliciter.

Totius Pluviae Quantitas, Anno MDCCXLVI.
Dig. Dec.
fuit = 31.990.

Plena Luna 15° JANUARIO. Nova Luna 29°.

Incipiente Anno asperrimum Gelu Ventusque borealis, post Diem quintum Vulturius Pluviaque aliqua, mox Libs perpetuus, atque tristis ac uda Tempestas: Aër maximè humidus, Sol ferè nullus, Pluviae plùs satis.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{16}$.
 $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{19}$. 20—21. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. 27. $\frac{1}{28}$. 30.

Dig. Dec.

31. Nix 5. Grando $\frac{1}{20}$ = 4.616.

Procella 15 Nocte S 4. Levis AB. 2 H. 10.
p. m. ENE 2.

§ Altitud. maxim. 1. 30, 2. ENE 3x. } media 29.4.
minim. 16. 28, 8. SSW 3x. }

Dies frigidissim. 1. 78. } media 57.
tepid. 30. 50. S b E 3. }

Multi *Variolis*, plures Febre *catarrhali* laborant; Tussés innumeræ, sæpe vehementes: *Rheumatismi* valdè frequentes, necnon Dentium sævi Dolores cum Tumore Capitis, Colli, Fauciumque.—Tussis *convulsiva* pessima inter Pueros grassatur pluresque strangulat; Sanguinem persæpè expuunt, & haud levis interdum accedit Febris: His Sanguinem mittere necesse est prorsùs, imo aliquando bis, terve, etiam bimulis trimuliseve; accurata deìn instituenda est *Dieta*, blanda porrò Ventrìculi & Intestìnorum Purgatio; quibus peractis

actis Corticis Peruviani Decoctum cum Tussilage & Balsamo Tolutano, uno alterove appposito *Vesicatorio*, Morbum fugat; sed commodum est omninò Respirationem expedire & *Anacatharsin* Solutione Gum. Ammoniac. in Expressione Mil-leped. ex Aq. Hyssopi. Atqui profectò haud pauci exindè in *Rachitidem* incidunt—Scabies per-multos inter Popellum atque Nautas infestat.

Plena Luna 14° FEBRUARIO. *Nova Luna* 28°.

Per Initia Mensis perflavit Notus, intercurrente subinde Coro; Pluvia autem quotidie ad decimum quintum usque, Aërque humidissimus: tunc Boreas siccus & gelidus valdè, sub Finem Vultur-nus velox, ac pluviosus.

Pluvia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	13.	14.	15.	25.	26.	27.	28.				
Dig. Deg.											
=	2.888.										

Procella 5. p. m. W S W 4—8 a. m. S S W 4—13 Nocte S W 4.

Altitud. maxim.	23.	30.2.	E N E 1°.	} media 29.6.
minim.	14.	29.0.	S W 3.	
Dies frigid.	18.	73.	E N E 2.	} media 58 $\frac{5}{8}$.
tepid.	4.	50.	S W b W 2°.	

Variolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ putridæ, *nervosæ*, lentæ: Gravissimi passim *Astb-matis Paroxysmi*, Tussis admodum sævit. Pleu-ritide plures aut *Pleuroperipneumoniâ* corripiuntur, plurimi *Rheumatismo* cruciante: Scabies est perfrequens undiquè.

Colica quædam biliosa jam plurimos torquet, acerbissimus Stomachi Dolor, ac perpetuæ Vomitiones urgent, nunc Alvus est citissima, nunc astricta maximè; ne vel *Cathartici* fortissimis cedens priusquàm Missione Sanguinis, Fotuque emolliente, solvitur nimia Intestinorum Strictura: — hæret sæpissimè in imâ Parte dextri Hypochondrii acutissimus Dolor & pertinax admodum, cujus Causa plerumque est à Stercoribus induratis ad Finem *Ilei* atque *Coli* Principium compactis — vix utiquè lenitur nisi laxante Fomento, & *Clysmate* frequente, quæ Fæces emolliunt: cave verò ne Fomenta sint calida nimium.

Plena Luna 15° MARTIO. *Nova Luna* 29°.

Venit ab Oriente Ventus ab ipso *Martii* Initio ad Diem vigesimum tertium ferè, ad Septentrionem autem vergens plerumque: siccam hoc fecit *Atmosphæram* & frigidam, imò & pulcherrimam sæpe, Libs post, ad Finem Aquilo.

Pluvia 1. 9. 10. 19. 23. 24. 25. 26. 27.
Dig. Dec.

Nix 8. 9. Grando 10. 20 = 1.700.

Procella 26 Noctu SW 4x. AB. 22. H. 9.
p. m. N b E 1.

à 12° ad 18^m ad Solis occasum Nubes pulcherrimæ puniceæ quotidie.

Altitud. maxim. 14. 30.4. ENE 1. } media 29.7⁵/₈.
minim. 20. 28.9. N b E 1x. }
Dies frigid. 8. 65. NNE 1x. } media 58.1²/₃.
tepid. 30. 46. N 1. }

Variola

Variolæ passim; *scabies* ex undiquè:
Asthma grave multos vehementer premit, *Tussis*
sævissima plures.

Haud pauci *Apoplexiâ* *, vel *Hemiplegiâ*, cor-
repti occidunt—Hoc sæpe, notante *Cole de Apo-*
plexiâ, post diu durans *Frigus* accidit, cui suffra-
gatur *Experientia*: An à densato nimium San-
guine? an ab imminutâ *Perspiratione*, retentis
crassioribus? an à magno *Atmosphære* Pondere
totum Corporis Habitum validè premente, unde
plus satis Sanguinis ad Cerebrum ruit, Calvariâ
sustinente. Aëris Pressuram? Tali Tempestate
utiquè cavendum est Hominibus, Capite largo,
Corpore quadrato, Collo breviorè: parcè vivèn-
dum est, leniter purgandum: venienti occurrere
Morbo.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* admodum vul-
gares; Sanguis jam ferè semper densus est val-
dè, ac tenace obductus *Glutine*; *Tussis* effera,
Sputa tamen libera satis & plerumque modico
Sanguine tincta: ubi verò parùm aut nihil ex-
antlatur pessimum; nec melius multò si parva,
rotunda, vel spumosa tantùm. Quæ ex *Ficu*,
Melle, *Oleo*, *Nitro*, *Spermate Ceti* experior per-
quàm commoda, *Potionem* porrò emollientem,
liberalem, qualem præbet *Decoctum pectorale* dic-
tum, aut *Serum Lactis Herbæ Taraxaco* imbutum,
cui inest dissolvendi Lentorem Sanguinis Vis
maxima; præsertim si incoquitur simul *Radici-*

* *Ramazzini* *Apoplexias* recenset inter *Morbos grassantes*
per valdè frigidam & siccam *Atmosphæram*. Vid. *Constitut.*
Epidem. 1691, Sect. 3.

Graminis * plurimum & *Eryngii*—Si vis alia, præstat *Hedera terrestris*, *Tussilago*, *Adiantum*, *Helenium*, *Hyssopus*, *Pulegium*, *Flos Papaveris erratici*.—Utilia hæc fanè sunt & contemnenda neutiquàm, Atavis utiquè Proavisque nostris Medicina indigena.—Sed enim hodiè Homunciones fastidiosi Herbas ab Indis *Theam* scilicet, *Sarsam*, *Cbinam*, *Gingseng*, & nescio quid ultrà expectunt—Ast abitote tandem vos Delicatuli nequioris *Ævi* pessima Progenies.

Plena Luna 14° *APRILI*. *Nova Luna* 28°.

Hoc quoquè Mense Ventus fuit plerumque orientalis, nunc ad Austrum, nunc ad Arctum flectens, Aër interim sæpe tenuis fatis; à xiii autem ad xvii aut Libs, aut Auster maximæque Nebulæ: Malacia xxii.

	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{23}$	$\frac{1}{24}$
Pluvia	5.	8.	13.	14.	16.	17.	18.	23.	24.
	Dig. Dec.								
$\frac{1}{26}$	26.	28	= 3.100.						

Altitud. maxim.	1.	30,2.	E 1.	} media 29.7 $\frac{8}{10}$.
minim.	24.	29,2.	E b N 1.	
Dies frigid.	11.	55.	NE b N 1 $\frac{1}{2}$.	} media 43 $\frac{3}{10}$.
tepid.	31.	36.	SSE 1.	

Paucæ nunc *Variolæ*; Pleuritis & Peripneumonia adhuc frequens admodum, indèque qui-

* Vel ipsi Bubulci Vim Graminis detergentem noscunt, observando enim Stercus bubulum notant Obstructiones, & Crustas penè lapideas cum Stercore excretas, dum recentia Gramina carpunt Boves; qui in Stabulis detenti diu, languidi fuerunt admodum & icterici prorsus.

dam in Pulmonis Vomicam incidunt, unde facti sunt tabidi : hoc his accidit præcipuè, qui parùm aut Nihil expuunt ante Diem quintum, aut septimum *, dein cœnosa, subdulcia, vel foetida. Plurimæ Tusses vehementes *Asthmaticæ*, plures *Phthisici* pereunt.

Febris putrida lenta multum grassatur diuque Ægrotis inhæret; Pectus atque Præcordia vel ab Initio valdè premuntur, adest Tussicula & Faucium Asperitas, Vomitus frequens atque Capitis Dolor.

Plena Luna 13° MAIO. Nova Luna 28°.

Incipiente Mense Ventus borealis, ab octavo ad vicesimum Diem Corus sæpe, sæpiùs Africus, indè Vulturinus ad xxiv, postea Corus rursùm: Aër fuit Initio perficcus.

		/		/		//		//
Pluvia	6.	10.	11.	12.	14.	15.	17.	19. 21.
	//	/	//					
	22.	23.	25.	30.	31	= 2.108.		

Dig. Dec.

} media 29.5 $\frac{1}{2}$.	Altitud. maxim.	7. 30.1.	NNE 1 $\frac{1}{2}$.
	minim.	22. 29.2.	SSE 2 $\frac{1}{2}$.
} media 35 $\frac{1}{2}$.	Dies frigid.	1. 42.	ENE 1 $\frac{1}{2}$.
	calid.	24. 28.	SSE 1.

Principio Mensis Erucae innumeræ, omnia devorantes, jam Pluviis demersæ, perimuntur.

Febris lenta putrida adhuc dum haud paucos invadit. *Ophthalmiæ*, & *Rheumatismi* aliqui; Morbi pulmonares passim: multi *Phthisici*.

* Vid. De Aëre & Morbis Epidemicis, Vol. I. p. 52.

Plena Luna 11° JUNIO. *Nova Luna* 26°.

Humilis fuit *Barometri* *Statio* toto *Junio*, *Pluvia* multa, *Aër* humidus, *Ventus* prorsus inconstans, austrinus tamen prævaluit; interfuit *Boreas* à xvii ad xxii.

Pluvia 1. 3. 4. 5. 6. 9. 11. 14. 16. 24.

Dig. Dec. 25. 26. 27. 28. 29. *Grando* 9 = 3.372.

Fulgur & Tonitru è longinquo 11 *Noctu*.

3 *Altitud. maxim.* 21. 29. 9. NNE 1^x. } *media* 29.4²⁵.
minim. 25. 29. 1. SW b W 2. }
Dies frigid. 1. 4². N 1. } *media* 32²³.
calid. 12. 24. S 1. }

Febris pulmonaria jam non ita frequens est, *Tussi* autem & *Rheumatismo* plures vexantur; *pluviosa hæc & infausta Tempestas* nocet plurimum *Tabidis*.

Febris putrida lenta * huc usque multum sævit, atque haud paucis funesta est—Dolet *Initio* *Sinciput*, *Occiput*, *Dorsum*, mox *Præcordia*; adestque foedus & amarus in *Ore Sapor*, *Nausea*, *Vomitio*, *Lingua* valdè squalida, tandemque nigra est prorsus, accedit porro sæpe *Singultus*; *Statu Morbi*, *Die sexto*, vel *septimo* putà, ferè semper delirant, paulòque post interdum *veter-nosi succumbunt*; rarò absunt *Tremores & Tendinum Subfultus*—*Urina* nunc crassa, parca, ru-

* Rectius hanc *Febrem* dixerim biliosam, seu *mesentericam*; nam etsi diu admodum plerumque trahit *Ægrotantes*, *Bilis acris & abundantis* valdè prodit *Indicia*.

bra, vel subnigra est, nunc cruda valdè & aquo-
sa : sæpe flavescit Cutis, sæpius Oculi Album-
tumor admodum aliquando & indurescit Abdo-
men ; hoc in Casu, sive Arte, sive Sponte fluit
Alvus Ægrotantibus Levamento est ; biliosa
namque multa & interdum atra prorsus desici-
untur—hòc verò his præcipue accessit, quibus
per Initia nullum exhibitum fuit *Emeticum*, quod
certissimè hæc Febris desiderat—quid quòd post
Vomitum plerumque erumpit Sudor largus, æ-
qualis, ingens cum Pustulis Prurigo, recedente
ut plurimum Morbo ; idque maximè si libere de-
scendit Venter, paulòque post turbida, multa,
fulva, subsidens Urina. Profectò hanc Febrem
abigit interdum Sudor, interdum Alvi Fluxus :
utrum poscit, his Notis utor ; si Pruritus urget
& in Cute quasi Morsus, potissimum si Papulæ
apparent, moderatis *Diaphoreticis* pugno ; si Ruc-
tus, si Flatus, si Abdominis Tumor, leni *Cathar-
tico*.—*Pulv. Contrayerv. C. Julep. Camphorat. cum
Aceto, Theriacæ Andromach.* pauxillum ad Sudo-
res eliciendos conferunt ; ad Alvum movendam
*Rhabarbar. Mann. Sal. Mirab. Glauber. Crem.
Tart.*—Omnia ex *Aloe* nocent—interea verò sive
per Alvum, sive per Cutim, moveo, multam
diluentem demulcentem Potionem præcipio, cui
admisceo insuper ad Urinam ciendam aliquid,
Sp. Nitri dulc. scilicet, *Sal. Succin. Nitrum, &c.*
—vix sanè certius Signum Salutis occurrit quàm
plurima, lutea, *hypostatica* Urina, Die nempe
undecimo, aut decimo quarto.

Plena

Plena Luna 10° JULIO. Nova Luna 26°.

Die *Julii* quinto cessere Pluvia, multoque lætior successit Tempestas, & Sol fervidus valdè, fiante Coro primùm, dein Euro, mox Boreâ intercurrente, etiam subindè Malacia: Sub Finem Ventus aquilonius dominabat.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. 5. $\frac{1}{2}$. 16. 28. $\frac{1}{2}$. 29 = 1.142. Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 21. 29,9. ENE 2x. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
minim. 3. 29,2. SW 3. }

Dies frigid. 4. 34. WNW 2x. } media 24.
— fervidiff. 18. 13. ENE 1. }

Febres aliquæ putridæ lentæque adhuc: quædam Peripneumoniæ, præcipuè nothæ; *Rheumatismi* passim, & *Ophthalmiæ* humidæ plurimæ — Ex quo autem pulchra calidaque Tempestas eluxit, paucissimi, ut solet, apparent Morbi hoc Anni Tempore, modò nempe Cælum sit apicum*.

Plena Luna 9° AUGUSTO. Nova Luna 24°.

Parùm elata fuit *Barometri* Statio hoc Mense, *Atmosphæra* autem perficca & fervida maximè; afflavit Eurus sæpissimè, Boreas frequenter, Corus sæpe, Libs rarissimè.

Pluvia 2. 3. $\frac{1}{2}$. 15. 16. 17. 25. 28 = 0.564. Dig. Dec.

Maximæ Rorationes creberrimè: Fulgur & Tonitru è longinquo 25.

* *Hippocr.* Aphorism. 15. Sect. 3.

Infinitæ Muscæ, Vespæ, & Papilliones omni-
geni, Erucarum Vis immensa, Cicadæ undiquè
lætissimè garriunt. Omnes Rivuli & omnes ferè
Putei arescunt ob Æstum enormem.

§ Altitud. maxim. 30. 29.9. NNE 1. } media 29.6.
— minim. 15. 29.2. WbS 2. }
Dies frigid. 16. 30. NW 2. } media 21 $\frac{1}{4}$.
— fervidiss. 23. 12. NNE 1. }

Pauci jam Morbi, plures attamen *Diarrhæa*
corripuntur, imò & sæpe valdè profusâ : per-
plurimos *Ophthalmia* aut Lippitudo vexat. Ex
Ore aliqui, quidam ex Naribus, plures ab *Hæ-*
morrhoidalibus Venis fundunt Sanguinem : Mu-
lieres largissimè Menstrua profundunt : totum
hoc à rarefacto admodum Sanguine.

Plena Luna 7° SEPTEMBRI. Nova Luna 23°.

Per hunc Mensē Ventus fuit plerumque ab
Occidente, nunc ad Austrum, nunc ad Septen-
trionem tendens : Aquilo etiam aliquando inter-
venit : Aër sæpe ficcus & tenuis, sæpe autem ne-
bulosus ; Initio quidem calidus.

Pluvia $\frac{''}{5}$. $\frac{'}{6}$. 7. 10. 12. $\frac{'}{14}$. $\frac{'''}{15}$. $\frac{'}{16}$. $\frac{'}{17}$. 20.
Dig. Dec.
 $\frac{''}{21}$. $\frac{''}{25}$. $\frac{''}{27}$. 28. 30 = 2.516.

Immensæ sæpe Rorationes, imò interdum
Pruinæ.

§ Altitud. maxim. 24. 30.1. N b E 1. } media 29.5 $\frac{6}{10}$.
— minim. 16. 29.0. W 1 $\frac{1}{2}$. }
Dies frigid. 19. 46. NNW 1 $\frac{1}{2}$. } media 38 $\frac{9}{10}$.
— calid. 4. 24. Malacia. }

Febris

Febris putrida lenta passim, cui jam accedit frequenter Icterus, & magnus Virium Languor, interdum Tumor Abdominis atque Pedum. Alvus torminosa per plurimos ubique infestat, Cholera sævissima multos, plures autem *Dysenteria* mucosa ac biliosa, imò & aliquando cruenta, Febre haud rarò comitante; sub finem crebrò erumpunt Pustulæ mordentes per universum fere Corpus.—Ad eò penè in omnibus dominari videtur acris & biliosa Colluvies, quæ plerumque per Alvum sælicissimè deijcitur: perpaucis nunc profectò Alvi Fluxus Exitio est, quam sæpe diu admodum durat, modò diluitur probè & temperatur Acrimonia, atque blandè dein expurgatur Saburra Intestinorum. Atqui alibi, præcipuè apud *Bristolienses* & *Bathonienses*, multò magis fuit funesta *Dysenteria*.

Post fervidam Æstatem constanter ferè sequuntur Cholerae, *Dysenteria*, Alvi Fluxus; perdurante enim longo ac intenso Solis Ardore torretur Sanguis, exaltatur Bilis*, magis acres fiunt indies Animalium Sales (ipsam Viperæ Virus longè longèque magis veneficum est per Calores æstivos, quàm dum omnia torpent Hyeme frigidâ.) Quandoquidem verò huic succedit frigidus humidusque Autumnus, constipatâ Cute, ad interiora ruunt acres Humores, multos ideo gignit atque varios Mörbos, quos inter suprà descriptos—cave igitur ne præposterè sistas eorum Exitum per Vias Cuti vicarias; maximus nempe Consensus Cutim inter & Intestina datur certissimè.

* Ideò Hippocrat. τὸ Θίγος χολεποιοῦ vocat, Lib. de Humorib. Sect. 8. Edit. Linden.

Monstrat aliquatenus ideò, quod dixi suprà, Viam, quâ in Morbis autumnalibus curandis incedendum est: vernæ quippe Febres plus Sanguinis Missionem poscunt; autumnales verò magis leni *Catharsi* levantur—Magnus profectò ad diuturnus Æstatis Calor non tantum Vim Fibrarum enervat, sed & Sanguinis Compagem laxat nimis, Sales autem reddit acriores atque Olea animalia rancida: Verbo, Vasa facit debilia, Humores acres, Bilem abundantem & corruptam—adeoque magnus Medicinæ Parens dixit τοῦ δὲ Θέρεος—ἡ χολὴ αἰεῖσθαι ἐν τῷ Σώματι, jungit ἡ δὲ χολὴ τὴν Θερμὴν κατέχει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Φθινόπωρον, & paulò infrà ἡ δὲ μέλαινα χολὴ τοῦ Φθινοπώρου πλείσῃ τε καὶ ἰσχυροτάτῃ ἐστίν, Lib. de Natur. Homin. Sect. 14. Edit. *Lindeni*. Ubi verò acris & biliosa Coluviës exundat, aut per Vomitus, aut per Alvum, rectissimè expurganda est; nam hujus præcipua Sedes est in primis Viis, Visceribus Abdominis, ac Vasis *meseraicis*. Fateor equidem quòd & tota Sanguinis Massa hæc quoque scatet sæpissimè, sed ne sic quidem indicatur Venæ Sectio, quæ nimiam Sanguinis Quantitatem utiquè minuere potest, Acrimoniam ejus corrigere non potest: Quod cum ita sit, detrahendo cum Sanguine Vi-res, non Acrimoniam, officit. Ideoque *Hippocrates* * Veteresque Medici, ubi Bilis abundat, Acrimonia scilicet biliosa, Sanguinis Missionem prohibent: nec video Ego utiquè cui Bono, hoc in Casu mittitur, nisi adsit *Pletbora* aut Inflammatio vehemens: turpissimos sanè Errores atque immedicabiles hac in Re vidi; imò & plus Vice simplice perdolui.

* Lib. de Humoribus, ad Finem.

Plena Luna 7° OCTOBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem *Barometer* toto fere *Octobri*, flante sæpissimè Boreâ, vel Coro; Libs tamen interdum, nonnunquam Euro-notus spiravit; *Atmosphæra* fuit multò humidior, at plerumque satis tepida.

Pluvia 1—3. 4. 10. 14. 16. 26. 27. 28.

„ Dig. Dec.

29. 31 = 1.596.

Levis *Procella* 4. S W 4x—31. p. m. S W 4x
Maximæ *Pruinæ* medio Mense.

§ Altitud. maxim. 6. 30.3. ENE 1. } media 29.9 $\frac{1}{2}$.
minim. 29. 29.5. SW b W 3. }

Dies frigid. 20. 54. ENE 1. } media 46 $\frac{1}{3}$.
tepid. 1. 38. WSW 1. }

Rheumatismus passim; *Febres* putridæ frequentes, quibus haud rarò, sub Finem, accedit *Icterus*—*Coryzæ* atque *Dentium Dolores* multos vexant, *Tussés* sævæ plures—*Alvi Fluxus* creber adhuc, *Dysenteria* tamen rarior—*Variolæ* jam derepentè factæ sunt *epidemicæ*, cæque quidem malè moratæ & sæpe lethales; quippè quæ parvæ & nigræ, aut crûdo prorsùs diffuentes *Ictore* ad Finem usque; sæpe cum ipsis *Variolis* erumpunt *Petechiæ*, quod pessimum: Interdum *Cutis* sub *Vesiculis* aquosis *Necrosi* afficitur.

Plena Luna 6° NOVEMBRI. Nova Luna 21°.

Densa fuit admodùm ac humida *Atmosphæra* hoc Mense, quæ *Mercurium baroscopicum* in alto susti-

sustinuit Loco, etsi multò rarior erat ab Oriente Ventus quam *Octobri* elapso: Corus quidem aderat sæpe, sed & Libs haud rarò—Ad ipsum Finem, gravis ab Austro Procella *Barometrum* deturbat maximè.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 9—11. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{16}$. 17. 18. $\frac{1}{20}$. 22.

23. 24. 27. 29. 30. Dig. Dec. Grando 16 = 2.078.

Procella 16 Nocte—20 p. m. S W 4—29. p. m. S S W 4^r.

Magna AB. 21. H. 9. p. m. N W 1^r.

§ Altitud. maxim. 4. 30.3. N 1. } media 29.9.
minim. 30. 28.6. S W 3. }

Dies frigid. 25. 62. N b E 1. } media 50 $\frac{6}{8}$.
tepid: 10. 42. S W b W 2^r. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed jam majore ex Parte paulò mitiores, sæpissimè tamen Fluxus Salivæ prælargus profluit, etiam in Distinctis.

Diarrhæa serosa plures adhuc exercet—*Catarrhi* & *Rheumatismi* plurimi, necnon Tusses acerbæ—Morbi Pulmonum acuti haud pauci.

Plena Luna 5° DECEMBRI. Nova Luna 20°.

En tandem corruunt Vapores, per *Atmosphæram* congesti diu, delabente plurimum *Baroscopio*: per Initia Mensis Vulturius perflavit, dein Libs furens, intercurrente subindè Cauro.—Duravit pluviosa hæc & misera Tempestas ad xxi usque; tunc venit ab Oriente Ventus, qui ad Septentrionem vergens rigidam valdè Brumam intulit, & *Barometrum* erexit maximè.

Pluvia $\frac{///}{1.}$ $\frac{//}{3.}$ $\frac{1}{4.}$ $\frac{///}{5.}$ 7. 8. $\frac{///}{9.}$ $\frac{//}{10.}$ $\frac{///}{11.}$ $\frac{//}{12.}$ $\frac{//}{13.}$
 $\frac{//}{14.}$ $\frac{1}{15.}$ $\frac{///}{17.}$ $\frac{1}{18.}$ $\frac{1}{19.}$ 20. 24. Nix 2 = 6.566.
 Dig. Dec.

Maxima Diluvia medio Mense. *Atmosphæra* fuit densissima & longè humidissima ante xxiv : Crassissimæ & valdè foetidæ Nebulæ à xx ad xxii.

Procella 2. E S E 4_x—9 Nocte S W 4—10 S W 4—11 Vesperi & Nocte S W 4_x—14 W S W 4. Amplissimus Halo circa Lunam 3. Maxima lucida, ignea, punicea AB. 6. H. 8. N E 1_x.

§ Altitud. maxim. 31. 30,5. NE 2_x. } media 29.43_o.
 ——— minim. 11. 28,4. SW 4_x. }
 Dies frigid. 31. 73. NE 2_x. } media 56₃_o.
 — tepid. 5. 46. Malacia. }

Variolæ jam sunt magis benignæ, licèt adhuc *epidemicæ* ; atqui etiam in Distinctis profusus est admodùm Salivæ Cursus ; porrò frequenter etiam Maculæ quædam rubræ sed Coloris vividi, erumpentibus *Variolis* intersunt, quæ brevì plerumque vanescunt.

Pleuritides & Peripneumonix haud raræ, sæpe nothæ ; Tussēs & *Catarrhi* plurimi : Alvi Fluxus usque creberrimus—Vides sanè, in omnibus ferè Morbis, Colluviem ferosam adhuc dominantem.

Dig. Dec.

Tota Pluvia Anno MDCCXLVII = 32.246.

Plena Luna 4° JANUARIO. Nova Luna 19°.

Præalta fuit hoc Mense *Barometri* Statio, Ventus ut plurimum ab Oriente, multùm per Initia flectens ad Septentrionem ; à xix autem plerumque

que ad Austrum, Aër sæpe crassus erat, interdum nebulosus, semper frigidus.—Gelu valdè rigidum ineunte Anno.

Pluvia 5. 8. 9. 11. 14. 15. 17. 21. 23.
Dig. Dec.
26. 27. 28. 30. Nix 7. = 1.718.

Levis AB. 22. H. 9. p. m. N N W 1. Procella 27 Nocte S E b S 4x.

Nebula densissima, ac foetida admodum, diu durans 31.

Altitud. maxim. 1. 30,5. E N E 2. } media 29,9 $\frac{2}{3}$.
minim. 28. 29,3. S E b S 3 $\frac{2}{3}$. }
Dies frigid. 2. 74. E N E 2. } media 62.
tepid. 30. 53. S S E 2. }

Ut solet ferè semper, sic quoquè nunc, Tusses movet Boreas & Laterum Dolores; * idque sane jam vehementer, Pleuritides nempe, Peripneumoniæ, atque Tusses gravissimæ, modò sunt valdè frequentes: multos porrò premit Asthma sævissimum & contumax; parcè nimis plerumque in his Morbis expuitur, quanquam Distillationes profusæ, Coryzæ †, Anginæ mucosæ, Raucedines atque Faucium Tumores perplurimos vexant; crasso nimirum ac perfrigido Aëre Cutis Meatus occludente, unde serosa Colluvies accumulatur. *Rheumatismi* plurimi.—*Variolæ* undiquè jam *epidemicæ*, nec profectò ita clementes.

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 171. †—*Cels.* Lib. 4. C. 4.

Plena Luna 3° FEBRUARIO. Nova Luna 17°.

Perfrigida jam regnat Tempestas & sicca valdè, Boreâ sæpissimè perflante, hinc Gelu asperrimum, & tenuis admodùm Aër, at Pluviæ parùm; Nix autem & Grando nonnunquam: *Baroscopium* plerumque sublime.

Pluvia 21. 23. 28. Nix 16. 24. Grando
Dig. Dec.

21. 29. = 0.598.

Acre Gelu 12. 15. 16. 19. 25. 26. Den-
fissimæ foetidæ Nebulæ 9. 10. 12.

§ Altitqd. maxim. 9. 30,3. NE 1. } media 29.8 $\frac{1}{2}$.
—— minim. 23. 29,2. S W 2. }

Dies frigidissim. 16. 77. NE b E 2 $\frac{1}{2}$. } media 64 $\frac{1}{2}$.
—— tepid. 29. 58. W N W 2. }

Variole longè latèque sunt *epidemicæ*, passim funestæ, parvæ, atræ; jam nunc *Salivatio* est parciore debito, ut ut nuperis Mensibus perfusa nimis.—Febriculæ *Catarrhales* valdè frequentes, necnon Tussis sævissimæ; gravissimi Asthmatis *Paroxysmi* & diu gravantes—Tempestas est exitialis admodùm Pulmonariis, moriuntur plurimi, Pleuritides & Peripneumonix perplurimæ, crassa perquam ac glutinosa sunt Sputamina sæpe, interdum tenuia valdè, horum neutra faciliè ejiciuntur, licèt Tussis plus satis urget; imò rupto nonnunquam Pulmone purus purus Sanguis expuitur. Utcunque viscida nunc sunt in Peripneumoniacis Sputa, Cruorem extractum multò minus tenacem sæpe sæpiùs notavi.—Post Pleuritides aliquando maximè pertinaces Laterum Dolores

Dolores cruciant, qui multò meliùs Emplastris *Anodynis* aut *Epispasticis* cedunt quàm Sanguinis Missioni, quantumcunque fuerat necessaria Morbi Initio. *Odontalgia* acerbissimæ & *Rheumatismi* permultos laceffunt.

Plena Luna 4° MARTIO. Nova Luna 18°.

Algida Tempestas toto ferè Martio, Pluviæ abundantes, Procellæ interdum: Medio Mense autem Gelu, Nix, Grando, Ventus aquilonius, Aër siccus valdè & frigidus; sub Finem verò erat multò tepidior, ac humidior longè.

Pluvia $\frac{///}{2.}$ $\frac{//}{3.}$ $\frac{//}{4.}$ $\frac{//}{6.}$ $\frac{//}{7.}$ $\frac{//}{8.}$ $\frac{//}{10.}$ $\frac{///}{11.}$ $\frac{///}{21.}$ $\frac{///}{24.}$

$\frac{//}{25.}$ $\frac{//}{26.}$ $\frac{//}{27.}$ $\frac{//}{28.}$ $\frac{//}{29.}$ $\frac{///}{31.}$ Grando 8. 12. 15.
Dig. Dec.

Nix 12. 13. 14. 18 = 4.280.

Procella 2. Nocte W S W 4. — 25 a. m. S.
W 4. — 27 à primo Mane ad H. 10. a. m. S
W b W 4.

Altitud. maxim. 20. 30, 1. NE 1. } media 29.7.
minim. 27. 29, 0. S W b W 4. }

Dies frigid. 15. 73. E N E 2^x. } media 58 $\frac{2}{3}$.
— tepid. 29. 50. W S W 2. }

Variolæ adhuc, sed multò pauciores, & minùs periculosæ: *Pleuritides* & *Peripneumonix* frequentes; jam faciliùs expuitur, sæpe coctum, & aliquo Sanguine tinctum, sæpe tamen perliquidem & acre. Tusses innumeræ & plerumque vehementes; Labe idè Pulmonum affectis Tempestas est infensa maximè, & haud rarò funesta: gravissimi *Asthmatis Paroxyfmi* — *Rheu-*

matismi multi—Haud pauci *Apoplexiâ* & *Paralyfi* perculsi sunt; quod quidem per frigidas valde Tempestates accidit frequenter*: notavit etiam magnus *Hippocrates Paraplegias* fuisse *epidemicas* asperâ durante Hyeme†, Lib. 1. epidem. Constit. 3. quod quoque memoravit *Cole* in Lib. de *Apoplexiâ*.

Plena Luna 2° APRILI. *Nova Luna* 16°.

Ad decimum nonum *Aprilis* frigida fuit *Atmosphæra*, flante ut plurimum Vento Orientem inter & Arctum; Gelu interdum, aliquando Nix; post vicesimum Libs prævalebat subsidente Baroscópio.

Pluvia $\frac{''}{1}$. 7. $\frac{'}{10}$. $\frac{'''}{12}$. $\frac{''}{17}$. $\frac{'}{19}$. 20. $\frac{''}{25}$. 26.
Dig. Dec.
27. $\frac{''}{28}$. $\frac{''}{29}$. $\frac{'}{30}$. Nix 1. 11. 15 = 3.080.

Haud leve Gelu 18, maximæ sæpe hoc Mense Pruinæ; Nix super Montes permansit ad xxiv usque.

Levis Procella 11 Nocte E b S 4. — quàm maximus Halo subluteus, at vividus, circa Lunam 22. H. 10. S W 2.

3. Altitud. maxim. 9. 30.2 N 1. } media 29.537.
minim. 28. 29.0. S W 3. }
Dies frigid. 3. 64. E b N 1. } media 50.15.
— tepid. 26. 40. S W b S 2. }

* Vid. quæ supra dixi Mense *Martio*, 1747. † Sic describitur χειμὸν βόριος, αὐχοί, ψυχρὰ πνεύματα, μεγάλαί χιόνες, ἐπὶ δὲ ἡμερῇ χειμῶνις μέγιστοι.—παραπληγίαι πολλῶν ἐγίναντο, καὶ τινες αὐτῶν ἰθυσαν διὰ ταχέως.

Perpaucae jam *Variolæ*, at Morbi adhuc Pectoris acuti frequentes, Sputa tamen largissima nunc ex facili prodeunt maximo cum Levamine. Tussēs humidæ innumeræ, ac sæpe vehementes: Tabidi plurimi occidunt, Sævitiâ Tussis, Alvi Fluxu, aut Sudoribus, penitus confecti.—Febres aliquæ putridæ, necnon intermittentes, sed Rure potissimum. Multi *Rheumatismo* cruciante diutissimè torquentur; vix utiquè sine magno Sanguinis Dispendio levantur, qui profectò haud parùm est viscidus.—Haud rarò etiam ipsa Venæ Sectio ter, quaterve, repetita incassum tentatur, nec cedunt Dolores acerbi nisi *Deobstruentibus*, *Diaphoreticis*, *Purgantibus*, & *Anodynis*, tandemque aliquando fugantur solum Balneo frigido.

Cæterùm hic annotabo obiter, quòd, dum ab acri & ferosâ Colluvie pendeat *Rheumatismus*, multò magis obest, quàm prodest, larga Sanguinis Detractio; id ipsum notante *Sydenhamo*: * in hoc etenim Casu certè, quæ blandè Sudores movent, quæ acres edulcorant Humores, eosque expurgant commodè, interposito subindè papaverreo Doloris Lenimine, longè feliciores edunt Effectus.—Usum sum profectò sequentibus, multos per Annos satè feliciter.

Tertiâ, vel quartâ, quâque Nocte *Calomelan*. Grana aliquot cum *Pilul. Mathæi*, seu *Saponaceis* exhibeo, Mane autem proximo *Cathartica* leniora, omnia dein sub Noctem compesco *Anodynis*—est & etiam ubi per Initia Morbi Vomitus excito.

* Epistol. I. responsoria ad Drem Brady.

Diebus attamen intermediis suadeo sequentia, aut his similia & Pulp. Prunor. dulc. Æthiop. miner. aa ʒvi Gum. Guiac. ʒii Cremor. Tartari. Nuc. Myristic. Pulv. à ʒiii Syrup. Croci. q. f. m. f. Elect. Cujus cap. Q. N. Moschat. seu Juglandis, bis saltem de Die cum Haustu largiore Aq. Calcis, in quâ rasum Lignum *Guaiacum* & *Sassafras* sint infusa; cui adjicio insuper Aq. *Ab-sinth.* C. aliquid cum *Elix. pargoric.* & *Essent. Antimon.* aa ʒls, vel ʒi—(*Aquam Calcis* verò præparatam esse vellem *Testis Ostrear.* aut *Cochlear.* probè *calcinat.*) nam & magis dulcem hanc & magis efficacem judico—Victu interim ex mediâ Materiâ utendum est, pro Potu autem Sero. Lactis tenuissimo Sinapi imbuto, infuso Lign. *Sassafr.* ex Aq. bulliente, Aquis demùm *Pyrmontanis*, *Spadanis*, aut *Scarburienf.*—Locis atqui pertinaciter dolentibus idonea admoveo Fomenta, mox deîn *Vesicatoria*.

Sed quid ego hæc tantò Molimine cum quilibet *Medicaster* triobolaris verbosis Populo Strophis * *Antirbeumatica* venditet fallere nescia?

Plena Luna 2°

Nova Luna 16°

MAIO,

Plena Luna 31°.

Ineunte & exeunte hoc Mense Pluvia haud parca, Ventus australis, Aërque crassus, medio autem tenuis valdè: per totum equidem blanda fuit satis Tempestas: maximæ interdum Rorationes.

* Quorum Stultitia Quæstus Impudentiæ est. *Phædr.* L. 1. Fab. 14.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{11}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6. 7. $\frac{11}{10}$. 11. 22. 25. $\frac{1}{26}$,
 $\frac{11}{28}$. $\frac{11}{29}$. Dig. Dec.
 28. 29. 31 = 2.250.

§ Altitud. maxim. 14. 30, 2. N 1. } media 29.6 $\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 2. 29, 2. SS W 2. }

Dies frigid. 8. 44. W N W 2. } media 35 $\frac{2}{3}$.
 ——— calid, 20. 28. N 1 $\frac{1}{2}$.

Variolæ passim; *Pleuritis* & *Peripneumonia* frequens, *Rheumatismi* levi cum Febre, at sævo admodum Dolore plures discruciant: non solum ipso Initio Venæ Sectionem poscunt largiorem, sed & multa porrò post *Diluentia*, *Cathartica antiphlogistica*, necnon *Anodyna* liberalia, inter quæ commodissimum est *Elixir paregoricum*; quod & salubres movet Sudores, lenitque Dolorem, ex Sero Lactis tenuissimo datum: inservit hoc Serum insuper utilissimè pro Potu communi; diuque haustum, ac copiosè, ipsum tandem solvit Morbum, præcipue si *Nitri* aliquid sit adjectum — Opportuna sanè, & repetita, Sanguinis Missio æquè *Rheumatismo* calido, in junioribus & robustis, medetur, ac ipsi *Pleuritidi*.

Febres putridæ passim, vix jam video Intermittentem. Tussis plurimæ, & *Coryzæ* lacres admodum cum Tumore Faucium, Labiorum, Oculorum, &c; adeò falsus destillat Humor, qui non tantum vellicat, sed etiam, sit Venia Verbo, *vesicat* Nares, atque in Pulmonem irruens sævissimam excitat Tussim, ipsamque *Tracheæ* Membranam erodit: multi hinc *Phtisici* certè ad Plures abeunt.

Nova

Nova Luna 14° JUNIO. *Plena Luna* 29°.

Incipiente *Junio* Aër valdè crassus, frigidus, & humidus; post Diem decimum septimum verò fervida admodum & suda Tempestas.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$. 4—6. $\frac{1}{8}$. 10. 12. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{15}$. 29.
Dig. Dec.

= 1.102.

Dies fervidissim. 20. 21. 22. 24. 26. 27.

Altitud. maxim. 17. 29,9. N N W 1. } media 29,6 $\frac{2}{3}$.
minim. 29. 29,3. S b E 2. }
Dies frigid. 4. 40. W N W 2. }
fervidissim. 27. 15. S b E 2 $\frac{1}{2}$. } media 28 $\frac{2}{3}$.

Variolæ sparsæ; aliquæ putridæ & lentæ Febres. Tabes pulmonaria ubiquè frequens est, haud pauci pereunt—Vox rauca, Tussis clangosa, Sputa viridia cœnosa, purulenta, graveolentia, Dorsi Dolor, ac Debilitas, Sudores profusi, atque Alvi Fluxus, subindè se excipientes, accedente Crurum Pedumque Tumore, cum ingrato quodam in Pectore Sibilo, & Spiritu difficili, haud dubia fuere imminentis Lethi Præfagia; ruptâ interdum in Pulmone Vomicâ.

Salubris Aura Ruris, Equitatio quotidiana, bene curata è Lacte Diæta, & Potio lenis demulcens, *Emulsio* scilicet *Amygdalina* ex *Decocto Rad. Eryng. condit.* & id Genus alia, multò magis tabidis his proficere videntur, quam operosa Medicamentorum Farrago, quæ semper imbecillo Stomacho nocet; *Opiatis* autem idoneis compefcenda est subindè Tussis Vehementia, sistenda porro est Alvus, si cita nimis, reprimendi etiam sunt

1748.] & Morbis Epidemicis. 189

sunt profusi Sudores : cave autem semper, ex divini Senis Consilio, ne noceas si non possis opitulari *.

Nova Luna 14° JULIO. *Plena Luna* 28°.

Julii Initio sicca fuit & calida Tempestas, varia pōst, & multò frigidior, Pluviæ frequentes, Ventus inconstans, ab Austro sæpius ; factus hinc Aër est humidus atque crassius : sub Finem Apertitas, Æstusque haud levis, Corus mollis.

Pluvia 1. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13—15. 19.

//// // / /// Dig. Dec.

23. 24. 25. 31 = 4. 134.

Fulgur, cum Tonitru, gravissimum, ac im-
mensis Pluviis 23. 24. 31. Procella 24. p. m.
S W 4.

8 Altitud. maxim. 28. 29. 9. N W 1. } media 29.4 $\frac{3}{4}$.
minim. 24. 29. 0.

Dies frigid. 25. 38. W S W 32. } media 29 $\frac{1}{2}$.
fervid. 30. 16. N W 1.

Variolæ passim, ut plurimum blandæ satîs ; quædam tamen Furunculis, Carbunculis, & diris Ulceribus stipatæ. Febres aliquæ putridæ ; Colica biliosa frequens.

Nova Luna 13° AUGUSTO. *Plena Luna* 27°.

Haud parùm torruit Messes hoc Mense Canicula, maximæ tamen subindè Rorationes, medio autem *Augusto* Pluviæ satîs ; Aër indè crassus

* *Hippocras*. Epidem. Lib. 1. Constitut. 2. sub Finem.
tum

tum valdè & humidus : à quarto ad decimum quartum Ventus subsolanus, ad Finem dein usque varius.

Pluvia 2. 4. $\frac{1}{14}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{11}{16}$. $\frac{11}{17}$. 18—20, $\frac{1}{31}$
 | Dig. Dec.
 = 1.256.

Fulgura perplurima 12, gravis Procella 15 E SE 4, sævum Fulgur cum Tonitru 31 ad Occidentem. Maxima AB. 28. H. 8 p. m. E N E 2, Trabes rutilæ, vividæ, plurimæ, ab ipso Horizonte, ad Angulos penè rectos, per lucidissimam quasi Iridem jaculatæ sunt, More velut ex Arcu Sagittæ.

§ Altitud. maxim. 7. 30,0. E 2. } media 29.6 $\frac{20}{27}$.
 ——— minim. 15. 29,2. }
 Dies frigid. 19. 36. W N W 1 $\frac{1}{2}$. } media 28 $\frac{2}{27}$.
 ——— fervid. 5. 20. E b S 2. }

Variolæ sparsæ, sed parùm funestæ ; his tamen exarescentibus Furunculi plurimi, valdè dolentes, tandemque suppurantes, sæpe sæpiùs erumpunt : *Choleræ*, ac *Dysenteriæ*, haud raræ. *Ophthalmiæ* aliquæ, & *Faucium Tumores*.

Pleuriperipneumoniæ passim inter Agricolas sæviunt, à frigidâ frequenter Potione, ac Aurâ, dum Sudoribus inter Opera diffuunt : grata sanè utraque, sed periculosa valdè : Ratione adeò semper obsecundandum est Naturæ Incitamentis.

Nova Luna 11^o SEPTEMBRI. *Plena Luna* 25^o.

Perficcus atque tepidus fuit hic Mensis, *Atmosphæra* tamen plerumque valdè crassa, Ventus incon-

constans, at lenis ; Boreas per Initia, ac Sol fervidus, sub Finem Libs : plurimus sæpissimè Ros.

Pluvia $\frac{11}{7}$ $\frac{1}{11}$ 12. 13. 16. 19. 20. 21. 24.
Dig. Dec.
27—29 = 0914.

☿ Altitud. maxim. 3. 30,1. ENE 1. } media 29.7 $\frac{1}{2}$.
minim. 8. 29,2. ESE 2. }
Dies frigid. 31. 44. SW 3. } media 34.
— calid. 1. 28. WNW 1. }

Variolæ adhuc, ut plurimum benignæ, Pustulis tamen ulcerosis, & Furunculis, usque stipatæ ; sub Morbi Finem nempe ; accedunt sæpe sævæ *Ophthalmiæ*, ac cruciantes Artuum Dolores, nisi maturè & probè purgantur.—*Diarrhææ*, & *Dysenteria*, per plurimos exercent ; rarò tamen cruentus est Alvi Fluxus, nihilominus autem aliquando lethalis, obrepente Singultu, & perpetuâ desidendi Cupiditate ; quod nihil levat æquè ac Clyster noster *anodynus* *, qui, & *Diarrhæam* quoquè profusam, irritis aliis omnibus, sæpe felicissimè sistit.

Nova Luna 11° OCTOBRI. *Plena Luna* 25°.

Sicca duravit Tempestas, cum altâ Barometri Statione, ad Diem usque decimum *Octobris*, addè ut, per Initia Mensis, Putei atque Rivuli plures defecerint prorsus ; post autem imbrica valdè & multò gelidior ; Aquilo prævaluit ad decimum octavum, indè verò Libs.

* Vid. supra Mens. April. 1743.

Pluvia $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. 13—16. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{19}$. 20.
 $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$ —26. $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{28}$. $\frac{1}{29}$. $\frac{1}{30}$. Gran-
 Dig. Dec.

do 10. Nix 11 = 3.696.

Gelu 3. 12. 13. Fulgur & Tonitru 29 Nocte : Procella 30 Nocte, ac Mane 31 S W b W
 4—Maximæ Pruinæ Mensis Initio.

§ Altitud. maxim. 2. 30,3. NE 1. } media 29.6 $\frac{4}{30}$.
 ——— minim. 22. 28,7. SE b S 3. }
 Dies frigid. 12. 61. N 1². }
 ——— tepid. 5. 34. N b W 1. } media 48 $\frac{6}{30}$.

Multæ hîc *Variolæ*, aliquibus in Locis sunt *epidemicæ* : Morbus colicus creberrimus, plures jam à *Pomaceo* novello. *Pleuriperipneumoniæ* passim, medio præsertim Mense ; Sanguis extractus autem haud valdè densus est.—Dentium Dolores, Destillationes, Tussés sævissimæ, perplurimæ ; inter Pueros ferina Tussis grassatur—*Catarrhalis* quædam *Febricula* porrò frequens est admodùm, cum magnâ Pectoris Oppressionè, Tussi humidâ permolestâ, Ventriculi Dolore, ac Cruciatus *rheumaticis* ; brevî tamen evanescit, accedente Alvo citâ, atque torminosâ paululùm.

Non tantùm ab impeditâ *Perspiratione* oriri videntur Febres *Catarrhales*, sed etiâ ab ipso gelido *Atmosphæræ* Vapore per varios Corporis Meatus irruente ; humidis igitur, frigidisque Temporibus, invadunt maximè ; huic inesse porrò Salem quendam aëreum *, & acrem judico,

* Vid. Prolegomen. Vol. I.^m de Aëre & Morbis epidemicis.

qui fundit quodammodò Sanguinem, vellicat Nervorum Propagines, totamque Humorum Massam conturbat. Neque enim aliter est facile dictu, undè tam subita sæpe subit Commotio Hominibus, algido udoque Aëri expositis, tam immensa Distillatio Humores per Nares, Oculos, Fauces; adeò acris sæpe ut vel ipsam Cutim erodat, ac Tussès vehementes moveat & Sternutamenta perpetua: Neque hæc in paucis duntaxat, sed & per innumeros undiquè simul, & semel, dispergitur Morbus. Mihi igitur probabile videtur, quòd, quò major sit aërei hujus Salis Copia per *Atmosphæram* diffusa, eò acrior sæviat *Catarrhus*; in quibusdam enim Febriculis *Catarrhalibus* longè magis blanda est Distillatio quàm in aliis; plerumque verò pluviis, nivosis, & frigidis, Tempestatibus acerrima.

Sin autem his generatur acris, & serosa, in Sanguine Colluvies, multo meliùs discutitur Sudoribus, & blandis *Catharticis*, quàm prodigâ Sanguinis Missione, quam vix sanè depiscor unquam, nisi forsan ipso Initio, & ubi Febris haud leviter ardet.

Nova Luna 9° NOVEMBRI. *Plena Luna* 23°.

Pluviæ perpaululùm hoc Mense, *Baroscopii* Statio præalta, medio præsertim; Ventus sæpissimè ab Oriente, ad Septentrionem deflectens plerumque; Aër fuit majore ex Parte valdè crassius; interdum verò tenuis admodùm, ac frigidus, maximæ Pruinæ frequenter, Gelu haud rarò.

VOL. II.

O

Pluvia

Pluvia 1. 15. 17. ¹/₁₈. 19. ¹¹/₂₀. 22. 24. 25.
Dig. Dec.
29. 30. Nix 21 = 0.906.

§ Altitud. maxim. 14. 30,6. NE b E 1. } media 30,0 ³/₁₀.
—— minim. 2. 29,3. SW 2. }
Dies frigid. 21. 68. NE 1^x rigidum Gelu. } media 34.
—— tepid. 2. 42.

Variolæ undiquè ferè, satîs tamen clementes, scilicet distinctæ ut plurimùm: *Peripneumonîæ* & *Pleuritides* passim. *Tussës*, Κορύζαι, & leves *Anginæ* frequentes; *Febres* aliquæ lentæ, & putridæ; *Morbi Colici*, & *Rheumatismi*, plurimi.

Nova Luna 9° DECEMBRI. *Plena Luna* 23°.

Tristissima jam ingruit Tempestas, Pluvia constans, Libs perpetuus ferè, isque subindè procellosus admodùm; hinc facta est *Atmosphæra* longè humidissima; sub Finem Mensis Diluvia maxima ubiquè: ne vel minimum Gelu toto Decembri, Sol rarissimè.

Pluvia ¹¹¹/₁. 2—4. 6. ¹/₈. ¹/₉. 10—14. ¹¹/₁₅. ¹¹¹¹/₁₆.
¹¹/₁₇. ¹/₁₈. ¹/₁₉. ¹/_{20—21}. ¹/₂₃. ¹¹¹/₂₄. ¹¹/₂₅. ¹¹¹/₂₆. ¹¹¹¹/₂₇. ¹¹¹¹/₂₈.
¹¹¹¹/₃₀. ¹¹/₃₁ Dig. Dec.
30. 31 = 6.746.

Procella 1. Nocte W S W 4^x. — 14 Nocte W S W 4—gravissima 15 totâ Nocte S W 4^x, quæ porrò duravit ad Horam quartam pomeridianam Diei 16, atque Mercurium barometricum quàm maximè depressit, ad 28. 1. nempe 16 H. 10. a. m. S W b S 4^x—23 Nocte S S W 4—24

4—24 Mane S W 4_x—25 S W 4 Ventus nim-
 bosus omni Nocte ab 8, ad 13, haud magnus
 tamen indè Barometri Lapsus.—Iris Lunaris per-
 illustris 15. H. 10. p. m. W S W 3^x Fulgur &
 Tonitru 16 Mane. Magna AB. 4. H. 8. p. m.
 N W 2_x.

8 Altitud. maxim. 7. 30,2. W N W 1. } media 29.4.
 ——— minim. 16. 28,1. } media 29.4.

Dies frigid. 17. 60. W N W 2. } media 52 $\frac{4}{5}$.
 — tepid. 3. 44. S W 3. }

Variolæ adhuc passim, mites autem plerum-
 que ; in distinctis tamen, si paulò sint confer-
 tiores, & largissima profluunt Sputamina, & co-
 piosæ admodum & crassæ Urinæ ; quod faus-
 tum semper. Morbi colici perplurimi, ex *Po-
 macei* novelli Potu permulti : haud pauci & Co-
 licâ vehemente, & acerbissimo Artuum Dolore,
 anguntur, undè sæpe Brachiorum *Paresis*, & ge-
 neralis Membrorum Debilitas, Miseros * diu ad-
 modum trahit.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLVIII

Dig. Dec.

= 30.680.

* De his, eorumque Medicinâ, Vid. Opuscul. nostr. de
Morbo Colico, ad Calcem Vol. I^{mi} de *Aëre & Morbis Epi-
 demic.*

I N D E X.

A.

A Bdomen tumidum per Febres, fluente Alvo, exitiosum	— — — — —	Pag. 147
Acetum cum Piscibus rectè estur	— — — — —	57
Abcessus in Meatu auriculari in Febris, bonum	— — — — —	56
Aër densus admodum Baroscopium erigit	— — — — —	1
Acetum & Pomaceum Nautis utilia	— — — — —	57
Acidorum in Febre pestilentiali Utilitas	— — — — —	50
Aceti Vapor ad Auram malignam	— — — — —	84
Aër Carcerum & Nosocomiorum, &c. sæpe purgari & corrigi debet	— — — — —	<i>ibid.</i>
Æstas fervida Bilem auget & Sanguinis Acrimoniam	— — — — —	71
Æstatis calidæ Nocumenta, & quid tunc faciendum	— — — — —	<i>ibid.</i>
Æstatis frigidæ & humidæ Incommoda	— — — — —	160
Æstus Maris minimi flante Boreâ	— — — — —	66
Alvi Purgatio lenis in Febre malignâ laudatur	— — — — —	53
Quæ possunt Alvi Purgationem, quæ prohibent	— — — — —	53
Alvi Fluxus in Febris liquidis, saniosis, aut nigri, cum magno Fœtore involuntariè dejecti, infauti sunt Ominis	— — — — —	147
Angina gravis	— — — — —	16
De Anginâ Observationes quædam	— — — — —	16, 21
De Anginâ mucosâ ejusque Medelâ	— — — — —	20
Anginæ Metastasis in Pulmonem lethalis	— — — — —	155
Anginæ Curatio	— — — — —	19
Qui sunt Apoplexiæ obnoxii	— — — — —	10
Ad Apoplexiam præcavendam Cautio	— — — — —	<i>ibid.</i>
Apoplexia post diuturna Frigora frequens	— — — — —	169, 184
Multi Apoplexiâ perculsi	— — — — —	104
Quæ ad Prophylaxin idonea	— — — — —	169
Aphthæ & Ulcera Faucium in Phthisi mala	— — — — —	27
Aphthosa Angina Febris, præcipuè pustulosis, accedens	— — — — —	29
Aphthæ nigrae, malæ	— — — — —	46
Aprilis perficulus & frigidus	— — — — —	67
Aqua fontana, imò & frigida, in Dysenteriâ	— — — — —	107
Arcus in Cælo lucidus, igneus, insolitus	— — — — —	69
		Arcus

Arcus lucidus, subflavus, ad Modum Iridis, extensus à NE ad S-W per ipsam Lunam	— — — — —	Pag. 80
Asthmaticis Ventus ab Oriente noxius	— — — — —	79
Ascites sæpe sequitur Morbum regium, & quare	— — — — —	87
Atmosphæra interdum apparet valdè crassa & fumosa etsi re- verà est maximè sicca, & unde	— — — — —	43
<i>Augustus</i> Mensis fervidissimus & siccissimus	— — — — —	174
— — — — — calidus & ficcus	— — — — —	108
Aquæ Calcis Usus in Rheumatismo	— — — — —	186
— — — — — hujus præparandæ Modus optimus	— — — — —	<i>ibid.</i>
Algidus humidusque Autumnus serosam gignit Colluviem	— — — — —	164
Aucupii mirum Genus	— — — — —	34
Aurora borealis notabilis	— — — — —	23, 179
Ab Atmosphærà crassâ & perfrigidâ Destillationes, &c.	— — — — —	181
<i>C. Aurelianus</i>	— — — — —	19
Atmosphære gelidæ & humidæ Mala	— — — — —	vii
— — — — — siccæ & frigidæ Commoda & Incommoda	— — — — —	iii, iv
— — — — — tepidæ & humidæ Mala	— — — — —	vi
— — — — — Remedia	— — — — —	<i>ibid.</i>
In Ædibus condendis magna Præcorum Diligentia	— — — — —	x
— — — — — quædam malè admodum locatæ	— — — — —	<i>ibid.</i>
B.		
B Alneum frigidum ad Rheumaticos	— — — — —	185
— — — — — Tussim Convulsivam	— — — — —	105
— — — — — vitandum est in Febriculâ aut Hæ- moptoë	— — — — —	105
Maxima Barometri Depressio per gravem Procellam	— — — — —	32, 194
Barometri præalta Statio perflante Austro & quare	— — — — —	64
Quàm maxima Barometri Altitudo	— — — — —	14
Barometri magnus & subitus Descensus	— — — — —	141
— — — — — magna Altitudo Africo flante, cum multâ Pluviâ	— — — — —	35, 94
— — — — — dum Atmosphæra est valdè nebu- losa	— — — — —	i
— — — — — & magna Depressio <i>Feb.</i> 1746	— — — — —	151
Immensa Pluvia nil tamen subsidente Barometro	— — — — —	26
Baroscopii præalta Statio	— — — — —	95, 112, 113, 193
Bilem auget maximè Æstas calida	— — — — —	177
— — — — — per Alvim purganda est	— — — — —	<i>ibid.</i>
— — — — — ubi abundat, <i>Hippocrates</i> & veteres Medici Venæ Sectio- nem prohibent	— — — — —	<i>ibid.</i>
Boreas acutos Morbos Pectoris facit	— — — — —	181
Boreas cur Pulmonariis noxius	— — — — —	65
Duo borealia Lumina valdè notabilia	— — — — —	23
De Bronchotomiâ	— — — — —	16

Brachiorum Parefis à Colicâ	Pag. 195
Bulla nigra ad Linguæ Apicem in Peripneumonicis	144
C.	
C Alomel in Dysenteriâ epidemicâ	100
Camphora in Febribus	148
Carunculæ lividæ per Alvum ejectæ, pessimæ	105, 107
Cathartica fortiora faciunt Febres recidivas	56
Catarrhales Morbi undiquè frequentes	77
Cathartici lenis in Febre pestilente Utilitas	49, 53
quando prohibetur	53
Chirurgus Guttur Scalpello pertundens	17
Cholera valdè frequens & valdè biliosa	71
Colicus Morbus frequentissimus	61
facile solvitur accedente Diarrhœâ	ibid.
Cicer & Ficus ad Variolas	165
Coffee Potus laudatur	102
Calor enormis plures Morbos generat	71
Caries Maxillæ & Ossis Vomeris post Morbillos	137, 139
Colica biliosa plurimos torquens	168
Colluvies acris & biliosa dominatur maximè	164, 176
serosa pro variis Hominum Temperamentis varios	110
producit Morbos	110
biliosa post fervidam Æstatem	176
per Vomitus & Alvum purganda	177
Cortex Peruvianus noxius ubi Sanguis est viscidus & inflam-	
matus	114
Comitia funesta Oxoniensia	83
Tauntoni	ibid.
Launcestoni	82
Contagium diu adhæret Vestibus Ægrotantium	68
Ideoque ex Febre contagiosâ recuperatos Domi recipere pa-	
rum tutum est	67
Consensus Cutim inter & Intestina benè notus Alex. Tralliano	62
Clyster anodynus	100
& restringens	191
Coryzæ accerimæ	187
Historia Cynanches lethalis	17, 18
Cuticulæ Desquamatio larga post Morbillos, bonum	24
Cynanche	17, 25
Cucurbitulæ scarificatæ in Febribus	148
D.	
D Eccebris 1739 Tempestas mirabilis	34
frigidus & pluvius admodum	62
maximè pluviosus	179
& procellosus	194
Diarrhœa	

I N D E X.

199

Diarrhœa sæpe salutifera in Peripneumoniâ malignâ Anni 1746	Pag. 152
Quæ Diarrhœa in Febre pestilentiali bona, quæ mala	55
Observata in Cadavere Pueri Diarrhœâ perempti	4
Diarrhœa & Dysenteria frequens post fervidas Æstates	176
Destillationes, Tusses, & Dentium Dolores acerbissimi innumeros torquent	162
Diluvia maxima	180
Dysenteria epidemica	98
ejus Curatio	100
Venæ Sectio in hac necessaria	105, 106
Lumbrici in Dysenteriâ epidemicâ multi dejiciuntur	105
Calomel in Dysenteriâ	100
Aqua fontana imò frigida in Dysenteriâ	107
Draastica purgantia nocentissima in Dysenteriâ	49, 106
Lenia Cathartica utilia in Dysenteriâ	106
In Dysenteriis curandis lenia purgantia antecedere debent	
Usum astringentium	99
Urina limpida malum	107

E.

E Ccoprotica in Febribus putridis	148
Eclegmata oleosa & dulcia in Phthisi pulmonariâ sæpe nocent	4
Elixir Paregoricum	186
Emetici Utilitas in Febre malignâ	48
Empyema frequens post Pleuropneumoniam	27, 156
ejus Signa	155
Emetica in Febribus catarrhalibus	102
Emplastra Anodyna & Epispastica in pertinaces Laterum Dolores post Pleuritides	183
Epispasticum ad Collum antèrius in gravi Anginâ	19
quando utile in Febre malignâ	52, 148
Epiphoræ acerbæ	160
Erucae innumeræ	171, 175
Exanthemata varia in Febre putridâ malignâ	137
Expuitio largissima solvit Febres catarrhales	133, 134
Endemici Morbi unde	viii

F.

F EBRIS putrida petechialis	42
anginosa inter Equos & Boves	ibid.
nauticæ pestilentialis Descriptio	44, 47, 55
Curatio	48, 55
ex facili recidiva	47
in hac diluentia subacida necessaria	50

Febris nauticæ historia cui acida profunt	—	Pag. 50
— cui Salia alcalina nocent	—	<i>ibid.</i>
Febris pestilentialis valdè funesta	—	55
— mesenterica biliosa	—	72
— intermittens anomala post Catharfin fit regularis	—	74
Febris maligna contagiosa apud Launceston, &c.	—	82
— in quâ Sanguis erat valdè solutus &		
V. S. perniciofa	—	83
— sæpe in Carceribus generatur	—	<i>ibid.</i>
Putrefactio Cadaverum sæpe gignit Febres malignas	—	<i>ibid.</i>
Febris catarrhalis maligna	—	130
Febriculæ catarrhales frequentes ob subitum Autumni Frigus	—	90
Febris dysentericæ Signa & Curatio	—	98, 99, 105, 108
Febres intermittentes plurimæ	—	97
— Dysentericæ creberrimæ undiquè	—	103
— epidemicæ	—	108, 121
Febris catarrhalis maximè epidemicæ Historia	—	99
— Influenza dicta	—	104
— Curatio	—	102
— aliquando in Peripneumoniam, aliquando in		
Intermittentem transit	—	101
— minimè fert magnum Sanguinis Dispendium	—	<i>ibid.</i>
— Sputa copiosa & Sudores modici juvant	—	102
— Urina multa hypostatica prodest	—	103
— Diarrhœa sæpe	—	103
— accedente calidâ Tempestate Sudoribus solvitur	—	108
Febris catarrhalis quibus Temporibus frequens & unde	—	102
— ab acri Sale Aëreo	—	<i>ibid.</i>
— quibus profligatur	—	103
Febres scarlatinæ valdè frequentes	—	133
Febris putridæ malignæ Historia	—	135
— Carcerum Historia	—	82
— catarrhalis Sputo levata—ejus Descriptio	—	141
— putrida lenta frequens	—	145
— in hac V. S. perniciofa	—	147
— Medicina idonea	—	148
Febres biliosæ	—	158
— miliares compositæ	—	162
Febris putridæ lentæ Descriptio ac Curatio	—	172, 173
— quædam anginosa quæ frequenter ad Pulmones ruit	—	111
— peripneumonica maligna, admodum funesta	—	151
— cujusdam catarrhalis Descriptio ac Curatio	—	133

Febrium Catarrhalium Causa	—	Pag. 192, 193
— Curatio	—	193
Frigora stupenda	—	34
— Mare ad Littora, Vina, &c. congelantur	—	36
Februarius perficcus & perfrigidus	—	182
Fomenta emollientia ad Colicam	—	168
— non debent esse nimis calida	—	168
Furunculi & Carbunculi plurimi post Variolas	—	189
Febris epidemicæ diversa Facies in Locis diversis	—	ix
— diversus curandi Modus	—	ibid.
— à manifestâ Aëris Intemperie	—	xi
Febribus putridis favet nebulosa ac nubila Atmosphæra	—	ibid.

G.

G RAMEN est Remedium detergens	—	170
Gangræna Faucium post Morbillos	—	137, 139
Gargarisationes fortiores in Anginâ inflammatoriâ malæ	—	20
— in aliis autem sunt utilia	—	ibid.
Gelu 13 Junii 1743	—	109
— acre 18 Aprilis	—	184
Glacies ubiquè 27 Aprilis 1745	—	132

H.

H ALO maximus luteus circa Lunam	112, 149, 180,	
	184	
Hæmorrhagia Narium in Febre pestilentiali nunc bona, nunc mala admodum	—	47
— frequens per Tempestates valdè æstuosas	—	175
Hepatitis	—	48
Hauftus salinus, quid, ejusque Usus	—	51
Frid. Hoffmanni Hortatio	—	ii
Hippocrates laudet diligentem Tempestatum Observationem	—	i
Hippocratis Observationes de Morborum & Tempestatum Constitutionibus	—	xiii, xvi
— parùm differunt à nostris	—	xvii
Hortamen ad legendum Hippocratem	—	xvi
Hydropis à Lymphaticorum Rupturâ Descriptio	—	87, 88

I.

J Anuarius valdè procellosus	—	77
— perfrigidus & siccus	—	114
Intestinorum Sphaceli Signa	—	107
Icterus & Hydrops frequens	—	87
Iris Lunaribus illustris	—	195
— vivida	—	140
Ischias solito frequentior	—	132
Julius Mensis siccus & subfrigidus	—	54
— aridissimus ac torridus	—	10, 70
		Julius

<i>Julius</i> pluviosus & frigidus	Pag. 159
<i>Junius</i> frigidus & pluviosus	134
— ficcus	42, 109
Jovis cum Marte intima maximè Conjunctio	104

L.

L Apilli per Tussim rejecti, unde Sputum Sanguinis	4
Lentor inflammans prout huc vel illuc transfertur hunc vel illum Morbum facit	13
Immensa Quantitas Limacum	159
Lingua in Peripneumoniâ malignâ	144
Libs perfrigidus	129
Lumen boreale insolitum	190

M.

M ARIS Æstus longè maximus	124
Mira Tempestas Mense Maio 1739	26
Maris Æstus minimi flante Boreâ	66
Martius Mensis siccissimus	65, 80
Messis infelix & corruptum Frumentum	58
Menstrua admodum profusa	175
Medicus in Morbis curandis tam propria quàm communia debet intueri	48
Maii 5 ^o 1740 Nix plurima ac Frigus insolitum	41
Matura & optima Messis	70
Materia Medica ad Peripneumonias	169, 170
Mesentericæ Febres per Catharfin discutiendæ	156
Morbi verni Sanguinis Missionem autumnales Catharfin possunt	177
Morbilli epidemici	12, 24, 78, 79
— pustulosi mali Moris	28, 159
— valdè epidemici	78, 85, 86
— Historia & Curatio	90
Longus Artuum Dolor ac Lassitudo ante Morbillos & Variolas, malum	23
Si Cuticula multum atque benè desquamatur post Morbillos, bonum	24, 86, 93
Indusia in Morbillis Sudore madida summoperè sunt cavenda	91
Quid faciendum est si Morbilli præmaturè recedant, aut luridæ fiant	24
Morbilli maligni epidemici	137, 139, 154
— sub Finem Tussis & Peripneumonia quibus medetur Venæ Sectio	78, 133
— post hos Gangræna Faucium	137, 139
Moschi Vires per Cutim expellendi Humores miræ	123
Muscarum omnigenarum Vis immensa	175
Morbi quidam Tempestatibus Anni respondent	xiii
	Idem

Idem Morbi in Græciâ qui in Britannia — Pag. xvii
 Morbos intercurrentes descriptos æquè ac Epidemicos, & quare
 xviii

N.

N IX plurima 5 ^o Maii 1740 ———	41
Nautæ & Milites magis plectuntur Febribus epidemicis quàm Oppidani aut Ruricolæ ———	150
Naturæ obsequendum est in Medicinâ faciundâ ———	7
Nebulæ densissimæ & valdè foetidæ ———	141, 170, 181
Nervorum Distentio in Tussi ferinâ Puerorum ———	165
Nitrum ———	156
November valdè siccus ———	193
Nuces avellanæ copiosissimæ ———	161

O.

O Ctober perfrigidus ———	60
—— procellosus valdè & pluviosus ———	92, 125, 139
Oleum Lini ad Peripneumon. &c. ———	156
Lues inter Oves in quâ Vesicula Fellis fuit Magnitudinis enor- mis ———	42
Ophthalmia per frigidas & humidas Aëris Constitutiones ———	41
—— cum aliis Morbis inflammatoriis frequens ———	15, 22,
—— ——— ———	24, 25
—— humida Catharticis curatur ———	160
Operis Ratio ———	i

P.

P Aralyfis Brachiorum à Colicâ ———	195
Parasynanche, quid, ejusque Curatio ———	24
Parotides in Febre pestilentiali bonæ dum suppurantur ———	55
—— aliquando diu induratæ permanent ———	ibid.
In Peripneumoniâ malignâ Lingua qualis ———	144
—— ——— qualis Urina ———	ibid.
—— ——— scorbuticâ ———	40
Paraphrenitis frequens ———	117, 156
Historia Chirurgi ingeniosi Paraphrenitide perempti ———	117, 118
Peripneumonia notha ejusque Curatio ———	134, 157
Febris Peripneumonica malignæ valdè frequentes ———	142
—— ——— perparcam admittunt Sangu- nis Missionem ———	ibid.
Alia Peripneumonia maligna ejusque Descriptio ———	151, 153
—— Papulæ & Pustulæ urentes plurimæ in hac boni Ominis ———	152
Distinctio inter Peripneumoniam à viscido & inflammante Sanguine & Peripneum. malignâ ———	144
Perniones (etiam inter adultos) frequentissimi ———	38
Petechiæ lividæ, violacæ, nigra, fusca ———	45
Phthisis ———	

Phthisis pulmonaria sæpe Febrem catarrhalem sequitur	Pag. 3
Species diversæ diversam postulant medendi Metho-	
dum	4
Pulmonum frequens sine Ulcere	<i>ibid.</i>
Quid Pulmonariis Phthisicis faciendum est ineunte Æstate	8
Nigras aut lividas Petechias prælargas Hæmorrhagiæ plerum-	
que comitantur	135
Phlyctænæ seu Pustulæ ichorosæ in Peripneumonicis, &c. in-	
dicant Usus Epispasticorum	7
Piscium Esus immodicus putridos Humores facit ac Scorbutum	
	57
Piscatus seu nimius Piscium Esus insalubris	47
Pleuritis spuria, quid	32
ac Peripneumonia valde frequens	117
Pleuroperipneumoniâ in quâ erumpunt Pustulæ magnæ, uren-	
tes circa Pectus & Scapulas 7 ^{mo} circiter Die, semper fausti	
est Ominis Ægrotis	7
multæ cum idoneâ Medicinâ	169
Pleuritis dorsalis, ubi Doloris Sedes est inter Scutula operta, Ve-	
næ Sectione opportunâ & lenibus Opiatis maximâ ex Parte	
curatur	155, 156
Pluvia immensa nil subsidente Baroscopio	26
Pomaceum & Acetum Nautis utilia	57
in Febre putridâ malignâ	148
Colicen, Tormina & Alvi Fluxus producit	126, 127
Poma citò putrescentia Alvi Fluxum inducant	127
Procellosa Tempestas frequenter salubris	126
Pulmonis Morbi perplurimi ac vehementes	66
Purgatio Alvi declinantibus Variolis utilis, quidni declinante	
putridâ Febre?	53
Pustulæ aquosæ urentes, Phlyctænæ Hippocrat.	46
boni Ominis in Febre pestilente	<i>ibid.</i>
circa Labia in Febribus bonum & quare	56
<i>Plumpton</i> oppidum	98
Perspirabile retentum Morbos creat	viii
Procellæ aliquando salubres	xi

R.

R Aucedo pertinax in pulmonariis malum	27
Rheumatismi contumaces	185, 186
in his sæpe V. S. non juvat	185
Methodus curandi	<i>ibid.</i>
Aqua Calcis confert	186
Fomenta	<i>ibid.</i>
Rheumatismo calido æquè medetur V. S. ac Pleuritidi	185
Serum Lactis in Rheumatismo	186
	Vesica-

Vesicatoria	_____	Pag. 186
Rhabarbarum optimum ad Dysenteriam	_____	106
_____ ejus Tinctura non æquè confert	_____	<i>ibid.</i>
Rivuli omnes penè arescunt ob Calores enormes	_____	175, 191
Rubeoli seu Rosalia <i>Frid. Hoffmanni</i>	_____	68
_____ aliquando Stigmata relinquunt sicut Variolæ	_____	75,
		142
<i>Ramazzini</i> Consilium	_____	ii

S.

S A L E S volatiles alcalinos in Febre putridâ non probo	_____	148
Salivatio parciior debito in Variolis	_____	182
De Sanguine mittendo in Febribus malignis	_____	48
Sanguis sæpe floridâ ac falsâ Specie decipit	_____	<i>ibid.</i>
_____ maximè viscidus Vere 1744	_____	117, 118
_____ crassissimo Glutine obductus in Pleuroperipneumonicis & Rheumaticis	_____	130
_____ subflavo & tenaci Glutine obductus indicat Venæ Sectionem	_____	145
_____ admodum densus & glutinosus in omnibus fere Morbis acutis <i>Januario & Februario 1742</i>	_____	78
_____ admodum densus & Corio obductus post 100 Uncias detractas	_____	129
_____ in Asthmate & Serum subflavum aut viride at perliquidum	_____	130
Sanguinis Missio necessaria in Dysentericis	_____	105
_____ Facies in Febribus putridis malignis	_____	137
_____ Peripneumoniâ malignâ	_____	143
_____ longè diversa in Pleuropneumoniâ	_____	<i>ibid.</i>
Sanguinis puri Sputum in Peripneumonicis	_____	183
Inest sæpe Sanguini Diathesis ad pustulosâs Febres	_____	76
Salivatio præmatura profusa in Variolis, malum	_____	33
Salia volatilia alcalina in Febribus petechialibus ac malignis nocent plerumque	_____	50
Salinus Haustus, quid, ejusque Usus	_____	51
Scabies frequens, & unde	_____	64, 112, 167
_____ foedissima inter Equos	_____	96
_____ undique post acerrimum Frigus	_____	38
Scotomia in Febre pestilentiali frequens	_____	47
Scombri copiosissimi	_____	<i>ibid.</i>
Sal Aëreus	_____	192
Scorbutus perfrequens	_____	40
_____ terribilis inter Nautas	_____	160
Serum Sinapinum	_____	157
_____ Lactis ad Rheumatismum	_____	186
		Salsus

Salfus aut acidus in Ore Sapor per Febres putridas, bonum

Pag. 56

Sanguinis largior Emissio non confert in Febribus catarrhalibus

101

September maximè ficcus atque adeò saluberrimus

111

Siccitas maxima

ibid.

Singultus in Febribus pessimum

137

September ficcus & pulcherrimus

190

Sputa copiosa in Febribus putridis bona

47

— falsa & acida

56

Spontanei Sudores optimi

50

— qui mali

51

Sudor foetidus ab Esu Piscium

47

Sudores in Febribus haud Morbum solvunt, etiam erumpen-

tibus Pustulis, si Urinæ prorsus tenues, crudæ, & aquosæ

perstant

2

Situs humilioris Mala

viii

— aridi & montani

ix

Sanguinis Acrimonia magna Autumno

xiii

T.

T A B E S Pulmonum non omnis ab Ulcere pendet sed à

Muci & tenuioris Laticis Profluvio per Glandulas

asperæ Arteriæ

4

— in quâ aliquando duros extus-

siunt Lapillos

ibid.

— cum Aphthis citam Mortem

promittit

27

Tabes pulmonaria frequens admodum

187

— lethalis Signa

188

— quæ in hac facienda

ibid.

Tempestas Tabidis maximè noxia

65

Tonitru gravissimum Decembr. 1740

62

Subjta Thermometri Mutatio

77

Tincturæ Corticis Alexipharmacæ Vires

57

Tuberculorum in Pulmonibus Noxæ

13

Tussis anginosa inter Equos perfrequens

ibid.

Tussis convulsiva vehemens creberrima

30, 166

— non nisi per Sanguinis Missionem compes-

cenda

16

— in qua V. S. maximè

necessaria Anno 1744

114

— Vomitu levatur

115

— post Morbillos Curatio

105, 109

Tusses vehementes epidemicæ

116

Balneum frigidum ad Tussim convulsivam

105

Tussis

Tussis convulsiva pessima	Pag. 166
ad hanc Medicina idonea	<i>ibid.</i>
Tusses variæ variam postulant Methodum medendi	4, 5
Perfrigidas & siccas Tempestates Sanguis densus & viscidus	v, vi
tutius tunc mittitur Sanguis	<i>ibid.</i>
quid faciendum	v
In ficcâ sudâque Tempestate citò & feliciter restituuntur ægri	vii
U.	
V ariolæ ab omni Febriculâ pustulatâ distinguuntur, quòd nempè Vesiculæ in Variolis non nisi post Diem octavum decedunt, abeunt verò Rubeoli, &c. tertio vel quarto	75
Pro Variolis Febriculas pustulatas (Anglice <i>the Chicken and Swine Pox</i>) agnoscunt Mulierculæ	142
Variolarum mali Moris per Alexipharmaca Curatio	122, 123
Variolæ epidemicæ	30, 41, 42, 60, 66, 67, 68, 140, 158, 180
mali Moris	33, 72, 122
Variolosi parùm expuunt frigidâ durante & ficcâ Tempestate	
—quid tunc faciendum	36
Prima Notitia Variolarum apud Arabes	165
Variolæ derepentè factæ epidemicæ	178
epidemicæ benignæ nisi Nautas inter & Milites, cur his malæ	151
malæ Scorbuto infectis	66
In distinctis Variolis profusa Salivatio	179
Variolæ confluentes epidemicæ, cum valdè profusâ Salivatione ac Faucium Ulceribus	160, 165
medendi Methodus in his commoda	165
Venæ Sectio in Dysentericis utilis	105
Febre putridâ Carcerum nimia, Ægrum jugulabat	82
Catarrhali non esse larga debet	101
Vermibus perplurimi infestantur	98, 105
Venæ Sectio in Tussi & Peripneumoniâ optimum	91
ferina	105
Vesicatoria diutissimè manent ulcerata	57
Vinum rubrum optimum Alexipharmacum	52
ad cohibendos Sudores	71, 130
Ulcera Faucium in Febribus mala	26
in Phthisi breviter lethalia	<i>ibid.</i>
Vinum Alexipharmacum jucundum	147
	Ventus

Ventus orientalis Asthmaticis noxius	—	Pag. 79
Vesicatoria in Rheumatismo	—	186
Vibices in Febris lethales	—	45
Urina lutea hypostatica copiosa, in Febre catarrhali critica	—	103
— cruda & tenuis in Peripneumonicis, pessimum	—	152
— multa crassa subsidens in Peripneumonicis, bonum	—	153
Vomitionis Effectus in Febris	—	54
Ungues lividi	—	45
Medicus debet Ungues inspicere	—	<i>ibid.</i>
Vinum pomaceum in Febris putridis	—	148
Ulcera Scorbutica fungosa	—	160
Vomica Pulmonis unde	—	171
Urina tenuis aquosa in Febris pustulosis malum	—	2
— limpida in Dysentericis malum	—	107
Urina in Febre pestilentiali cruda Finem ad usque	—	55
Uxoris meæ dilectissimæ Historia	—	87
Venti magnam Vim habent ad Salubritatem vel Insalubritatem Locorum	—	<i>ibid.</i>
— contra perniciosos benè muniendum est	—	<i>ibid.</i>
Varro	—	x
Vitruvius	—	<i>ibid.</i>

F I N I S.